M. MARTIN DE LANCOUR.

LIBRARY OF CONGRESS
DUPLICATE EXCHANGE

HISTOIRE NATURELLE
DES MINÉRAUX.

TOME V.

TRAITÉ DE L'AIMANT
ET DE SES USAGES.

HISTOIRE NATURELLE
DES MINÉRAUX.

TOME V.

TRAITÉ DE L'AIMANT
ET DE SES USAGES,

Par M. le Comte de Buffon, Intendant du Jardin & du Cabinet du Roi, de l'Académie Françoiſe, de celle des Sciences, &c.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DES BÂTIMENS DU ROI.

M. DCC. LXXXVIII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI.

QH
45
B92
t.[29]
R6
S1

TABLE

Des Articles contenus dans ce Volume.

ARTICLE PREMIER. *Des forces de la Nature en général, & en particulier de l'Electricité & du Magnétiſme,* Page 1

ART. II. *De la nature & de la formation de l'Aimant,* 84

ART. III. *De l'attraction & de la répulſion de l'Aimant,* 100

ART. IV. *Divers procédés pour produire & compléter l'aimantation du fer,* 135

ART. V. *De la direction de l'Aimant & de ſa déclinaiſon,* 151

ART. VI. *De l'inclinaiſon de l'Aimant,* 175

TABLE *des matières,* 193

TABLES contenant les observations qui ont été faites dans ces derniers tems, sur la déclinaison de l'Aiguille aimantée.

HÉMISPHERE BORÉAL, Mer Atlantique, Page 1
Hémisphere austral, Mer Atlantique, 27
Hémisphère boréal, Mer des Indes, 54
Hémisphère austral, Mer des Indes, 58
Hémisphère boréal, Mer Pacifique, 76
Hémisphère austral, Mer Pacifique, 112

TABLES contenant les observations qui ont été faites dans ces derniers tems, sur l'Inclinaison de l'Aiguille aimantée.

HÉMISPHERE BORÉAL, Mer Atlantiqne, 142
Hémisphère austral, Mer Atlantique, 151
Hémisphère boréal, Mer des Indes, 159
Hémisphère austral, Mer des Indes, 163
Hémisphère boréal, Mer Pacifique, 171
Hémisphère austral, Mer Pacifique, 177

TABLES contenant, ſuivant l'ordre des latitudes, les obſervations qui ont été faites dans ces derniers tems, ſur la déclinaiſon de l'Aiguille aimantée.

HÉMISPHERE BORÉAL, Mer Atlantique, Page 180
Hémiſphère auſtral, Mer Atlantique, 206
Hémiſphère boréal, Mer des Indes, 234
Hémiſphère auſtral, Mer des Indes, 238
Hémiſphère boréal, Mer Pacifique, 255
Hémiſphère auſtral, Mer Pacifique, 293

TABLES contenant, ſuivant l'ordre des latitudes, les obſervations qui ont été faites dans ces derniers tems, ſur l'inclinaiſon de l'Aiguille aimantée.

HÉMISPHERE BORÉAL, Mer Atlantique, 324
Hémiſphère auſtral, Mer Atlantique, 333
Hémiſphère boréal, Mer des Indes, 341
Hémiſphère auſtral, Mer des Indes, 345
Hémiſphère boréal, Mer Pacifique, 353
Hémiſphère auſtral, Mer Pacifique, 360
Explication des Tables & des Cartes, 365

ERRATA.

Page 1, *ligne dernière*, cette force n'eſt qu'une puiſſance; *liſez*, cette force eſt une puiſſance.

Page 7, *ligne* 11, dans le zones tempérées; *liſez*, dans les zones tempérées.

Page 10, *ligne* 12, & ſe lancent; *liſez*, & s'élancent.

Page 17, *ligne* 3, de Saint-Kildaski; *liſez*, de Saint-Kilda, Sckie;

Ibid. ligne 5, l'Iſle de Mull; *liſez*, Iſle de Mult.

Ibid. ligne 8, *même correction à faire.*

Page 18, *ligne* 15, auprès du Mont-cenis; *liſez*, auprès de Moncenis.

Ibid. ligne 24, au Mont-Mezine; *liſez*, au Mont-Mezin.

Page 21, *ligne* 8, quartreuſes & granitiques; *liſez*, quartzeuſes & granitiques.

Ibid. lignes 16 *&* 17, *même correction.*

Page 34, *ligne* 12, vaincu par celle de l'électricité & du magnétiſme; *liſez*, vaincu par celles de l'électricité & du magnétiſme.

Page 68, *ligne* 9, la figure de terre; *liſez*, la figure de la terre.

Page 73, *ligne* 27, les foudres ſouterraines qui les produiſent; *liſez*, les foudres ſouterraines qui le produiſent.

Page 79, *ligne* 13, & s'il exiſtoit des corps; *liſez*, & enfin s'il exiſtoit des corps.

Page 29, *ligne* 2, qu'ils ſont en petit volume; *liſez*, qu'ils ſont en plus petit volume.

Page 148, *ligne* 13, de l'aimantation de l'aimant; *liſez*, de l'aimantation du fer.

Page 152, *ligne* 9, la déclinaiſon de l'aimant étoit conſtante; *liſez*, la direction de l'aimant étoit conſtante.

Page 166, *ligne* 2, M. Colomb; *liſez*, M. Coulomb.

Ibid. ligne 1 *de la note*, *même correction à faire.*

Page 167, *ligne* 27 *de la note*, *même correction.*

Page 178, *ligne* 3, ou fer aimanté; *liſez*, ou fers aimantés.

SUITE

E
3
o


30

CARTE
MAGNETIQUE
DES DEUX
HEMISIHÈRES

SUITE DE L'HISTOIRE DES MINÉRAUX.

TRAITÉ DE L'AIMANT ET DE SES USAGES.

ARTICLE PREMIER.

Des forces de la Nature en général, & en particulier de l'Électricité & du Magnétiſme.

IL N'Y A DANS LA NATURE qu'une ſeule force primitive ; c'eſt l'attraction réciproque entre toutes les parties de la matière. Cette force n'eſt qu'une puiſſance

émanée de la puiſſance divine, & ſeule elle a ſuffi pour produire le mouvement & toutes les autres forces qui animent l'univers. Car, comme ſon action peut s'exercer en deux ſens oppoſés, en vertu du reſſort qui appartient à toute matière, & dont cette même puiſſance d'attraction eſt la cauſe, elle repouſſe autant qu'elle attire *(a)*. On doit donc admettre deux effets généraux, c'eſt-à-dire, l'attraction & l'impulſion qui n'eſt

---

(a) Nous croyons néceſſaire de rapporter ici ce que nous avons dit à ce ſujet dans la ſeconde vue de la Nature, volume XIII, *in*-4.°, pages 17 & ſuivantes. « Si on réfléchit à la communication du mouvement par le choc, on ſentira bien qu'il ne peut ſe tranſmettre d'un corps à un autre, que par le moyen du reſſort, & l'on reconnoîtra que toutes les hypothèſes que l'on a faites ſur la tranſmiſſion du mouvement dans les corps durs, ne ſont que des jeux de notre eſprit, qui ne pourroient s'exécuter dans la Nature. Un corps parfaitement dur n'eſt en effet qu'un être de raiſon, comme un corps parfaitement élaſtique n'eſt encore qu'un autre être de raiſon; ni l'un ni l'autre n'exiſtent dans la réalité, parce qu'il n'y exiſte rien d'abſolu, rien d'extrême, & que le mot & l'idée de parfait n'eſt jamais que l'abſolu ou l'extrême de la choſe. »

« S'il n'y avoit point de reſſort dans la matière, il n'y auroit donc nulle force d'impulſion; lorſqu'on jette une pierre, le mouvement qu'elle conſerve ne lui a-t-il pas été communiqué par le reſſort du bras qui l'a lancée? Lorſqu'un corps en mouvement en rencontre un autre en repos, comment peut-on concevoir qu'il lui communique ſon mouvement, ſi ce n'eſt en comprimant le reſſort des parties élaſtiques qu'il renferme, lequel ſe rétabliſſant immédiatement après la compreſſion,

que la répulſion ; la première également répartie & toujours ſubſiſtante dans la matière, & la ſeconde variable, occaſionnelle & dépendante de la première. Autant l'attraction maintient la cohérence & la dureté des corps, autant l'impulſion tend à les déſunir & à les ſéparer. Ainſi, toutes les fois que les corps ne ſont pas briſés par le choc, & qu'ils ſont ſeulement comprimés, l'attraction, qui fait le lien de la cohérence, rétablit les parties dans leur première ſituation, en agiſſant en ſens contraire, par répulſion, avec autant de force que l'impulſion avoit agi en ſens direct ; c'eſt ici, comme en tout, une réaction égale à l'ac-

---

donne à la maſſe totale la même force qu'il vient de recevoir. On ne comprend point comment un corps parfaitement dur pourroit admettre cette force, ni recevoir du mouvement ; & d'ailleurs il eſt très-inutile de chercher à le comprendre, puiſqu'il n'en exiſte point de tel ; tous les corps, au contraire, ſont doués de reſſort ; & ſi nous réfléchiſſons ſur la méchanique du reſſort, nous trouverons que ſa force dépend elle-même de celle de l'attraction ; pour le voir clairement, figurons-nous le reſſort le plus ſimple, un angle ſolide de fer, ou de toute autre matière dure ; qu'arrive-t-il lorſque nous le comprimons ? Nous forçons les parties voiſines du ſommet de l'angle, de fléchir, c'eſt-à-dire, de s'écarter un peu les unes des autres ; &, dans le moment que la compreſſion ceſſe, elles ſe rapprochent & ſe rétabliſſent comme elles étoient auparavant ; leur adhérence de laquelle réſulte la cohéſion des corps, eſt, comme l'on ſait, un effet de leur attraction mutuelle. Lorſque l'on preſſe le reſſort, on ne détruit pas cette adhérence, parce que, quoiqu'on écarte les parties, on ne les éloigne pas aſſez les unes

tion ; on ne peut donc pas rapporter à l'impulſion les effets de l'attraction univerſelle ; mais c'eſt au contraire cette attraction générale qui produit, comme première cauſe, tous les phénomènes de l'impulſion.

En effet, doit-on jamais perdre de vue les bornes de la faculté que nous avons de communiquer avec la Nature ? Doit-on ſe perſuader que ce qui ne tombe pas ſous nos ſens, puiſſe ſe rapporter à ce que nous voyons ou palpons ? L'on ne connoît les forces qui animent l'univers, que par le mouvement & par ſes effets : ce mot, même de *forces*, ne ſignifie rien de

---

des autres pour les mettre hors de leur ſphère d'attraction mutuelle ; & par conſéquent, dès qu'on ceſſe de preſſer, cette force qu'on remet, pour ainſi dire, en liberté s'exerce, les parties ſéparées ſe rapprochent, & le reſſort ſe rétablit. Si, au contraire, par une preſſion trop forte, on écarte les parties cohérentes au point de les faire ſortir de leur ſphère d'attraction, le reſſort ſe rompt, parce que la force de la compreſſion a été plus grande que celle de la cohérence, c'eſt-à-dire, plus grande que celle de l'attraction mutuelle qui réunit ces parties. Le reſſort ne peut donc s'exercer, qu'autant que les parties de la matière ont de la cohérence, c'eſt-à-dire, autant qu'elles ſont unies par la force de leur attraction mutuelle, &, par conſéquent, le reſſort en général qui peut ſeul produire l'impulſion, & l'impulſion elle-même, ſe rapportent à la force d'attraction, & en dépendent comme un effet particulier d'un effet général. » Voyez auſſi le premier volume des ſuppléments à l'Hiſtoire Naturelle, édition *in*-4.°, page 2.

matériel & n'indique rien de ce qui peut affecter nos organes, qui cependant ſont nos ſeuls moyens de communication avec la Nature. Ne devons-nous pas renoncer dès-lors à vouloir mettre au nombre des ſubſtances matérielles, ces forces générales de l'attraction & de l'impulſion primitive, en les transformant, pour aider notre imagination, en matières ſubtiles, en fluides élaſtiques, en ſubſtances réellement exiſtantes, & qui, comme la lumière, la chaleur, le ſon & les odeurs devroient affecter nos organes; car ces rapports avec nous ſont les ſeuls attributs de la matière que nous puiſſions ſaiſir, les ſeuls que l'on doive regarder comme des agens méchaniques, & ces agens eux-mêmes ainſi que leurs effets, ne dépendent-ils pas, plus ou moins, & toujours, de la force primitive, dont l'origine & l'eſſence nous ſeront à jamais inconnues, parce que cette force en effet n'eſt pas une ſubſtance, mais une puiſſance qui anime la matière?

Tout ce que nous pouvons concevoir de cette puiſſance primitive d'attraction, & de l'impulſion ou répulſion qu'elle produit; c'eſt que la matière n'a jamais exiſté ſans mouvement, car l'attraction étant eſſentielle à tout atome matériel, cette force a néceſſairement produit du mouvement, toutes les fois que les parties de la matière ſe ſont trouvées ſéparées ou éloignées les unes des autres; elles ont dès-lors été

forcées de ſe mouvoir & de parcourir l'eſpace intermédiaire, pour s'approcher & ſe réunir. Le mouvement eſt donc auſſi ancien que la matière, & l'impulſion ou répulſion eſt contemporaine de l'attraction; mais, agiſſant en ſens contraire, elle tend à éloigner tout ce que l'attraction a rapproché.

Le choc, & toute violente attrition, entre les corps, produit du feu en diviſant & repouſſant les parties de la matière (*b*); & c'eſt de l'impulſion primitive que cet élément a tiré ſon origine; élément lequel ſeul eſt actif & ſert de baſe & de miniſtre à toute force impulſive, générale & particulière, dont les effets ſont toujours oppoſés & contraires à ceux de l'attraction univerſelle. Le feu ſe manifeſte dans toutes les parties de l'univers, ſoit par la lumière, ſoit par la chaleur; il brille dans le Soleil & dans les Aſtres fixes; il tient encore en incandeſcence les groſſes planètes; il échauffe plus ou moins les autres planètes & les comètes; il a auſſi pénétré, fondu, enflammé la matière de notre globe, lequel ayant ſubi l'action de ce feu primitif, eſt encore chaud; &, quoique cette chaleur s'évapore & ſe diſſipe ſans ceſſe, elle eſt néanmoins très-active & ſubſiſte en grande quantité, puiſque la température de l'intérieur de la terre, à une médiocre profondeur, eſt de plus de dix degrés.

(*b*) Supplément, tome I.er, pag. 8 & ſuiv.

C'eſt de ce feu intérieur ou de cette chaleur propre du globe que provient le feu particulier de l'électricité. Nous avons déjà dit, dans notre introduction à l'Hiſtoire des Minéraux, & tout nous le perſuade, que l'électricité tire ſon origine de cette chaleur intérieure du globe; les émanations continuelles de cette chaleur intérieure, s'élèvent perpendiculairement à chaque point de la ſurface de la terre; elles ſont bien plus abondantes à l'équateur que dans toutes les autres parties du globe. Aſſez nombreuſes dans le zones tempérées, elles deviennent nulles ou preſque nulles aux régions polaires, qui ſont couvertes par la glace ou reſſerrées par la gelée. Le fluide électrique, ainſi que les émanations qui le produiſent, ne peuvent donc jamais être en équilibre autour du globe; ces émanations doivent néceſſairement partir de l'équateur où elles abondent, & ſe porter vers les poles où elles manquent.

Ces courans électriques, qui partent de l'équateur & des régions adjacentes, ſe compriment & ſe reſſerrent, en ſe dirigeant à chaque pole terreſtre, à-peu-près comme les méridiens ſe rapprochent les uns des autres; dès-lors la chaleur obſcure, qui émane de la terre, & forme ces courans électriques, peut devenir lumineuſe en ſe condenſant dans un moindre eſpace, de la même manière que la chaleur obſcure de nos fourneaux devient lumineuſe, lorſqu'on la condenſe

en la tenant enfermée (*c*). Et c'eſt-là la vraie cauſe de ces feux qu'on regardoit autrefois comme des incendies céleſtes & qui ne ſont néanmoins que des effets électriques auxquels on a donné le nom d'aurores polaires. Elles ſont plus fréquentes dans les ſaiſons de l'automne & de l'hiver, parce que c'eſt le tems où les émanations de la chaleur de la terre ſont le plus complètement ſupprimées dans les zones froides, tandis qu'elles ſont toujours preſque également abondantes dans la zone torride ; elles doivent donc ſe porter alors avec plus de rapidité de l'équateur aux poles, & devenir lumineuſes par leur accumulation & leur reſſerrement dans un plus petit eſpace (*d*).

Mais ce n'eſt pas ſeulement dans l'atmoſphère & à la ſurface du globe que ce fluide électrique produit de grands effets ; il agit également & même avec

---

(*c*) Suppl. vol. 2, expériences ſur les effets de la chaleur obſcure.

(*d*) M. le Comte de la Cepède a publié, dans le Journal de phyſique de 1778, un Mémoire dans lequel il ſuit les mêmes vues, relatives à l'électricité, que nous avons données dans notre introduction à l'Hiſtoire des Minéraux, & rapporte l'origine des aurores boréales à l'accumulation du feu électrique qui part de l'équateur, & va ſe ramaſſer au-deſſus des contrées polaires. En 1779, on a lu, dans une des ſéances publiques de l'Académie des ſciences, un Mémoire de M. Franklin, dans lequel ce ſavant Phyſicien attribue auſſi la formation des aurores boréales au fluide électrique qui ſe porte & ſe condenſe au-deſſus des glaces des deux poles.

beaucoup

beaucoup plus de force à l'intérieur du globe, & ſur-tout dans les cavités qui ſe trouvent en grand nombre au-deſſous des couches extérieures de la terre ; il fait jaillir, dans tous ces eſpaces vides, des foudres plus ou moins puiſſantes : &, en recherchant les diverſes manières dont peuvent ſe former ces foudres ſouterraines, nous trouverons que les quartz, les jaſpes, les feldſpaths, les ſchorls, les granits & autres matières vitreuſes, ſont électriſables par frottement, comme nos verres factices, dont on ſe ſert pour produire la force électrique & pour iſoler les corps auxquels on veut la communiquer.

Ces ſubſtances vitreuſes doivent donc iſoler les amas d'eau qui peuvent ſe trouver dans ces cavités, ainſi que les débris des corps organiſés, les terres humides, les matières calcaires, & les divers filons métalliques. Ces amas d'eaux, ces matières métalliques, calcaires, végétales & humides, ſont, au contraire, les plus puiſſans conducteurs du fluide électrique. Lors donc qu'elles ſont iſolées par les matières vitreuſes, elles peuvent être chargées d'un excès plus ou moins conſidérable de ce fluide, de même qu'en ſont chargées les nuées environnées d'un air ſec qui les iſole.

Des courans d'eau, produits par des pluies, plus ou moins abondantes, ou d'autres cauſes locales & accidentelles, peuvent faire communiquer des matières conductrices, iſolées & chargées de fluide électrique,

avec d'autres ſubſtances de même nature, également iſolées, mais dans leſquelles ce fluide n'aura pas été accumulé ; alors ce fluide de feu doit s'élancer du premier amas d'eau vers le ſecond, & dès-lors, il produit la foudre ſouterraine dans l'eſpace qu'il parcourt. Les matières combuſtibles s'allument ; les exploſions ſe multiplient ; elles ſoulèvent & ébranlent des portions de terre d'une grande étendue, & des blocs de rochers en très-grande maſſe & en bancs continus; les vents ſouterrains, produits par ces grandes agitations, ſoufflent & ſe lancent, dès-lors avec violence, contre des ſubſtances conductrices de l'électricité, iſolées par des matières vitreuſes; ils peuvent donc auſſi électriſer ces ſubſtances de la même manière que nous électriſons, par le moyen de l'air fortement agité, des conducteurs iſolés, humides ou métalliques.

La foudre allumée par ces diverſes cauſes, & mettant le feu aux matières combuſtibles, renfermées dans le ſein de la terre, peut produire des volcans & d'autres incendies durables. Les matières enflammées dans leurs foyers, doivent en échauffant les ſchiſtes & les autres matières vitreuſes, de ſeconde formation, qui les contiennent & les iſolent, augmenter l'affinité de ces dernières ſubſtances avec le feu électrique ; elles doivent alors leur communiquer une partie de celui qu'elles poſsèdent, &, par conſéquent, devenir électriſées en moins. Et c'eſt par cette raiſon que lorſ-

que ces matières fondues, & rejetées par les volcans, coulent à la ſurface de la terre, ou qu'elles s'élèvent en colonnes ardentes au-deſſus des cratères, elles attirent le fluide électrique des divers corps qu'elles rencontrent, & même des nuages ſuſpendus au-deſſus; car l'on voit alors jaillir, de tous côtés, des foudres aériennes, qui s'élancent vers les matières enflammées, vomies par les volcans : & comme les eaux de la mer parviennent auſſi dans les foyers des volcans, & que la flamme eſt comme l'eau conductrice de l'électricité *(e)*, elles communiquent une grande quantité de fluide électrique aux matières enflammées & élec-

---

(*e*) « Il y a environ vingt ans que le nommé Aubert, faïancier à la tour d'Aigues, étant occupé à cuire une fournée de faïance, vit, « avec le plus grand étonnement, le feu s'éteindre dans l'inſtant même, « & paſſer d'un feu de ceriſe à l'obſcurité totale. Le four étoit allumé « depuis plus de vingt heures, & la vitrification de l'émail des pièces « étoit déjà avancée; il fit tous ſes efforts pour rallumer le feu, & « achever ſa cuite, mais inutilement. Il fut obligé de l'abandonner. »

« Je fus tout de ſuite averti de cet accident; je me tranſportai à ſa fabrique, où je vis ce four, effectivement obſcur, conſervant encore « toute ſa chaleur. »

« Il y avoit eu ce jour-là, vers les trois heures après-midi, un orage, duquel partit le coup de tonnerre, qui avoit produit l'effet « dont je viens de parler. L'on avoit vu du dehors la foudre; le faïancier « avoit entendu un coup qui n'avoit rien d'extraordinaire, ſans apper- « cevoir l'éclair ni la moindre clarté; rien n'étoit dérangé dans la cham- « bre du four, ni au toit. Le coup de tonnerre étoit entré par la *gueule* «

triſées en moins ; ce qui produit de nouvelles foudres, & cauſe d'autres ſecouſſes & des exploſions qui bouleverſent & entr'ouvrent la ſurface de la terre.

De plus, les ſubſtances vitreuſes qui forment les parois des cavités des volcans, & qui ont reçu une quantité de fluide électrique, proportionnée à la chaleur qui les a pénétrées, s'en trouvent ſurchargées à meſure qu'elles ſe refroidiſſent : elles lancent de nou-

---

» *de loup*, faite pour laiſſer échapper la fumée, & placée perpendicu-
» lairement ſur le four, avec une ouverture de plus de dix pieds
» quarrés. »

« Curieux de voir ce qui s'étoit paſſé dans l'intérieur du four, j'aſ-
» ſiſtai à ſon ouverture deux jours après ; il n'y avoit rien de caſſé, ni
» même de dérangé ; mais l'émail appliqué ſur toutes les pièces, étoit
» entièrement enfumé, & tacheté par-tout de points blancs & jaunes,
» ſans doute dûs aux parties métalliques, qui n'avoient point eu le tems
» d'entrer en fuſion. »

» Il eſt à croire que la foudre avoit paſſé à portée du feu qui l'avoit
» attirée & abſorbée, ſans qu'elle eût eu le tems ni le pouvoir d'é-
» clater. »

« Mais, pour connoître la force de cet effet, il eſt néceſſaire d'être
» inſtruit de la forme des fours en uſage dans nos Provinces, leſquels
» font une maſſe de feu bien plus conſidérable que ceux des autres
» pays, parce qu'étant obligé d'y cuire avec les fagots ou branches de
» pins ou de chênes verts, qui donnent un feu extrêmement ardent,
» on eſt forcé d'écarter le foyer du dépôt de la marchandiſe. »

« La flamme parcourt dans ces fours plus de ſix toiſes de longueur.
» Ils ſont partagés en trois pièces ; le corps du four, relevé ſur le terrein,

velles foudres contre les matières enflammées, & produiſent de nouvelles ſecouſſes qui ſe propagent à des diſtances plus ou moins grandes, ſuivant la diſpoſition des matières conductrices. Et comme le fluide électrique peut parcourir en un inſtant l'eſpace le plus vaſte, en ébranlant tout ce qui ſe trouve ſur ſon paſſage, c'eſt à cette cauſe que l'on doit rapporter les commotions & les tremblemens de terre qui ſe font ſentir, preſque dans le même inſtant, à de très-grandes

---

y eſt conſtruit entre deux voûtes, le deſſous eſt à moitié enterré, pour « mieux conſerver la chaleur, & il eſt précédé d'une voûte qui s'étend « juſqu'à la porte par laquelle l'on jette les fagots au nombre de trois « ou quatre à-la-fois. On a l'attention de laiſſer brûler ces fagots ſans en « fournir de nouveaux, juſqu'à ce que la flamme, après avoir circulé « dans tout le corps & s'être élevée, plus d'un pied, au ſommet du four, « ſoit abſolument tombée. »

« Le four, dans lequel tomba le tonnerre, eſt de huit pieds de largeur en quarré, ſur environ dix pieds de hauteur : le deſſous du four « a les mêmes dimenſions, mais il eſt élevé ſeulement de ſix pieds. On « l'emploie à cuire des biſcuits & le maſſicot, pour le blanc de la fournée « ſuivante ; quant à la gorge du four, elle eſt auſſi de ſix pieds de haut, « mais de largeur inégale, puiſque le four n'a pas quatre pieds de « largeur à ſon ouverture. Il eſt donc aiſé de conclure, que la force, « qui put, en un ſeul inſtant, anéantir une pareille maſſe ignée, dut « être d'une puiſſance étonnante. » *Extrait d'une lettre de M. de la Tour d'Aigues, Préſident à Mortier au Parlement de Provence, écrite à M. d'Aubenton, Garde du Cabinet du Roi, de l'Académie des Sciences, &c.*

diſtances ; car ſi l'on veut juger de la force prodigieuſe des foudres qui produiſent les tremblemens de terre les plus étendus, que l'on compare l'eſpace immenſe & d'un très-grand nombre de lieues, que les ſubſtances conductrices occupent quelquefois dans le ſein de la terre, avec les petites dimenſions des nuages qui lancent la foudre des airs, dont la force ſuffit cependant pour renverſer les édifices les plus ſolides.

On a vu le tonnerre renverſer des blocs de rochers de plus de vingt-cinq toiſes cubes : les conducteurs ſouterrains peuvent être au moins cinquante mille fois plus volumineux que les nuages orageux ; ſi leur force étoit en proportion, la foudre qu'ils produiſent pourroit donc renverſer plus de douze cens mille toiſes cubes ; & comme la chaleur intérieure de la terre eſt beaucoup plus grande que celle de l'atmoſphère à la hauteur des nuages, la foudre de ces conducteurs électriques doit être augmentée dans cette proportion, & dès-lors on peut dire que cette force eſt aſſez puiſſante pour bouleverſer & même projeter pluſieurs millions de toiſes cubes.

Maintenant ſi nous conſidérons le grand nombre de volcans actuellement agiſſans, & le nombre infiniment plus grand des anciens volcans éteints, nous reconnoîtrons qu'ils forment de larges bandes dans pluſieurs directions qui s'étendent autour du globe, & occupent des eſpaces d'une très-longue étendue dans

leſquels la terre a été bouleverſée, & s'eſt ſouvent affaiſſée au-deſſous, ou élevée au-deſſus de ſon niveau. C'eſt ſur-tout dans les régions de la zone torride que ſe ſont faits les plus grands changemens. On peut ſuivre la ruine des Continens terreſtres, & leur abaiſſement ſous les eaux, en parcourant les Iſles de la mer du Sud. On peut voir, au contraire, l'élévation des terres, par l'inſpection des montagnes de l'Amérique méridionale, dont quelques-unes ſont encore des volcans agiſſans : on retrouve les mêmes volcans dans les Iſles de la mer Atlantique, dans celles de l'Océan Indien & juſques dans les régions polaires, comme en Iſlande, en Europe & à la terre de Feu à l'extrémité de l'Amérique. La zone tempérée offre de même dans les deux hémiſphères, une infinité d'indices de volcans éteints ; & l'on ne peut douter que ces énormes exploſions auxquelles l'électricité ſouterraine a la plus grande part, n'aient très-anciennement bouleverſé les terres à la ſurface du globe, à une aſſez grande profondeur, dans une étendue de pluſieurs centaines de lieues en différens ſens.

M. Faujas de Saint-Fonts, l'un de nos plus ſavans naturaliſtes, a entrepris de donner la carte de tous les terrains volcaniſés qui ſe voient à la ſurface du globe, & dont on peut ſuivre le cours ſous les eaux de la mer, par l'inſpection des Iſles, des écueils & autres fonds volcaniſés. Cet infatigable & bon obſer-

vateur, a parcouru tous les terrains qui offrent en Europe des indices du feu volcanique, & il a extrait des voyageurs les renſeignemens, ſur cet objet, dans toutes les parties du monde; il a bien voulu me fournir des notes, en grand nombre, ſur tous les volcans de l'Europe, qu'il a lui-même obſervés; j'ai cru devoir en préſenter ici l'extrait, qui ne pourra que confirmer tout ce que nous avons dit ſur les cauſes & les effets de ces feux ſouterrains.

En prenant le volcan brûlant du Mont-Hecla, en Iſlande, pour point de départ, on peut ſuivre, ſans interruption, une aſſez large zone entièrement volcaniſée, où l'obſervateur ne perd jamais de vue, un ſeul inſtant, les laves de toute eſpèce. Après avoir parcouru cette Iſle, qui n'eſt qu'un amas de volcans éteints, adoſſés contre la montagne principale, dont les flancs ſont encore embraſés, ſuppoſons qu'il s'embarque à la pointe de l'Iſle qui porte le nom de *Long-Nés*. Il trouvera ſur ſa route *Veſterhorn*, *Portland* & pluſieurs autres Iſles volcaniques; il viſitera celles de *Stromo*, remarquables par ſes grandes chauſſées de bazalte, & enſuite les Iſles de Féroé, où les laves & les baſaltes ſe trouvent mêlés de zéolites. Depuis Féroé il ſe portera ſur les Iſles de *Shetland*, qui ſont toutes volcaniſées, & de-là aux Iſles Orcades, leſquelles paroiſſent s'être élevées en entier d'une mer de feu. Les Orcades ſont comme adhérentes aux Iſles Hébrides.

C'eſt

C'eſt dans cet archipel que ſe trouvent celles de Saint-Kildaski, Jona, Lyri, Ilikenkil, la vaſte & ſingulière caverne baſaltique de Staffa, connue ſous le nom de grotte de Fingal, l'Iſle de Mull qui n'eſt qu'un compoſé de baſalte, pétri, pour ainſi dire, avec de la zéolite.

De l'Iſle de Mull, on peut aller en Ecoſſe par celle de Kereyru, également volcaniſée, & arriver à Don Staffugé ou à Dunkel, ſur les laves & les baſaltes que l'on peut ſuivre ſans interruption par le Duché d'Inverery, par celui de Perth, par Glaſcou, juſqu'à Édimbourg. Ici les volcans ſemblent avoir trouvé des bornes qui les ont empêché d'entrer dans l'Angleterre proprement dite, mais ils ſe ſont repliés ſur eux-mêmes; on les ſuit ſans interruption & ſur une aſſez large zone qui s'étend depuis Dumbar, Cuperg, Stirling, juſqu'au bord de la mer, vers Port-Patrick. L'Irlande eſt en face, & l'on trouve à une petite diſtance les écueils du canal Saint-Georges, qui ſont auſſi volcaniſés; l'on touche bientôt à cette immenſe colonnade, connue ſous le nom de Chauſſée des géans, & formant une ceinture de baſalte priſmatique, qui rend l'abord de l'Irlande preſque inacceſſible de ce côté.

En France, on peut reconnoître des volcans éteints en Bretagne, entre Royan & Tréguier, & les ſuivre dans une partie du Limouſin, & en Auvergne, où ſe ſont faits de très-grands mouvemens, & de fortes

éruptions de volcans actuellement éteints ; car les montagnes, les pics, les collines de basalte & de lave y sont si rapprochés, si accumulés, qu'ils offrent un système bizarre & disparate, très-différent de la disposition & de l'arrangement de toutes les autres montagnes. Le Mont-d'Or, & le Puis de Dôme peuvent être regardés comme autant de volcans principaux qui dominoient sur tous les autres.

Les villes de Clermont, de Riom, d'Issoire, ne sont bâties qu'avec des laves, & ne reposent que sur des laves. Le cours de ces terrains volcanisés, s'étend jusqu'au-delà de l'Allier, & on en voit des indices dans une partie du Bourbonnois, & jusques dans la Bourgogne, auprès du Mont-Cenis, où l'on a reconnu le Pic conique de Drevin, formé par un faisceau de basalte, qui s'élève en pointe à trois cens pieds de hauteur, & forme une grande borne, qu'on peut regarder comme la limite du terrain volcanisé. Ces mêmes volcans d'Auvergne s'étendent, d'un côté, par Saint-Flour & Aurillac, jusqu'en Rouergue, & de l'autre, dans le Vélay ; & en remontant la Loire jusqu'à sa source, parmi les laves, nous arriverons au Mont-Mezine, qui est un grand volcan éteint, dont la base a plus de douze lieues de circonférence, & dont la hauteur s'élève au-dessus de neuf cens toises. Le Vivarais est attenant au Vélay, & l'on y voit un très-grand nombre de cratères de volcans éteints, &

des chauſſées de baſaltes, que l'on peut ſuivre dans leur largeur juſqu'à Rochemaure, au bord du Rhône, en face de Montélimar : mais leur développement, en longueur, s'étend par Caſſan, Saint-Tibéri, juſqu'à Agde, où la montagne volcanique de Saint-Loup, offre des eſcarpemens de lave, d'une grande épaiſſeur & d'une hauteur très-conſidérable.

Il paroît qu'auprès d'Agde, les laves s'enfoncent ſous la mer, mais on ne tarde pas à les voir reparoître entre Marſeille & Toulon, où l'on connoît le volcan d'Ollioule, & celui des environs de Tourves. De grands dépôts calcaires ont recouvert poſtérieurement pluſieurs de ces volcans ; mais on en voit dont les ſommités paroiſſent ſortir du milieu de ces antiques dépouilles de la mer ; ceux des environs de Fréjus & d'Antibes, ſont de ce nombre.

Ici les Alpes maritimes ont ſervi de barrière aux feux ſouterrains de la Provence, & les ont, pour ainſi dire, empêchés de ſe joindre à ceux de l'Italie, par la voie la plus courte ; car, derrière ces mêmes alpes, il ſe trouve des volcans, qui, en ligne droite, ne ſont éloignés que de trente lieues de ceux de Provence.

La zone incendiée a donc pris une autre route ; on peut même dire qu'elle a une double direction en partant d'Antibes. La première arrive, par une communication ſous-marine, en Sardaigne ; elle coupe le Cap Carbonaira, traverſe les montagnes de cette Iſle, ſe

replonge ſous les eaux pour reparoître à Carthagène, & ſe joindre à la chaîne volcaniſée du Portugal, juſqu'à Liſbonne, pour traverſer enſuite une partie de l'Eſpagne, où M. Bouls a reconnu pluſieurs volcans éteints. Telle eſt la première ligne de jonction des volcans de France.

La ſeconde ſe dirige également par la mer, & va joindre l'Italie, entre Gênes & Florence. On entre ici dans un des plus vaſtes domaines du feu; l'incendie a été preſque univerſel dans toute l'Italie & la Sicile, où il exiſte encore deux volcans brûlans, le Véſuve & l'Etna, des terrains embraſés, tels que la Solfatera, des Iſles incendiées, dont une, celle de Stromboli, vomit ſans relâche, & dans tous les tems, des laves, des pierres ponces, & jette des flammes qui éclairent la mer au loin.

Le Véſuve nous offre un foyer en activité couronné, & recouvert, de toutes parts, des produits les plus remarquables du feu, & juſqu'à des Villes enſevelies à dix-huit cens pieds de profondeur, ſous les matières projetées par le volcan : d'un côté, la mer nous montre les Iſles volcaniſées, d'*Iſchia*, de *Procida*, de *Caprée*, &c. & de l'autre, le Continent nous offre la pointe de *Miſſene*, *Baye*, *Pouzzoles*, le *Pauſilipo*, *Portici*, la *côte de Sorento*, le *Cap de Minerve*.

Le *Lac Agnano*, *Caſtrani*, *le Monté-Novo*, *le Monté-Barbaro*, *la Solfatera*, ſont autant de cratères qui ont

vomi, pendant plusieurs siècles, des monceaux immenses de matières volcaniques.

Mais une chose digne de remarque, c'est que les volcans des environs de Naples & de la terre de Labour, comme les autres volcans dont nous venons de parler, semblent toujours éviter les montagnes primitives, quartreuses & granitiques, & c'est par cette raison qu'ils n'ont point pris leur direction par la Calabre, pour aller gagner la Sicile. Les grands courans de laves se sont frayé une route sous les eaux de la mer, & arrivent, du golfe de Naples, le long de la côte de Sorente, paroissant à découvert sur le rivage, & formant des écueils de matières volcaniques, qu'on voit de distance en distance, depuis le promontoire de Minerve, jusques aux Isles de Lipari. Les Isles de *Baziluzzo*, les *Cabianca*, *les Canera*, *Panaria*, &c. sont sur cette ligne. Viennent ensuite l'Isle *des Salines*, celles *de Lipari*, *Volcanello*, & *Volcano*, autre volcan brûlant, où les feux souterrains fabriquent, en grand, de grosses masses de véritables pierres ponces. En Sicile, les Monts-Neptuniens, comme les Alpes en Provence, ont forcé les feux souterrains à suivre leurs contours, & à prendre leur direction par le *Val Demona*. Dans cette Isle, l'Etna élève fièrement sa tête au-dessus de tous les volcans de l'Europe; les éjections qu'a produit ce foyer immense, coupent le *Val de Noto* & arrivent à l'extrémité de la Sicile, par le *Cap Passaro*.

Les matières volcaniques disparoissent encore ici sous les eaux de la mer, mais les écueils de basalte qu'on voit de distance en distance, sont des signaux évidens qui tracent la route de l'embrasement; on peut arriver, sans s'en écarter, jusqu'à l'Archipel, où l'on trouve *Santorini* & les autres volcans qu'un observateur célèbre a fait connoître dans son voyage pittoresque de la Grèce *(f)*.

De l'Archipel on peut suivre par la Dalmatie, les volcans éteints, décrits par M. Fortis, jusqu'en Hongrie, où l'on trouve ceux qu'a fait connoître M. de Born dans ses lettres sur la minéralogie de ce Royaume. De la Hongrie, la chaîne volcanisée se prolonge toujours sans interruption par l'Allemagne, & va joindre les volcans éteints d'Hannovre, décrits par Raspe; ceux-ci se dirigent sur Cassel, ville bâtie sur un vaste plateau de basalte; les feux souterrains qui ont élevé toutes les collines volcaniques des environs de Cassel, ont porté leur direction, par le grand cordon des hautes montagnes volcanisées de *l'Habichoual*, qui vont joindre le Rhin par Andernach, où les Hollandois font leur approvisionnement de *tras (g)* pour le convertir en pouzzolane; les bords du Rhin, depuis Andernach

---

(*f*) M. le Comte de Choiseul-Gouffier.

(*g*) Le *tras* est un vrai basalte compacte ou poreux, facile à broyer, & dont les Hollandois font de la pouzzolane.

juſqu'au vieux Briſſac, forment la continuité de la zone volcaniſée, qui traverſe le Briſgau & ſe rapproche par-là de la France, du côté de Straſbourg.

D'après ce grand tableau des ravages du feu dans la partie du monde qui nous eſt la mieux connue, pourroit-on ſe perſuader, ou même imaginer qu'il ait pu exiſter d'aſſez grands amas de matières combuſtibles, pour avoir alimenté pendant des ſiècles de ſiècles, des volcans multipliés en auſſi grand nombre ? Cela ſeul ſuffiroit pour nous indiquer que la plupart des volcans actuellement éteints, n'ont été produits que par les foudres de l'électricité ſouterraine. Nous venons de voir, en effet, que les Pyrénées, les Alpes, l'Apennin, les Monts-Neptuniens en Sicile, le Mont-Granby en Angleterre, & les autres montagnes primitives, quarteuſes & granitiques, ont arrêté le cours des feux ſouterrains, comme étant par leur Nature vitreuſe, imperméables au fluide électrique, dont ils ne peuvent propager l'action, ni communiquer les foudres; & qu'au contraire tous les volcans produits par les feux ou les tonnerres ſouterrains, ne ſe trouvent qu'aux environs de ces montagnes primitives, & n'ont exercé leur action que ſur les ſchiſtes, les argiles, les ſubſtances calcaires & métalliques, & les autres matières de ſeconde formation & conductrices de l'électricité. Et comme l'eau eſt un des plus puiſſans conducteurs du fluide électrique, ces volcans ont agi avec

d'autant plus de force, qu'ils ſe ſont trouvés plus près de la mer, dont les eaux, en pénétrant dans leurs cavités, ont prodigieuſement augmenté la maſſe des ſubſtances conductrices, & l'action de l'électricité. Mais, jetons encore un coup-d'œil ſur les autres différences remarquables qu'on peut obſerver dans la continuité des terrains volcaniſés.

L'une des premières choſes qui s'offrent à nos conſidérations, c'eſt cette immenſe continuité de baſaltes & de laves, leſquels s'étendent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des terrains volcaniſés. Ces baſaltes & ces laves contenant une très-grande quantité de matières ferrugineuſes, doivent être regardés comme autant de conducteurs de l'électricité; ce ſont, pour ainſi dire, des barres métalliques, c'eſt-à-dire, des conducteurs à pluſieurs centaines de lieues du fluide électrique, & qui peuvent le tranſmettre en un inſtant, de l'une à l'autre de leurs extrémités, tant à l'intérieur de la terre qu'à ſa ſurface. L'on doit donc rapporter, à cette cauſe, les commotions & tremblemens de terre qui ſe font ſentir, preſque en même-tems, à des diſtances très-éloignées.

Une ſeconde conſidération très-importante, c'eſt que tous les volcans, & ſur-tout ceux qui ſont encore actuellement agiſſans portent ſur des cavités, dont la capacité eſt au moins égale au volume de leurs projections; le Monte-Nuovo, voiſin du Véſuve, s'eſt élevé preſque ſubitement,

ſubitement, c'eſt-à-dire, en deux ou trois jours dans l'année 1538, à la hauteur de plus de mille pieds, ſur une circonférence de plus d'une lieue à la baſe; & cette énorme maſſe ſortie des entrailles de la terre, dans un terrain qui n'étoit qu'une plaine, a néceſſairement laiſſé des cavités au moins égales à ſon volume; de même, il y a toute raiſon de croire que l'Etna dont la hauteur eſt de plus de dix-huit cens toiſes, & la circonférence à la baſe de près de cinquante lieues, ne s'eſt élevé que par la force des foudres ſouterraines, & que, par conſéquent, cette très-énorme maſſe de matière projetée porte ſur pluſieurs cavités, dont le vide eſt au moins égal au volume ſoulevé. On peut encore citer les Iſles de Santorin, qui, depuis l'année 237, avant notre Ere, ſe ſont abîmées dans la mer, & élevées au-deſſus de la terre à pluſieurs repriſes, & dont les dernières cataſtrophes ſont arrivées en 1707. Tout l'eſpace, dit « M. le Comte de Choiſeul-Gouffier, actuellement rempli « par la mer, & contenu entre Santorin & Théréſia, « aujourd'hui Aſpronyzi, faiſoit partie de la grande Iſle, « ainſi que Théréſia elle-même. Un immenſe volcan « s'eſt allumé, & a dévoré toutes les parties intermé- « diaires. Je retrouve dans toute la côte de ce golfe, « compoſée de rochers eſcarpés & calcinés, les bords de « ce même foyer, &, ſi j'oſe le dire, les parois internes « du creuſet, où cette deſtruction s'eſt opérée; mais ce «

» qu'il faut ſur-tout remarquer, c'eſt l'immenſe pro-» fondeur de cet abîme, dont on n'a jamais pu réuſſir à trouver le fond. »

Enfin nous devons encore obſerver, en général, que le Véſuve, l'Etna & les autres volcans, tant agiſſans qu'éteints, ſont entourés de collines volcaniques, projetées par les feux ſouterrains, & qui ont dû laiſſer à leur place des cavités égales à leur volume. Ces collines compoſées de laves & de matières fondues ou projetées, ſont connues en Italie, ſous le nom de Monticolli, & elles ſont ſi multipliées dans le Royaume de Naples, que leurs baſes ſe touchent en beaucoup d'endroits. Ainſi, le nombre des cavités ou bourſoufflures du globe, formées par le feu primitif, a dû diminuer par les affaiſſemens ſucceſſifs des cavernes, dont les eaux auront percé les voûtes, tandis que les feux ſouterrains ont produit d'autres cavités, dont nous pouvons eſtimer la capacité par le volume des matières projetées, & par l'élévation des montagnes volcaniques.

Je ſerois même tenté de croire que les montagnes volcaniques des Cordillières, telles que Chimboraço, Cottopaxi, Pichencha, Sangaï, &c. dont les feux ſont actuellement agiſſans, & qui s'élèvent à plus de trois mille toiſes, ont été ſoulevées à cette énorme hauteur par la force de ces feux, puiſque l'Etna nous offre un exemple d'un pareil ſoulèvement juſqu'à la hauteur de 1800 toiſes, & dès-lors ces montagnes volcani-

ques des Cordillières, ne doivent point être regardées comme des bourſoufflures primitives du globe, puiſqu'elles ne ſont compoſées ni de quartz, ni de granit, ni d'autres matières vitreuſes qui auroient arrêté l'effet des foudres ſouterraines, de même qu'en Europe nous voyons les Alpes & les Pyrénées avoir arrêté & rompu tous les efforts de cette électricité. Il en doit être de même des montagnes volcaniques du Mexique & des autres parties du monde, où l'on trouve des volcans encore agiſſans.

A l'égard des volcans éteints, quoiqu'ils aient tous les caractères des volcans actuellement brûlans, nous remarquerons que les uns, tels que le Pui de Dome, qui a plus de 800 toiſes d'élévation, le Cantal en Auvergne, qui en a près de mille, & le Mont-Mezin en Vivarais, dont la hauteur eſt à-peu-près égale à celle du Cantal, doivent avoir des cavités au-deſſous de leurs baſes, & que d'autres ſe ſont en partie éboulés depuis qu'ils ont ceſſé d'agir; cette différence ſe remarque par celle de la forme de leurs bouches ou cratères. Le Mont-Mezin, le Cantal, le colet d'Aiſa, la coupe de Sauſac, la Gravène de Mont-Peſat, préſentent tous des cratères d'une entière conſervation, tandis que d'autres n'offrent qu'une partie de leurs bouches en entonnoir qui ſubſiſte encore, & dont le reſte s'eſt affaiſſé dans des cavités ſouterraines.

Mais le principal & le plus grand réſultat que

nous puiſſions tirer de tous ces faits, c'eſt que l'action des foudres & des feux ſouterrains, ayant été aſſez violente pour élever dans nos zones tempérées des montagnes telles que l'Etna, juſqu'à dix-huit cens toiſes de hauteur, nous devons ceſſer d'être étonnés de l'élévation des montagnes volcaniques des Cordillières juſqu'à trois mille toiſes. Deux fortes raiſons me perſuadent de la vérité de cette préſomption. La première, c'eſt que le globe étant plus élevé ſous l'équateur, a dû, dès le premier tems de ſa conſolidation, former des bourſoufflures & des cavités beaucoup plus grandes dans les parties équatoriales que dans les autres zones, & que, par conſéquent, les foudres ſouterraines auront exercé leur action avec plus de liberté & de puiſſance dans cette région, dont nous voyons en effet que les affaiſſemens ſous les eaux, & les élévations au-deſſus de la terre ſont plus grandes que par-tout ailleurs; parce que indépendamment de l'étendue plus conſidérable des cavités, la chaleur intérieure du globe, & celle du ſoleil ont dû augmenter encore la puiſſance des foudres & des feux ſouterrains.

La ſeconde raiſon plus déciſive encore que la première, c'eſt que ces volcans, dans les Cordillières, nous démontrent qu'elles ne ſont pas de première formation, c'eſt-à-dire, entièrement compoſées de matières vitreuſes, quartzeuſes ou granitiques, puiſque nous ſommes aſſurés, par la continuité des terrains volca-

niques, dans l'Europe entière, que jamais les foudres ſouterraines n'ont agi contre ces matières primitives, & qu'elles en ont par-tout ſuivi les contours ſans les entamer, parce que ces matières vitreuſes, n'étant point conductrices de l'électricité, n'ont pu en ſubir ni propager l'action. Il eſt donc à préſumer que toutes les montagnes volcaniques, ſoit dans les Cordillières, ſoit dans les autres parties du monde, ne ſont pas de première formation, mais ont été projetées ou ſoulevées par la force des foudres & des feux ſouterrains, tandis que les autres montagnes dans leſquelles, comme aux Alpes & aux Pyrénées, &c. l'on ne voit aucun indice de volcan, ſont en effet les montagnes primitives, compoſées de matières vitreuſes, qui ſe refuſent à toute action de l'électricité.

Nous ne pouvons donc pas douter que la force de l'électricité n'ait agi en toute liberté, & n'ait fait de violentes exploſions dans les cavités ou bourſoufflures occaſionnées par l'action du feu primitif; en ſorte qu'on doit préſumer, avec fondement, qu'il a exiſté des volcans dès ces premiers tems, & que ces volcans n'ont pas eu d'autres cauſes que l'action des foudres ſouterraines. Ces premiers & plus anciens volcans, n'ont été, pour ainſi dire, que des exploſions momentanées, & dont le feu n'étant pas nourri par les matières combuſtibles, n'ont pu ſe manifeſter par des effets durables; ils ſe ſont, pour ainſi dire, éteints après leur exploſion,

qui néanmoins a dû projeter toutes les matières que la foudre avoit frappées & déplacées. Mais, lorſque dans la ſuite, les eaux, les ſubſtances métalliques, & autres matières volatiles ſublimées par le feu, & reléguées dans l'atmoſphère, ſont tombées & ſe ſont établies ſur le globe, ces ſubſtances, toutes conductrices de l'électricité, ont pu s'accumuler dans les cavernes ſouterraines. Les végétaux s'étant dès-lors multipliés ſur les hauteurs de la terre, & les coquillages s'étant en même-tems propagés, & ayant pullulé au point de former par leurs dépouilles de grands amas de matières calcaires, toutes ces matières conductrices ſe ſont de même raſſemblées dans ces cavités intérieures, & dès-lors l'action des foudres électriques a dû produire des incendies durables, & d'autant plus violens, que ces volcans ſe ſont trouvés plus voiſins des mers dont les eaux par leur conflict avec le feu ont encore augmenté la force & la durée des exploſions; & c'eſt par cette raiſon que le pied de tous les volcans, encore actuellement agiſſans, ſe trouve voiſin des mers, & qu'il n'en exiſte pas dans l'intérieur des Continens terreſtres.

On doit donc diſtinguer deux ſortes de volcans; les premiers, ſans alimens, & uniquement produits par la force de l'électricité ſouterraine; les ſeconds, alimentés par les ſubſtances combuſtibles. Les premiers de tous les volcans n'ont été que des exploſions momentanées

dans le tems de la conſolidation du globe. Ces exploſions peuvent nous être repréſentées en petit, par les étincelles que lance un boulet de fer rougi à blanc, en ſe refroidiſſant. Elles ſont devenues plus violentes & plus fréquentes par la chûte des eaux, dont le conflict avec le feu a dû produire de plus fortes ſecouſſes & des ébranlemens plus étendus. Ces premiers & plus anciens volcans, ont laiſſé des bouches ou cratères, autour deſquels ſe trouvent des laves, & autres matières fondues par les foudres, de la même manière que la force électrique miſe en jeu par nos foibles inſtrumens, fond ou calcine toutes les matières ſur leſquelles elle eſt dirigée.

Il y a donc toute apparence que, dans le nombre infini de volcans éteints qui ſe trouvent à la ſurface de la terre, la plupart doivent être rapportés aux premières époques des révolutions du globe après ſa conſolidation, pendant leſquelles ils n'ont agi que par momens & par l'effet ſubit des foudres ſouterraines, dont la violence a ſoulevé les montagnes & entr'ouvert les premières couches de la terre, avant que la Nature n'eût produit aſſez de végétaux, de pyrites & d'autres ſubſtances combuſtibles pour ſervir d'aliment aux volcans durables, tels que ceux qui ſont encore actuellement agiſſans.

Ce ſont auſſi ces foudres électriques ſouterraines qui cauſent la plupart des tremblemens de terre. Je

dis, la plupart, car la chûte & l'affaiſſement ſubit des cavernes intérieures du globe, produiſent auſſi des mouvemens qui ne ſe font ſentir qu'à de petites diſtances; ce ſont plutôt des trépidations que de vrais tremblemens, dont les plus fréquens & les plus violens, doivent ſe rapporter aux commotions produites par les foudres électriques, puiſque ces tremblemens ſe font ſouvent ſentir, preſqu'au même moment, à plus de cent lieues de diſtance & dans tout l'eſpace intermédiaire. C'eſt le coup électrique qui ſe propage ſubitement, & auſſi loin que s'étendent les corps qui peuvent lui ſervir de conducteurs. Les ſecouſſes occaſionnées par ces tonnerres ſouterrains, ſont quelquefois aſſez violentes pour bouleverſer les terres en les élevant ou les abaiſſant, & changer en même-tems la poſition des ſources & la direction du cours des eaux.

Lorſque cette force de l'électricité agit à la ſurface du globe, elle ne ſe manifeſte pas uniquement par des foudres, par des commotions & par les autres effets que nous venons d'expoſer. Elle paroît changer de Nature, & produit de nouveaux phénomènes. En effet, elle ſe modifie pour donner naiſſance à une nouvelle force à laquelle on a donné le nom de magnétiſme; mais le magnétiſme bien moins général que l'électricité, n'agit que ſur les matières ferrugineuſes, & ne ſe montre que par les effets de l'Aimant & du fer,

fer, leſquels ſeuls peuvent fléchir & attirer une portion du courant univerſel & électrique, qui ſe porte directement & en ſens contraire, de l'équateur aux deux poles.

Telle eſt donc l'origine des diverſes forces, tant générales que particulières, dont nous venons de parler. L'attraction, en agiſſant en ſens contraire de ſa direction, a produit l'impulſion dès l'origine de la matière. Cette impulſion a fait naître l'élément du feu qui a produit l'électricité; & nous allons voir que le magnétiſme n'eſt qu'une modification particulière de cette électricité générale, qui ſe fléchit dans ſon cours vers les matières ferrugineuſes.

Nous ne connoiſſons toutes ces forces que par leurs effets; les uns ſont conſtans & généraux, les autres paroiſſent être variables & particuliers. La force d'attraction eſt univerſellement répandue, elle réſide dans tout atome de matière & s'étend dans le ſyſtême entier de l'univers, tandis que celle qui produit l'électricité agit à l'intérieur & s'étend à la ſurface du globe terreſtre, mais n'affecte pas tous les corps de la même manière. Néanmoins cette force électrique eſt encore plus générale que la force magnétique, qui n'appartient à aucune autre ſubſtance qu'à l'Aimant & au fer.

Ces deux forces particulières ont des propriétés communes avec celles de l'attraction univerſelle. Toutes

trois agiſſent à plus ou moins de diſtance, & les effets du magnétiſme & de l'électricité, ſont toujours combinés avec l'effet général de l'attraction qui appartient à toute matière, & qui, par conſéquent, influe néceſſairement ſur l'action de ces deux forces, dont les effets comparés entre eux, peuvent être ſemblables ou différens, variables ou conſtans, fugitifs ou permanens, & ſouvent paroître oppoſés ou contraires à l'action de la force univerſelle. Car, quoique cette force d'attraction s'exerce ſans ceſſe en tout & par-tout, elle eſt vaincue par celle de l'électricité & du magnétiſme, toutes les fois que ces forces agiſſent avec aſſez d'énergie, pour ſurmonter l'effet de l'attraction qui n'eſt jamais que proportionnel à la maſſe des corps.

Les effets de l'électricité & du magnétiſme, ſont produits par des forces impulſives particulières, qu'on ne doit point aſſimiler à l'impulſion ou répulſion primitive; celle-ci s'exerce dans l'eſpace vide, & n'a d'autre cauſe que l'attraction qui force toute matière à ſe rapprocher pour ſe réunir. L'électricité & le magnétiſme ſuppoſent, au contraire, des impulſions particulières, cauſées par un fluide actif, qui environne les corps électriques & magnétiques, & qui doit les affecter différemment ſuivant leur différente nature.

Mais quel eſt ou peut être l'agent ou le moyen employé par la Nature, pour déterminer & fléchir

l'électricité du globe en magnétiſme vers le fer, de préférence à toute autre maſſe minérale ou métallique? Si les conjectures, ou même de ſimples vues, ſont permiſes ſur un objet qui, par ſa profondeur & ſon ancienneté contemporaine des premières révolutions de la terre, ſemble devoir échapper à nos regards & même à l'œil de l'imagination, nous dirons que la matière ferrugineuſe, plus difficile à fondre qu'aucune autre, s'eſt établie ſur le globe, avant toute autre ſubſtance métallique, & que dès-lors elle fut frappée la première, & avec le plus de force & de durée par les flammes du feu primitif; elle dut donc en contracter la plus grande affinité avec l'élément du feu; affinité qui ſe manifeſte par la combuſtibilité du fer & par la prodigieuſe quantité d'air inflammable ou feu fixe qu'il rend dans ſes diſſolutions; & par conſéquent de toutes les matières que l'électricité du globe peut affecter, le fer comme ayant ſpécialement plus d'affinité avec ce fluide de feu, & avec les forces dont il eſt l'ame, en reſſent & marque mieux tous les mouvemens, tant de direction que d'inflexion particulière, dont néanmoins les effets ſont tous ſubordonnés à la grande action & à la direction générale du fluide électrique de l'équateur vers les poles.

Car il eſt certain que s'il n'y avoit point de fer ſur la terre, il n'y auroit ni Aimant ni magnétiſme, & que la force électrique n'en exiſteroit ni ne ſub-

ſiſteroit pas moins, avec ſa direction conſtante & générale de l'équateur aux poles; & il eſt tout auſſi certain que le cours de ce fluide ſe fait en deux ſens oppoſés, c'eſt-à-dire, de l'équateur aux deux poles terreſtres, en ſe reſſerrant & s'inclinant, comme les méridiens ſe reſſerrent & s'inclinent ſur le globe; & l'on voit ſeulement que la direction magnétique, quoique ſoumiſe à cette grande loi, reçoit des inflexions dépendantes de la poſition des grandes maſſes de matières ferrugineuſes, & de leur giſſement dans les différens continens.

En comparant les effets de l'action d'une petite maſſe d'Aimant, avec ceux que produit la maſſe entière du globe terreſtre, il paroît que ce globe poſsède, en grand, toutes les propriétés dont les Aimans ne jouiſſent qu'en petit. Cependant la maſſe du globe entier n'eſt pas, comme les petites maſſes de l'Aimant, compoſée de matières ferrugineuſes; mais on peut dire que ſa ſurface entière eſt mêlée d'une grande quantité de fer magnétique, puiſque toutes les mines primitives ſont attirables à l'Aimant, & que de même les baſaltes, les laves & toutes les mines ſecondaires revivifiées par le feu & par les coups de la foudre ſouterraine, ſont également magnétiques. C'eſt cette continuité de matière ferrugineuſe magnétique, ſur la ſurface de la terre qui a produit le magnétiſme général du globe, dont les effets ſont ſemblables à ceux

du magnétiſme particulier d'une pierre d'Aimant. Et c'eſt de l'électricité générale du globe, que provient l'électricité particulière ou magnétiſme de l'Aimant. D'ailleurs la force magnétique n'ayant d'action que ſur la matière ferrugineuſe, ce ſeroit méconnoître la ſimplicité des loix de la Nature, que de la charger d'un petit procédé ſolitaire, & d'une force iſolée qui ne s'exerceroit que ſur le fer. Il me paroît donc démontré que le magnétiſme, qu'on regardoit comme une force particulière & iſolée, dépend de l'électricité dont il n'eſt qu'une modification occaſionnée par le rapport unique de ſon action avec la Nature du fer.

Et même, quoique le magnétiſme n'appartienne qu'à la matière ferrugineuſe, on ne doit pas le regarder comme une des propriétés eſſentielles de cette matière, car ce n'eſt qu'une ſimple qualité accidentelle que le fer acquiert ou qu'il perd, ſans aucun changement & ſans augmentation ni déperdition de ſa ſubſtance. Toute matière ferrugineuſe qui aura ſubi l'action du feu, prendra du magnétiſme par le frottement, par la percuſſion, par tout choc, toute action violente de la part des autres corps; encore n'eſt-il pas néceſſaire d'avoir recours à une force extérieure pour donner au fer cette vertu magnétique, car il la prend auſſi de lui-même, ſans être ni frappé, ni mu, ni frotté; il la prend dans l'état du plus parfait repos, lorſqu'il reſte

conſtamment dans une certaine ſituation, expoſé à l'action du magnétiſme général, car dès-lors il devient Aimant en aſſez peu de tems. Cette force magnétique peut donc agir ſur le fer, ſans être aidée d'aucune autre force motrice, &, dans tous les cas, elle s'en ſaiſit ſans en étendre le volume, & ſans en augmenter ni diminuer la maſſe.

Nous avons parlé de l'Aimant, comme des autres matières ferrugineuſes, dans notre Hiſtoire des Minéraux à l'article du fer; mais nous nous ſommes réſervé d'examiner de plus près ce minéral magnétique qui, quoiqu'auſſi brut qu'aucun autre, ſemble tenir à la Nature active & ſenſible des êtres organiſés; l'attraction, la répulſion de l'Aimant, ſa direction vers les poles du monde, ſon action ſur les corps animés, & la faculté qu'il a de communiquer toutes ſes propriétés ſans en perdre aucune, ſans que ſes forces s'épuiſent, & même ſans qu'elles ſubiſſent le moindre affoibliſſement, toutes ces qualités réunies ou ſéparées paroiſſent être autant de vertus magiques, & ſont au moins des attributs uniques, des ſingularités de Nature d'autant plus étonnantes qu'elles ſemblent être ſans exemple, & que, n'ayant été juſqu'ici que mal connues & peu comparées, on a vainement tenté d'en deviner les cauſes.

Les Philoſophes anciens, plus ſages, quoique moins inſtruits que les modernes, n'ont pas eu la vaine pré-

tention de vouloir expliquer, par des cauſes méchaniques tous les effets de la Nature, & lorſqu'ils ont dit que l'Aimant avoit des affections d'amour & de haine, ils indiquoient ſeulement, par ces expreſſions, que la cauſe de ces affections de l'Aimant, devoit avoir quelque rapport avec la cauſe qui produit de ſemblables affections dans les êtres ſenſibles. Et peut-être ſe trompoient-ils moins que les Phyſiciens récents, qui ont voulu rapporter les phénomènes magnétiques aux loix de notre méchanique groſſière. Auſſi tous leurs efforts, tous leurs raiſonnemens appuyés ſur des ſuppoſitions précaires, n'ont abouti qu'à démontrer l'erreur de leurs vues dans le principe, & l'inſuffiſance de leurs moyens d'explication. Mais, pour mieux connoître la Nature du magnétiſme & ſa dépendance de l'électricité, comparons les principaux effets de ces deux forces, en préſentant d'abord tous les faits ſemblables ou analogues, & ſans diſſimuler ceux qui paroiſſent différens ou contraires.

L'action du magnétiſme & celle de l'électricité, ſont également variables, tantôt en plus, tantôt en moins; & leurs variations particulières dépendent en grande partie de l'état de l'atmoſphère. Les phénomènes électriques que nous pouvons produire, augmentent, en effet, ou diminuent de force, & même ſont quelquefois totalement ſupprimés, ſuivant qu'il y a plus ou moins d'humidité dans l'air, que le fluide

électrique s'eſt plus ou moins répandu dans l'atmoſphère, & que les nuages orageux y ſont plus ou moins accumulés. De même les barres de fer, que l'on veut aimanter par la ſeule expoſition aux impreſſions du magnétiſme général, acquièrent plus ou moins promptement la vertu magnétique, ſuivant que le fluide électrique eſt plus ou moins abondant dans l'atmoſphère ; & les aiguilles des bouſſoles éprouvent des variations, tant périodiques qu'irrégulières, qui ne paroiſſent dépendre que du plus ou moins de force de l'électricité de l'air.

L'Aimant primordial n'eſt qu'une matière ferrugineuſe, qui ayant d'abord ſubi l'action du feu primitif, s'eſt enſuite aimantée par l'impreſſion du magnétiſme du globe, & en général, la force magnétique n'agit que ſur le fer ou ſur les matières qui en contiennent ; de même la force électrique ne ſe produit que dans certaines matières, telles que l'ambre, les réſines, les verres & les autres ſubſtances qu'on appelle *électriques par elles-mêmes*, quoiqu'elle puiſſe ſe communiquer à tous les corps.

Les Aimans ou fers aimantés s'attirent mutuellement dans un ſens, & ſe repouſſent réciproquement dans le ſens oppoſé ; cette répulſion & cette attraction ſont plus ſenſibles, lorſqu'on approche l'un de l'autre leurs poles de même nom ou de différent nom. Les verres, les réſines & les autres corps électriques par eux-mêmes,

eux-mêmes, ont auſſi, dans pluſieurs circonſtances, des parties polaires, des portions électriſées en plus & d'autres en moins, dans leſquelles l'attraction & la répulſion ſe manifeſtent par des effets conſtans & bien diſtincts.

Les forces électrique & magnétique s'exercent également en ſens oppoſé & en ſens direct; & leur réaction eſt égale à leur action.

On peut, en armant les Aimans d'un fer qui les embraſſe, diriger ou accumuler ſur un ou pluſieurs points la force magnétique; on peut de même, par le moyen des verres & des réſines, ainſi qu'en iſolant les ſubſtances conductrices de l'électricité, diriger & condenſer la force électrique, & ces deux forces électrique & magnétique peuvent être également diſperſées, changées ou ſupprimées à volonté. La force de l'électricité & celle du magnétiſme peuvent de même ſe communiquer aux matières que l'on approche des corps dans leſquels on a excité ces forces.

Souvent, pendant l'orage, l'électricité des nuées a troublé la direction de l'aiguille de la bouſſole (*h*); & même l'action de la foudre aérienne a influé quelquefois ſur le magnétiſme au point de détruire & de

---

(*h*) Voyez la relation de Carteret, dans le premier voyage de Cook.

changer tout-à-coup d'un pole à l'autre la direction de l'Aimant *(i)*.

Une forte étincelle électrique, & l'action du tonnerre, paroiſſent également donner la vertu magnétique aux corps ferrugineux, & la vertu électrique aux ſubſtances que la Nature a rendues propres à recevoir immédiatement l'électricité, telles que les verres & les réſines. M. le Chevalier de Rozières, Capitaine au Corps-Royal du Génie, eſt parvenu à aimanter des barres d'acier, en tirant des étincelles par le bout oppoſé à celui qui recevoit l'électricité, ſans employer les commotions plus ou moins fortes des grandes batteries électriques *(k)*, & même ſans en tirer des étincelles, & ſeulement en les électriſant pendant pluſieurs heures de ſuite *(l)*.

Des bâtons de ſoufre ou de réſine qu'on laiſſe tomber, à pluſieurs repriſes, ſur un corps dur, acquièrent la vertu électrique, de même que des barres de fer qu'on laiſſe tomber pluſieurs fois de ſuite, d'une cer-

---

(*i*) Tranſact. Philoſoph. N.° 127, page 647, & N.° 157, page. 520.

(*k*) Lettre de M. de Rozières, Secrétaire de la Société patriotique de Valence, & Capitaine au Corps-Royal du Génie, à M. le Comte de Buffon, du 14 Décembre 1786.

(*l*) Cette dernière manière n'a été trouvée que nouvellement, par M. le Chevalier de Rozières, qui nous en a fait part par ſa lettre du 30 Avril 1787.

taine hauteur, prennent du magnétiſme par l'effet de leurs chûtes réitérées (*m*).

On peut imprimer la vertu magnétique à une barre de fer, de telle ſorte qu'elle préſente une ſuite de poles alternativement oppoſés; on peut également électriſer une lame ou un tube de verre, de manière qu'on y remarque une ſuite de poles alternativement oppoſés (*n*).

Lorſqu'une barre de fer s'aimante par ſa ſeule proximité avec l'Aimant, l'extrémité de cette barre, qui en eſt la plus voiſine, acquiert un pole oppoſé à celui que l'Aimant lui préſente. De même, une barre de fer iſolée peut recevoir deux électricités oppoſées par le voiſinage d'un corps électriſé; le bout, qui eſt le plus proche de ce corps, jouit, comme dans l'Aimant, d'une force oppoſée à celle dont il ſubit l'action.

Les matières ferrugineuſes réduites en rouille, en ochre, & toutes les diſſolutions du fer, par l'acide aérien, ou par les autres acides, ne peuvent recevoir la vertu magnétique; & de même ces matières fer-

---

(*m*) Mémoire de M. Liphardt, Journal de phyſique, Juin 1787.

(*n*) Voyez à ce ſujet les expériences de M. Epinus, dans la diſſertation que ce Phyſicien a publiée à la tête de ſon ouvrage, ſur le magnétiſme, & celles de M. le Comte de la Cépède, dans ſon eſſai ſur l'électricité, tom. I.er

rugineuſes ne peuvent, dans cet état de diſſolution, acquérir la vertu électrique.

Si l'on ſuſpend une lame de verre, garnie à ſes deux bouts de petites plaques de métal, dont l'une ſera électriſée en plus, l'autre en moins, & ſi cette lame, ainſi préparée, peut ſe mouvoir librement, lorſqu'on en approchera un corps électrique, qui jouit auſſi des deux électricités, la lame de verre préſentera les mêmes phénomènes qu'une aiguille aimantée préſente auprès d'un Aimant *(o)*.

Les fortes étincelles électriques revivifient les chaux de fer, & leur rendent la propriété d'être attirées par l'Aimant *(p)*. Les foudres ſouterraines & aériennes revivifient de même, à l'intérieur & à la ſurface de la terre, une prodigieuſe quantité de matières ferrugineuſes, réduites en chaux par les élémens humides.

La plupart des ſchorls, & particulièrement la tourmaline, préſentent des phénomènes électriques qui ont la plus grande analogie avec ceux de l'Aimant *(q)*.

(o) Voyez la diſſertation prononcée par M. Epinus, à Péterſbourg, au mois de Septembre 1758.

(p) Voyez, ſur ce ſujet, un Mémoire de M. le Comte de Milly, lu à l'Académie des Sciences, & celui que M. de Vanſmarum vient de publier.

(q) Voyez la diſſertation de M. Epinus, dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, année 1756.

Lorſque ces matières ont été chauffées ou frottées, elles ont, pour ainſi dire, des parties polaires, dont les unes ſont électriſées en plus & les autres en moins, & qui attirent ou repouſſent les corps électriſés.

Les aurores polaires, qui, comme nous l'avons dit, ne ſont que des lumières électriques, influent plus qu'aucune autre affection de l'atmoſphère, ſur les variations de l'aiguille aimantée. Les obſervations de MM. Vanſwinden & de Caſſini, ne permettent plus de douter de ce fait (*r*).

Les perſonnes dont les nerfs ſont délicats, & ſur leſquelles l'électricité agit d'une manière ſi marquée, reçoivent auſſi du magnétiſme des impreſſions aſſez

---

(*r*) Voyez l'ouvrage de M. Vanſwinden, intitulé: *de l'Analogie de l'Electricité & du Magnétiſme*, dans lequel cet excellent obſervateur a prouvé que les variations extraordinaires des aiguilles aimantées, les perturbations dans leurs variations diurnes, & même quelques changemens aſſez conſtans dans leurs déclinaiſons, ne ſont jamais plus grands que dans le tems où paroiſſent les aurores boréales; M. le Comte de Caſſini, de l'Académie des Sciences, a obſervé avec une aiguille aimantée, ſuivant la méthode de M. Coulomb, que la variation diurne n'étoit ordinairement que de quelques minutes, & que les aurores boréales influoient plus qu'aucune autre cauſe ſur cette variation. « Le 23 Septembre 1781, la direction étoit, dit-il, le matin ſur 26 minutes de la diviſion du micromètre; « à deux heures après-midi, elle parvint à 1 degré. Ce grand mouve- « ment annonçoit quelque choſe d'extraordinaire, l'aiguille enſuite rétro- « grada vers l'Eſt, non-ſeulement de tout le degré où elle étoit par- « venue, mais encore de 13 minutes en deçà, où elle fut obſervée à «

ſenſibles; car l'Aimant peut, en certaines circonſtances, ſuſpendre & calmer les irritations nerveuſes, & appaiſer les douleurs aiguës. L'action de l'Aimant qui, dans ce cas, eſt calmante & même engourdiſſante, ſemble arrêter le cours, & fixer pour un tems le mouvement trop rapide ou déréglé des torrens de ce fluide électrique qui, quand il eſt ſans frein, ou ſe trouve ſans meſure dans le corps animal, en irrite les organes, & l'agite par des mouvemens convulſifs.

Il exiſte des animaux, dans leſquels, indépendament de l'électricité vitale qui appartient à tout être

---

„neuf heures du ſoir. C'eſt alors qu'on s'apperçut d'une aurore „boréale, dont l'effet, ſur l'aiguille, avoit été par conſéquent de „37 minutes. Le 25, une autre aurore boréale ne produiſit qu'une „variation totale de 35 minutes. Il faut, à la vérité, défalquer l'effet „ordinaire de la variation diurne, qui eſt d'environ 14 minutes. Il a „paru que l'effet des aurores boréales précédoit ſouvent de pluſieurs „heures l'apparition de ces aurores, & ſe prolongeoit auſſi long-tems „après. Le 12 Mai 1783, deux aiguilles d'acier fondu, très-fortement „aimantées, retrogradèrent de 14 minutes plus que de coutume, & „l'on remarqua un bandeau d'aurore boréale, véritable cauſe de cet „effet, qui n'avoit pas eu lieu les jours précédens, & qui n'eut plus lieu „le lendemain . . . . . parmi les cauſes perturbatrices de la variation „diurne, les aurores boréales ſont ſans doute les plus fortes; leur effet „dérange abſolument la direction des aiguilles aimantées qu'elles agi„tent en tout ſens, & d'une quantité plus ou moins grande, ſelon la force & l'étendue du phénomène . . .„ Extrait du Mémoire de M. le Comte de Caſſini, adreſſé aux Auteurs du Journal de Phyſique.

vivant, la Nature a établi un organe particulier d'électricité, &, pour ainſi dire, un ſens électrique & magnétique. La torpille (*ſ*), l'anguille électrique de Surinam, le trembleur du Niger (*t*), ſemblent réunir & concentrer dans une même faculté, la force de l'é-

---

(*ſ*) La torpille reſſemble, par ſa forme, à la raye. « C'eſt un poiſſon des plus ſinguliers, & qui produit ſur le corps humain d'é- « tranges effets. Pour peu qu'on le touche, ou ſi par haſard on vient « à marcher deſſus, on ſe ſent ſaiſi d'un engourdiſſement par tout le « corps, mais ſur-tout dans la partie qui a touché immédiatement la « torpille. On remarque le même effet, quand on touche ce poiſſon « avec quelque choſe que l'on tient à la main. J'ai moi-même reſſenti « un aſſez grand engourdiſſement dans le bras droit, pour avoir appuyé, « pendant quelque-tems, ma canne ſur le corps de ce poiſſon, & je ne « doute pas que l'effet n'en eût été plus violent, ſi l'animal n'avoit été « prêt d'expirer. Car il produit cet effet à meſure qu'il eſt plus vigou- « reux, & il ceſſe de le produire dès qu'il eſt mort; on peut en manger « ſans inconvénient. J'ajouterai encore que l'engourdiſſement ne paſſe « pas auſſi vîte que certains naturaliſtes le diſent. Le mien diminua inſen- « ſiblement, & le lendemain j'en ſentis encore quelques reſtes » .... Voyage autour du monde, par George Anſon... Amſterdam, 1748, page 211.

Dans l'ancienne médecine, on s'eſt ſervi de la torpille pour engourdir & calmer: Gallien compare ſa vertu à celle de l'opium, pour calmer & aſſoupir les douleurs.

(*t*) Il eſt bon d'obſerver que les eſpèces de poiſſons électriques diffèrent trop les unes des autres, pour qu'on puiſſe rapporter leurs phénomènes à la conformité de leur organiſation. On ne peut donc les attribuer qu'aux effets de l'électricité. Voyez un très-bon Mémoire de

lectricité & celle du magnétiſme. Ces poiſſons, électriques & magnétiques, engourdiſſent les corps vivans qui les touchent ; & ſuivant M. Schilling, & quelques autres obſervateurs, ils perdent cette propriété lorſqu'on les touche eux-mêmes avec l'Aimant. Il leur ôte la faculté d'engourdir, & on leur rend cette vertu en les touchant avec du fer, auquel ſe tranſporte le magnétiſme qu'ils avoient reçu de l'Aimant. Ces mêmes poiſſons, électriques & magnétiques, agiſſent ſur l'Aimant, & font varier l'aiguille de la bouſſole *(u)* ; mais ce qui prouve évidemment la préſence de l'électricité dans ces animaux, c'eſt qu'on voit paroître des étincelles électriques, dans les intervalles que laiſſent les conducteurs métalliques avec leſquels on les touche. M. Walſch a fait cette expérience devant la Société Royale de Londres, ſur l'anguille de Surinam, dont la force électrique paroît être plus grande que celle de la torpille, dans laquelle cette action eſt peut-être trop foible pour produire des étincelles *(v)*. Et ce qui dé-

---

M. Brouſſonet, de l'Académie des Sciences, ſur le Trembleur & les autres poiſſons électriques, dans le Journal de Phyſique, du mois d'Août 1785.

(u) Voyez l'ouvrage que M. Schilling a publié ſur cette action de l'Aimant, appliquée aux poiſſons électriques.

(v) Lettre de M. Walſch à M. le Roi, de l'Académie des Sciences ; dont ce dernier a publié l'extrait dans le Journal de Phyſique, année 1776.

montre

montre encore que la commotion produite par ces poiſſons, n'eſt point un effet méchanique, comme l'ont penſé quelques Phyſiciens, mais un phénomène électrique; c'eſt qu'elle ſe propage au travers des fluides & ſe communique, par le moyen de l'eau, à pluſieurs perſonnes à-la-fois *(x)*.

Or ces étincelles & cette commotion, plus ou moins violentes que font éprouver ces poiſſons, ſont vraiment des effets de l'électricité, que l'on ne peut attribuer en aucune manière au ſimple magnétiſme, puiſqu'aucun Aimant, tant naturel qu'artificiel, n'a fait éprouver de ſecouſſes ſenſibles, ni produit aucune étincelle; d'un autre côté, les commotions que donnent les torpilles, l'anguille électrique de Surinam & le trembleur du Niger, étant très-fortes, lorſque ces poiſſons ſont dans l'eau des mers ou des grands fleuves, on peut d'autant moins la conſidérer comme un phénomène purement électrique, que les effets de l'électricité s'affoibliſſent avec l'humidité de l'air qui la diſſipe, & ne peuvent jamais être excités lorſqu'on mouille les machines qui la produiſent. Les vaſes de verre électriſés, que l'on a appellés *bouteilles de Leyde*, & par le moyen deſquels on reçoit les ſecouſſes les plus fortes, ſe déchargent & perdent leur vertu, dès le moment qu'ils

(*x*) Lettre de M. Walſch, publiée par M. le Roi, Journal de Phyſique, année 1774.

ſont entièrement plongés dans l'eau ; cette eau, en faiſant communiquer enſemble les deux ſurfaces intérieure & extérieure, rétablit l'équilibre dont la rupture eſt la ſeule cauſe du mouvement, & par conſéquent de la force du fluide électrique. Si l'on remarque donc des effets électriques dans les torpilles, l'on doit ſuppoſer, d'après les modifications de ces effets, que l'électricité n'y exiſte pas ſeule, & qu'elle y eſt réunie avec le magnétiſme, de manière à y ſubir une combinaiſon qui augmente, diminue ou altère ſa puiſſance, & il paroît que ces deux forces électriques & magnétiques, qui, lorſqu'elles ſont ſéparées l'une de l'autre, ſont plus ou moins actives ou preſque nulles, ſuivant l'état de l'atmoſphère, le ſont également lorſqu'elles ſont combinées dans ces poiſſons ; mais peut-être auſſi la diverſité des ſaiſons, ainſi que les différens états de ces animaux, influent-ils ſur l'action de leurs forces électriques & magnétiques. Pluſieurs perſonnes ont en effet manié des torpilles ſans en recevoir aucune ſecouſſe. M. le Comte de la Cépède étant à la Rochelle, en Octobre 1777, voulut éprouver la vertu de quelques torpilles, que MM. de l'Académie de la Rochelle avoient fait pêcher ; elles étoient bien vivantes, & paroiſſoient très-vigoureuſes ; cependant de quelque manière qu'on les touchât, ſoit immédiatement avec la main, ſoit avec des barreaux de fer ou d'autres matières, & ſur quelque partie de leur corps qu'on portât

l'attouchement, dans l'eau ou hors de l'eau, aucun des assistans à l'expérience ne ressentit la moindre commotion. Il paroît donc que ces poissons ne sont pas électriques dans tous les tems, & que cette propriété, qui n'est pas constante, dépend des circonstances, & peut-être de la saison ou du tems auxquels ces animaux doivent répandre leurs œufs & leur frai; & nous ne pouvons rien dire de la cause de ces alternatives d'action & d'inaction, faute d'observations assez suivies sur ces poissons singuliers.

Cette combinaison des deux forces électriques & magnétiques, que la Nature paroît avoir faites dans quelques êtres vivans, doit faire espérer que nous pourrons les réunir par l'art, & peut-être en tirer des secours efficaces dans certaines maladies & particulièrement dans les affections nerveuses.

Les deux forces électriques & magnétiques, ont en effet été employées séparément, avec succès, pour la guérison ou le soulagement de plusieurs maux douloureux. Quelques Physiciens, *(y)* particulièrement M. Mauduit, de la Société Royale de Médecine, ont guéri des maladies par le moyen de l'électricité *(z)*, &

(*y*) On peut voir à ce sujet l'ouvrage de M. l'Abbé Bertholon, intitulé : *de l'Electricité du Corps humain.*

(*z*) Voyez les Mémoires de la Société Royale de Médecine, ainsi que les divers rapports & avis publiés par cette Compagnie.

M. l'Abbé le Noble qui s'occupe avec ſuccès, depuis long-tems, des effets du magnétiſme ſur le corps humain, & qui eſt parvenu à conſtruire des Aimans artificiels, beaucoup plus forts que tous ceux qui étoient déjà connus, a employé très-heureuſement l'application de ces mêmes Aimans pour le ſoulagement de pluſieurs maux. Nous croyons devoir placer dans la note ci-après, un extrait du rapport fait par MM. les Commiſſaires de la Société Royale de Médecine, au ſujet des travaux utiles de ce Phyſicien, qui les continue avec zèle, & d'une manière d'autant plus louable qu'il les conſacre gratuitement au ſoulagement des malheureux (*a*).

(*a*) Dans un compte rendu à la Société Royale de Médecine, ſur les effets de l'Aimant, & au ſujet des travaux de M. le Noble, les Commiſſaires s'expriment en ces termes. « Les affections nerveuſes nous » ont paru céder & ſe diſſiper d'une manière conſtante pendant l'uſage » de l'Aimant, & au contraire, les affections humorales n'ont éprouvé » aucun changement par la plus forte & la plus longue application de » l'Aimant. Dans toutes les affections nerveuſes, quelque fût la nature » des accidens, dont elles étoient accompagées, ſoit qu'elles conſiſtaſſent » en des affections purement douloureuſes, ſoit qu'elles paruſſent plus » particulièrement ſpaſmodiques & convulſives, quelque fût auſſi leur » ſiège & leur caractère, de quelque manière enfin que nous euſſions » employé l'Aimant, ſoit en armure habituelle & conſtante, ſoit par » la méthode des ſimples applications, toutes ces affections ont ſubi des » changemens plus ou moins marqués, quoique preſque toujours le » ſoulagement n'ait guère été qu'une ſimple palliation de la maladie. Ces

Nous avons cru devoir y placer auſſi quelques dé-

---

affections nous ont paru céder & s'affoiblir d'une manière plus ou « moins marquée pendant le traitement. Pluſieurs malades que le ſou- « lagement dont ils jouiſſoient depuis quelque-tems, avoit engagés à « quitter leurs garnitures, ayant vu ſe renouveller enſuite leurs accidens, « qu'une nouvelle application de l'Aimant a toujours ſuffi pour faire « diſparoître, nous ſommes reſtés convaincus que c'étoit à l'uſage des « Aimans qu'on devoit attribuer le ſoulagement obtenu..... Nous « nous ſommes ſcrupuleuſement abſtenus d'employer aucun autre remède « pendant le traitement. De tous les ſecours qu'on peut deſirer de voir « joindre à l'uſage de l'Aimant, c'eſt de l'électricité ſur-tout dont il « ſemble qu'on ait lieu de plus attendre..... Le magnétiſme inté- « reſſe le bien public; il nous paroît devoir mériter toute l'attention de « la Société. Qu'on nous permette, à ce ſujet, une réflexion. De tous « les objets ſur leſquels l'enthouſiaſme peut s'exciter, & dont le char- « latanisme peut, par cette raiſon, abuſer avec plus de confiance, le « magnétiſme paroît être celui qui offre à l'avidité plus de facilité & « plus de reſſource. L'hiſtoire ſeule de cet art ſuffiroit pour en con- « vaincre, quand des eſſais qui le multiplient ſous nos yeux, n'autori- « ſeroient pas cette préſomption. C'eſt ſur-tout ſur de pareils objets, » devenus pour le public un ſujet de curioſité, qu'il eſt à deſirer que « les compagnies ſavantes portent toute leur attention, pour arracher à « l'erreur une confiance qu'elle ne manqueroit pas de gagner, ſi l'on ne « diſſipoit aux yeux des gens crédules les preſtiges du charlataniſme, « par des eſſais faits avec exactitude & impartialité. De pareils projets « pour être remplis d'une manière utile, ont beſoin de l'appui du gou- « vernement; mais où les ſecours peuvent-ils mieux être appliqués, « qu'aux objets qui touchent aux progrès des Sciences & au bien de « l'humanité? «

tails, relatifs aux divers ſuccès que M. l'Abbé le

» En deſirant que le Gouvernement autoriſe la Société à annoncer, » ſous ſes auſpices, un traitement gratuit & public pour le magnétiſme, » nous croyons encore utile, que la Compagnie invite ceux de ſes » Aſſociés & Correſpondans, à qui ces ſortes d'eſſais peuvent être agréa- » bles, à concourir avec elle au ſuccès de ſes recherches. La Société ſait, » par l'exemple de l'électricité, combien elle peut retirer d'avantages de » cette réuniou de travaux. Le magnétiſme offre encore plus de faci- » lités pour répéter ou multiplier les eſſais que l'on jugeroit néceſſaires. » Mais, pour rendre ce concours de recherches plus fructueux, on ſent » qu'il eſt néceſſaire qu'il ſoit dirigé ſur un plan uniforme. Le rapport » que nous ſoumettons ici à l'examen de la compagnie, rempliroit cette » vue, & nous lui propoſons de le faire imprimer & diſtribuer, par la » voie de ſa correſpondance ordinaire.

» La Société, pour ſe livrer elle-même à ſes travaux, devant s'atta- » cher un Phyſicien exercé dans la préparation des Aimans, & verſé » dans tous les genres de connoiſſances, relatives à leur adminiſtration, » nous penſons que le choix de la Compagnie doit tomber ſur M. l'Abbé » le Noble. Pluſieurs raiſons nous paroiſſent devoir lui mériter la pré- » férence. On doit le regarder comme un des premiers Phyſiciens, qui » depuis le renouvellement des expériences de l'Aimant, ſe ſoient » occupés de cet objet. En 1763, c'eſt-à-dire, deux ans à-peu-près » avant M. Klarich, que l'on regarde comme le principal rénovateur de » ces eſſais, & dont les obſervations ont fait attribuer à l'Angleterre la » gloire de cette découverte, les Aimans de M. l'Abbé le Noble pour » les dents, paroiſſent avoir été connus dans la Capitale, & recherchés » des Phyſiciens. Au mois de Juin 1766, dans le même-tems qe » M. d'Arquier, qu'on regarde comme le premier qui ait répété en » France les eſſais de M. Klarich dans les maux de dents, M. l'Abbé

Noble a obtenus depuis la publication du rapport de

---

le Noble publia, en ce genre, pluſieurs obſervations. Deux ans avant « que le pere Hell, à Vienne, fit adopter généralement la méthode des « armures magnétiques, il avoit annoncé pluſieurs eſpèces de plaques « aimantées, préparées pour être portées habituellemeut ſur différentes « parties du corps. Depuis ces différentes époques, M. l'Abbé le Noble « n'a ceſſé de s'occuper de l'uſage de l'Aimant dans pluſieurs eſpèces « d'affections nerveuſes. Les réſultats qu'il avoit obtenus de ces eſſais, « ſont conſignés dans un Mémoire qu'il lut, au mois de Septembre 1777, « dans une des ſéances de la Société. Enfin, pour compléter l'hiſtoire de « ſes travaux, on doit y joindre les différens eſſais auxquels ont donné « lieu nos propres obſervations, & dont nous reconnoiſſons qu'il doit, « s'il en réſulte quelque utilité, partager avec nous le mérite. A ce « ſujet nous devons rendre compte à la Compagnie du zèle avec lequel « M. l'Abbé le Noble s'eſt porté à nous ſeconder dans nos recherches. « Quoique la durée de ces eſſais, & ſa réſidence ordinaire en Province, « aient exigé de lui de fréquens voyages & de longs ſéjours à Paris ; « quoique la multiplicité des malades qui ont eu recours à l'Aimant, le « peu d'aiſance du plus grand nombre, la durée du long traitement « pendant lequel les armures ont dû être ſouvent renouvellées, aient « été autant de charges, d'incommodités & de ſujets de dépenſe pour « M. l'Abbé le Noble, nous devons annoncer qu'il n'a épargné ni ſoins, ni « peines, ni ſacrifices pour concourir autant qu'il étoit en lui, au ſuccès « de nos épreuves & au ſoulagement des malheureux. M. l'Abbé le « Noble ſe montre encore animé des mêmes diſpoſitions, & prêt à les « mettre en œuvre, ſi les circonſtances répondoient à ſes deſirs. Mais, « attaché par la Nature de ſes devoirs à la place qu'il remplit en Pro- « vince, il ne pourroit concourir d'une manière utile aux expériences « que nous propoſons, s'il n'étoit fixé à Paris. C'eſt au Gouvernement «

MM. de la Société Royale, & qu'il nous a communiqués lui-même.

» ſeul qu'il appartient de lever cet obſtacle, & nous penſons que la » Compagnie doit renouveller en ſa faveur les mêmes inſtances qu'elle » a déjà faites, en 1778, pour lui obtenir une réſidence fixe dans la » Capitale.

» Des raiſons particulières & perſonnelles à M. le Noble, nous paroiſ- » ſent devoir lui mériter cette faveur du Gouvernement: c'eſt ſur-tout » en employant de forts Aimans, portés au plus haut degré de force, » & préparés de manière à former une machine ſemblable à celle de » l'électricité, qu'on doit attendre de nouveaux avantages du magné- » tiſme. M. l'Abbé le Noble poſsède en ce genre des procédés très-ſupé- » rieurs à tous ceux qui nous ont été connus, & employés juſqu'ici par » les Phyſiciens. Nous apportons en preuve de ce que nous avançons » ici, un certificat de l'Académie Royale des Sciences, à laquelle » M. l'Abbé le Noble a préſenté des Aimans capables de ſoutenir des » poids de plus de deux cens livres, & qui lui ont mérité les éloges & » l'approbation de cette Compagnie. C'eſt avec des Aimans de ce genre » qu'on a lieu de ſe flatter d'obtenir du magnétiſme des effets extraordinaires & inconnus. »

M. l'Abbé le Noble nous a communiqué les détails ſuivans, relatifs aux diverſes applications qu'il a faites de l'Aimant, dans les maladies, depuis la publication du rapport de la Société Royale de Médecine.

En 1786, le 24 Mai, à 5 heures du ſoir, une plaque d'Aimant envoyée par M. l'Abbé le Noble, fut appliquée ſur l'eſtomac à une malade, âgée de 51 ans, & qui, depuis l'âge de 22, éprouvoit de tems en tems des attaques de nerfs, plus ou moins fréquentes, qui étoient venues à la ſuite d'une ſuppreſſion, & étoient accompagnées de convulſions très-fortes, & d'autres ſymptômes effrayans. Ces attaques

Les

Les premiers Phyſiciens, qui ont voulu rechercher

---

avoient diſparu quelquefois près d'un an; elles avoient été auſſi ſuſpendues par différens remèdes. Pendant les divers intervalles, qui avoient ſéparé le tems où les attaques étoient plus ou moins fréquentes, la perſonne qui les avoit éprouvées avoit joui d'une bonne ſanté; mais, depuis quinze mois, elle étoit retombée dans ſon premier-état. Sur la fin même les accidens arrivoient plus de dix ou douze fois par jour, & quelquefois duroient pluſieurs minutes. Depuis dix-huit mois les évacuations périodiques étoient dérangées & n'avoient lieu que de deux mois en deux mois.

L'effet de l'Aimant fut très-prompt: la malade n'eut plus de convulſions, quoique dans la matinée & dans l'après-dînée, elle en eût éprouvé plus de vingt fois. Le 16 Juin, les convulſions n'étoient point encore revenues, la malade ſe portoit mieux; elle ſentoit ſes forces & ſon appétit augmenter de jour en jour; elle dormoit un peu mieux pendant la nuit, & s'occupoit continuellement, pendant le jour, des travaux pénibles de la campagne, ſans en être incommodée; elle ſentoit cependant toujours un petit tiraillement dans l'intérieur du front. Elle rendoit quelquefois des vents comme auparavant; ſa reſpiration étoit un peu gênée lorſqu'ils s'échappoient, mais n'avoit jamais été ſuſpendue depuis l'application de l'Aimant, ainſi que cela arrivoit très-ſouvent auparavant.

Ces faits ont été atteſtés par le Curé du lieu, & il eſt à croire que le bien-être s'eſt ſoutenu, puiſque la malade n'a point demandé de nouveaux ſecours.

Une Dame qui ſouffroit beaucoup des nerfs, preſque dans tout le corps, & dont la ſanté étoit ſi dérangée, qu'elle n'oſoit point tenter les remèdes intérieurs, s'eſt trouvée ſoulagée par le moyen d'un collier

les rapports analogues des forces magnétique & élec-

---

d'Aimans, & l'application d'un Aimant ſur le creux de l'eſtomac, ainſi qu'elle l'a écrit elle-même à M. l'Abbé le Noble.

Une malade ſouffroit, depuis ſix mois, des maux de nerfs qui lui donnoient des maux de gorge & d'eſtomac, au point que très-ſouvent l'œſophage ſe fermoit preſque entièrement, & la mettoit dans une impoſſibilité preſque abſolue d'avaler même les liquides pendant à-peu-près la moitié de la journée: une fièvre épidémique s'étoit jointe aux accidens nerveux. On lui appliqua un collier & une ceinture d'Aimans, ſuivant la méthode de M. l'Abbé le Noble. Huit ou dix heures après, la malade ſe trouva comme guérie, & ſe porta *paſſablement bien* pendant trois mois, au bout deſquels le Médecin qui l'avoit traitée, certifia à M. l'Abbé le Noble la maladie & la guériſon. Ce même Médecin penſoit que les nerfs de cette Dame avoient été agacés par une humeur.

Une jeune Demoiſelle ayant eu, pendant plus de trois ans, des attaques d'épilepſie, qui avoient commencé à l'époque où les évacuations ont lieu, & ayant fait inutilement pluſieurs remèdes conſeillés par un Membre de la Société Royale de Médecine, eut recours aux Aimans de M. l'Abbé le Noble, d'après l'avis du même Médecin; les attaques ceſsèrent bientôt, &, dix mois après leur ceſſation, ſa mere écrivit au Médecin qui lui avoit conſeillé les Aimans de M. l'Abbé le Noble, pour lui annoncer la guériſon de ſa fille.

Une Dame ſouffroit, depuis plus de huit ans, des maux de nerfs qui avoient été ſouvent accompagnés d'accidens graves & fâcheux, de

trique, eſſayèrent de rapporter l'électricité qu'on venoit,

---

laſſitudes, d'inſomnies, de douleurs vives, de convulſions, d'évanouiſſemens, & ſur-tout d'un accablement général, & d'une grande triſteſſe. Les Aimans de M. l'Abbé le Noble l'ont guérie, & elle l'a atteſté elle-même, un mois ou environ après, à M. l'Abbé le Noble; ſa guériſon s'étoit toujours ſoutenue.

Une Dame, qui étoit malade d'une épilepſie ſurvenue à la ſuite d'une frayeur qu'elle avoit eue dans un tems critique, a certifié que, depuis quatre ans qu'elle porte des Aimans de M. le Noble, elle a toujours été ſoulagée; que ſi divers événemens lui ont donné quelquefois des criſes, elles ont été paſſagères & bien moins violentes que celles qu'elle avoit éprouvées, & qu'elle jouit habituellement d'un bien-être très-marqué.

Trois femmes & un homme ont été guéris, par l'application de l'Aimant, de maux de nerfs, accompagnés de convulſions fortes, &c. trois ans ſe ſont écoulés depuis la guériſon d'une de ces femmes, & elle ſe porte encore très-bien.

M. Picot, Médecin de la maiſon du Roi de Sardaigne, a certifié à M. l'Abbé le Noble, qu'il s'étoit ſervi de ſes Aimans avec le plus grand ſuccès, pour procurer à une femme très-délicate & d'une très-grande ſenſibilité, des évacuations périodiques, dérangées ou ſupprimées, en partie, depuis plus de deux ans. Le même Médecin atteſte avoir été guéri lui-même d'une migraine qui avoit réſiſté, pendant plus de huit ans, à tous les ſecours de l'Art. Il demande en conſéquence à M. le

en quelque ſorte, de découvrir, au magnétiſme dont

Noble, qu'il établiſſe un dépôt de ſes Aimans dans la ville de Turin.

Depuis plus de dix-huit mois, une Dame ne pouvoit prendre la plus légère nourriture, ſans que ſon eſtomac fût extrêmement fatigué. Elle reſſentoit des douleurs preſque continuelles, tantôt dans le côté droit, tantôt entre les deux épaules, & ſouvent dans la poitrine; elle éprouvoit tous les ſoirs, ſur la fin de ſa digeſtion, un étouffement ſubit, une tenſion générale, une inquiétude qui la forçoient à ceſſer toute occupation, à marcher, à aller à l'air quelque froid qu'il fît, & à relâcher tous les cordons de ſon habit. Quinze jours après avoir employé les Aimans de M. l'Abbé le Noble, elle fut entièrement guérie; & aucune douleur ni aucun accident n'étoient revenus ſix ſemaines après qu'elle eût commencé à les porter, ainſi qu'elle l'atteſta elle-même à M. l'Abbé le Noble.

Une Dame a certifié elle-même qu'elle avoit ſouffert, pendant ſix jours, des douleurs très-vives, occaſionnées par un rhumatiſme au bras gauche, dont elle avoit entièrement perdu l'uſage; qu'elle avoit employé ſans ſuccès les remèdes ordinaires; qu'elle avoit eu recours aux plaques aimantées de M. l'Abbé le Noble, & que quatre jours après elle avoit été entièrement guérie.

Un homme, très-digne de foi, a auſſi certifié à M. l'Abbé le Noble, qu'il avoit été guéri, par l'application de ſes Aimans, d'un rhumatiſme très-douloureux, dont il ſouffroit depuis pluſieurs années, & dont le ſiège étoit au bas de l'épine du dos. Près d'un an après, cet homme por-

on connoiſſoit depuis long-tems les grands phéno-

---

toit toujours ſur le bas du dos la plaque aimantée ; les douleurs avoient diſparu ; & il ne ſentoit plus que quelquefois un peu d'engourdiſſement lorſqu'il avoit été ſédentaire pendant trop long-tems ; mais il diſſipoit cet engourdiſſement en faiſant quelques pas dans ſa chambre.

Un Homme malade d'une paralyſie incomplète, ſouffrant dans toutes les parties du corps, & ayant tenté inutilement tous les remèdes connus, fut adreſſé, dans le mois de Septembre 1785, à M. l'Abbé le Noble, par un membre de la Société de Médecine ; on lui appliqua les Aimans, &, au mois de Janvier 1786, il s'eſt très-bien porté.

Une Dame qui ſouffroit, depuis 20 ans, des douleurs rhumatiſmales qui l'empêchoient de dormir & de marcher, étoit preſque entièrement guérie au mois de Février 1787.

Le nommé Boiſſel, garçon menuiſier, âgé de 50 ans, a eu recours à M. l'Abbé le Noble, le 9 Novembre 1786. Il y avoit dix mois qu'il éprouvoit de grandes douleurs dans les deux bras ; le gauche étoit très-enflé & enflammé, il lui étoit impoſſible de l'étendre, & la douleur ſe communiquoit à la poitrine, à l'eſtomac & aux côtés, & même juſqu'aux jambes, dont il ne pouvoit faire uſage qu'à l'aide d'une béquille ; on étoit obligé de le porter dans ſon lit, où il reſſentoit encore les mêmes douleurs ; il avoit été trois mois à l'Hôtel-Dieu, & il y en avoit deux qu'il en étoit ſorti ſans y avoir éprouvé le plus léger ſoulagement. Mais, après l'application des Aimans de M. l'Abbé le Noble, le 9 Novembre, les mouvemens dans les jambes, ainſi que dans les bras, ſont devenus

mènes (*b*). Des Phyſiciens récens ont, avec plus de fondement, attribué ce même magnétiſme à l'électricité qu'ils connoiſſoient mieux; mais ni les uns ni les autres n'ont fait aſſez d'attention aux différences de l'action de ces deux forces, dont nous venons d'expoſer les relations analogues, & qui néanmoins diffèrent par pluſieurs rapports, & notamment par les directions particulières que ces forces ſuivent, ou qu'elles prennent d'elles-mêmes. Car la direction du magnétiſme ſe combine avec le giſſement des continens, & ſe détermine par la poſition particulière des mines de fer & d'Aimant, des chaînes de laves, de baſaltes, & de toutes

---

libres; le 19 dudit mois, il ſe promenoit dans ſa chambre, & voyant la facilité avec laquelle il marchoit, il crut qu'il pourroit ſortir ſans aucun riſque.

En effet il a été, ce jour-là, à quelque diſtance de ſon domicile, & le lendemain 20, il eſt venu de la rue Neuve-Saint-Martin, où il demeure, à la rue Saint-Thomas du Louvre. Les douleurs étoient encore vives dans les jambes, quoique les mouvemens fuſſent libres; mais elles ſe ſont diſſipées par degrés, & ont ceſſé le 15 Février. Il s'eſt établi ſous les Aimans, à la cheville des pieds & ſous les jarretières, des eſpèces de petits cautères qui rendoient une humeur épaiſſe & gluante. Les jambes qui étoient conſidérablement enflées, ſont maintenant, au mois de Mars 1787, dans l'état naturel; il marche très-bien, & jouit d'une bonne ſanté.

(*b*) Le pere Berault, Jéſuite, auteur d'une Diſſertation couronnée par l'Académie de Bordeaux, a ſoupçonné, le premier, que les forces magnétiques & électriques pouvoient être identiques.

les matières ferrugineuſes qui ont ſubi l'action du feu; & c'eſt par cette raiſon que la force magnétique a autant de différentes directions, qu'il y a de poles magnétiques ſur le globe ; au lieu que la direction de l'électricité ne varie point, & ſe porte conſtamment de l'équateur aux deux poles terreſtres. Les glaces, qui recouvrent les régions polaires des deux hémiſphères du globe, doivent déterminer puiſſamment le fluide électrique vers ces régions polaires où il manque, & vers leſquelles il doit ſe porter, pour obéir aux loix générales de l'équilibre des fluides, au lieu que la glace n'influe pas ſur le magnétiſme, qui ne reçoit d'inflexions que par ſon rapport particulier avec les maſſes de l'Aimant & du fer.

De plus, il n'y a des rapports ſemblables & bien marqués, qu'entre les Aimans & les corps *électriques par eux-mêmes* ; & l'on ne connoît point de ſubſtances ſur leſquelles le magnétiſme produiſe des effets pareils à ceux que l'électricité produit ſur les ſubſtances qui ne peuvent être électriſées que par communication. D'ailleurs le magnétiſme ne ſe communique pas de la même manière que l'électricité dans beaucoup de circonſtances, puiſque la communication du magnétiſme ne diminue pas la force des Aimans, tandis que la communication de l'électricité détruit la vertu des corps qui la produiſent.

On peut donc dire que tous les effets magnétiques

ont leurs analogues dans les phénomènes de l'électricité; mais on doit convenir, en même-tems, que tous les phénomènes électriques n'ont pas de même tous leurs analogues dans les effets magnétiques; ainſi, nous ne pouvons plus douter que la force particulière du magnétiſme, ne dépende de la force générale de l'électricité, & que tous les effets de l'Aimant ne ſoient des modifications de cette force électrique *(c)*. Et ne pouvons-nous pas conſidérer l'Aimant comme un corps perpétuellement électrique, quoiqu'il ne poſsède l'électricité que d'une manière particulière, à laquelle on a donné le nom de magnétiſme? La Nature des matières ferrugineuſes, par ſon affinité avec la ſubſtance du feu, eſt aſſez puiſſante pour fléchir la direction du cours de l'électricité générale, & même pour en ralentir le mouvement, en le déterminant vers la ſurface de l'Aimant. La lenteur de l'action magnétique, en comparaiſon de la violente rapidité des chocs électriques, nous repréſente en effet un fluide, qui, tout actif qu'il eſt,

(*c*) Notre opinion eſt confirmée par les preuves répandues dans une diſſertation de M. Epinus, lue à l'Académie de Saint-Péterſbourg; ce Phyſicien y a fait voir, que les effets de l'électricité & du magnétiſme, non-ſeulement ont du rapport dans quelques points, mais qu'ils ſont encore ſemblables dans un très-grand nombre de circonſtances des plus eſſentielles; en ſorte, dit-il, qu'il n'eſt preſque pas à douter que la Nature n'emploie à-peu-près les mêmes moyens pour produire l'une & l'autre force.

ſemble néanmoins être ralenti, ſuſpendu &, pour ainſi dire, aſſoupi dans ſon cours.

Ainſi, je le répète, les principaux effets du magnétiſme ſe rapprochent par une analogie marquée, de ceux de l'électricité, & le grand rapport de la direction générale & commune des forces électrique & magnétique, de l'équateur aux deux poles, les réunit encore de plus près, & ſemble même les identifier *(d)*.

Si la vertu magnétique étoit une force réſidente dans le fer ou dans l'Aimant, & qui leur fût inhérente & propre, on ne pourroit la trouver ou la

---

(*d*) M. le Comte de Treſſan a penſé comme nous, que le magnétiſme n'étoit qu'une modification de l'électricité. Voyez ſon Ouvrage, qui a pour titre : *Eſſai ſur le Fluide électrique, conſidéré comme agent univerſel*; mais notre théorie n'en diffère pas moins de ſon opinion. L'hypothèſe de ce Phyſicien eſt ingénieuſe, ſuppoſe beaucoup de connoiſſances & de recherches; il préſente des expériences intéreſſantes, de bonnes vues & des vérités importantes, mais cependant on ne peut admettre ſa théorie. Elle conſiſte principalement à expliquer le méchaniſme de l'univers, & tous les effets de l'attraction, par le moyen du fluide électrique. Mais l'action impulſive d'aucun fluide, ne peut exiſter que par le moyen de l'élaſticité ; & l'élaſticité n'eſt elle-même qu'un effet de l'attraction, ainſi que nous l'avons ci-devant démontré. On ne fera donc que reculer la queſtion, au lieu de la réſoudre toutes les fois qu'on voudra expliquer l'attraction par l'impulſion, dont les phénomènes ſont tous dépendans de la gravitation univerſelle. On peut conſulter, à ce ſujet, l'article intitulé de l'Attraction, du I.er volume de la Phyſique générale & particulière de M. le Comte de la Cépède.

prendre que dans l'Aimant même, ou dans le fer actuellement aimanté; & il ne ſeroit pas poſſible de l'exciter, ou de la produire par un autre moyen; mais la percuſſion, le frottement, & même la ſeule expoſition aux impreſſions de l'atmoſphère, ſuffiſent pour donner au fer cette vertu magnétique; preuve évidente qu'elle dépend d'une force extérieure qui s'applique, ou plutôt flotte à ſa ſurface & ſe renouvelle ſans ceſſe.

En conſidérant les phénomènes de la direction de l'Aimant, on voit que les forces qui produiſent & maintiennent cette direction, ſe portent généralement de l'équateur aux poles terreſtres, avec des variations dont les unes ne ſont qu'alternatives d'un jour à l'autre, & s'opèrent par des oſcillations momentanées & paſſagères, produites par les variations de l'état de l'air, ſoit par la chaleur ou le froid, ſoit par les vents, les orages, les aurores boréales; les autres ſont des variations en déclinaiſon & en inclinaiſon, dont les cauſes, quoique également accidentelles, ſont plus conſtantes, & dont les effets ne s'opèrent qu'en beaucoup plus de tems; & tous ces effets ſont ſubordonnés à la cauſe générale, qui détermine la direction de la force électrique de l'équateur vers les poles.

En examinant attentivement les inflexions que la direction générale de l'électricité & du magnétiſme éprouve de toutes ces cauſes particulières, on reconnoît, d'après les obſervations récentes & anciennes,

que les grandes variations du magnétiſme ont une marche progreſſive du nord à l'eſt ou à l'oueſt, dans certaines périodes de tems, & que la force magnétique a, dans ſa direction, différens points de tendance ou de détermination, que l'on doit regarder comme autant de poles magnétiques vers leſquels, ſelon le plus ou moins de proximité, ſe fléchit la direction de la force générale, qui tend de l'équateur aux deux poles du globe.

Ce mouvement en déclinaiſon, ne s'opère que lentement; & cette déclinaiſon paroiſſant être aſſez conſtante pendant quelques années, on peut regarder les obſervations, faites depuis 12 à 15 ans, comme autant de déterminations aſſez juſtes de la poſition des lieux où elles ont été faites. Je joins ici les tables de ces obſervations, & j'en ai rédigé les principaux réſultats en cartes magnétiques, qui pourront être très-utiles à la navigation, ſi la déclinaiſon n'a que peu ou point changé depuis douze à quinze ans; ces tables donneront connoiſſance aux Navigateurs de tous les points où cette déclinaiſon a été récemment obſervée, & par conſéquent de tous les lieux relatifs à ces obſervations.

On doit réunir aux phénomènes de la déclinaiſon de l'Aimant, ceux de ſon inclinaiſon; ils nous démontrent que la force magnétique prend, à meſure que l'on approche des poles, une tendance de plus en plus approchante de la perpendiculaire à la ſurface du globe,

& cette inclinaiſon, quoiqu'un peu modifiée par la proximité des poles magnétiques, qui déterminent la déclinaiſon, nous paroîtra cependant beaucoup moins irrégulière dans ſa marche progreſſive vers les poles terreſtres, & plus conſtante que la déclinaiſon dans les mêmes lieux, en différens tems.

Pour ſe former une idée nette de cette inclinaiſon de l'Aimant, il faut ſe repréſenter la figure de terre, renflée ſous l'équateur & abaiſſée ſous les poles, ce qui fait une courbure, dont les degrés ne ſont point tous égaux, comme ceux d'une ſphère parfaite; il faut en même-tems concevoir que le mouvement qui tend de l'équateur aux poles, doit ſuivre cette courbure, & que par conſéquent ſa direction n'eſt pas ſimplement horizontale, mais toujours inclinée de plus en plus, en partant de l'équateur pour arriver aux poles.

Cette inclinaiſon de l'Aimant ou de l'aiguille aimantée, démontre donc évidemment que la force qui produit ce mouvement, ſuit la courbure de la ſurface du globe, de l'équateur dont elle part, juſqu'aux poles où elle arrive; ſi l'inclinaiſon de l'aiguille n'étoit pas dérangée par l'action des poles magnétiques, elle ſeroit donc toujours très-petite ou nulle dans les régions voiſines de l'équateur, & très-grande ou complète, c'eſt-à-dire, de 90 degrés dans les parties polaires.

En recherchant quel peut être le nombre des poles magnétiques, actuellement exiſtans ſur le globe, nous

trouverons qu'il doit y en avoir deux dans chaque hémiſphère ; &, de fait, les obſervations des Navigateurs prouvent qu'il y a ſur la ſurface du globe trois eſpaces plus ou moins étendus, trois bandes plus ou moins larges, dans leſquelles l'aiguille aimantée ſe dirige vers le nord, ſans décliner d'aucun côté. Or une bande ſans déclinaiſon, ne peut exiſter que dans deux circonſtances ; la première, lorſque cette bande ſuit la direction du pole magnétique au pole terreſtre ; la ſeconde, lorſque cette bande ſe trouve à une diſtance de deux ou de pluſieurs poles magnétiques, telle que les forces de ces poles ſe compenſent & ſe détruiſent mutuellement. Car, dans ces deux cas, le courant magnétique ne peut que ſuivre le courant général du fluide électrique & ſe diriger vers le pole terreſtre ; & l'aiguille aimantée ne déclinera dès-lors d'aucun côté. D'après cette conſidération, on pourra voir aiſément, en jetant les yeux ſur un globe terreſtre, qu'un pole magnétique ne peut produire dans un hémiſphère que deux bandes ſans déclinaiſon, ſéparées l'une de l'autre par la moitié de la circonférence du globe. S'il y a deux poles magnétiques, l'on pourra obſerver quatre bandes ſans déclinaiſon, chaque pole pouvant en produire deux par ſon action particulière ; mais alors ces quatre bandes ne ſeront pas placées ſur la même ligne que les poles magnétiques & le pole de la terre ; elles ſeront aux endroits où les

puiſſances des deux poles magnétiques ſeront combinées avec leurs diſtances, de manière à ſe détruire. Ainſi, une & deux bandes ſans déclinaiſon ne ſuppoſent qu'un ſeul pole magnétique; trois & quatre bandes ſans déclinaiſon en ſuppoſent deux; & s'il ſe trouvoit ſur le globe cinq ou ſix bandes ſans déclinaiſon, elles indiqueroient trois poles magnétiques dans chaque hémiſphère. Mais, juſqu'à ce jour, l'on n'a reconnu que trois bandes ſans déclinaiſon, leſquelles s'étendent toutes trois dans les deux hémiſphères; nous ſommes par conſéquent fondés à n'admettre aujourd'hui que deux poles magnétiques, dans l'hémiſphère boréal, & deux autres dans l'hémiſphère auſtral; & ſi l'on connoiſſoit exactement la poſition & le nombre de ces poles magnétiques, on pourroit bientôt parvenir à ſe guider ſur les mers ſans erreur.

On a tort de dire que les hommes donnent trop à la vaine curioſité; c'eſt aux beſoins, à la néceſſité, que les Sciences & les Arts doivent leur naiſſance & leurs progrès. Pourquoi trouvons-nous les obſervations magnétiques ſi multipliées ſur les mers, & en ſi petit nombre ſur les Continens? c'eſt que ces obſervations ne ſont pas néceſſaires pour voyager ſur terre, mais que les Navigateurs ne peuvent s'en paſſer; néanmoins il ſeroit très-utile de les multiplier ſur terre; ce qui d'ailleurs ſeroit plus facile que ſur mer. Sans ce travail, auquel on doit inviter les Phyſiciens de tous pays, on ne pourra

jamais former une théorie complète ſur les grandes variations de l'aiguille aimantée, ni par conſéquent établir une pratique certaine & préciſe, ſur l'uſage que les Marins peuvent faire de leurs différentes bouſſoles. Cependant, en s'occupant à compléter les tables des obſervations, on pourra faire des cartes magnétiques, plus étendues que celles que nous publions aujourd'hui, & qui indiqueroient aux Navigateurs leur ſituation, plus préciſément qu'on ne l'a fait juſqu'ici par aucune autre méthode.

Les effets du magnétiſme ſe manifeſtent ou du moins peuvent ſe reconnoître dans toutes les parties du globe, & par-tout où l'on veut les exciter ou les produire; la force électrique, toujours préſente, ſemble n'attendre pour agir & pour produire la vertu magnétique, que d'y être déterminée par la combinaiſon des moyens de l'art, ou par les combinaiſons plus grandes de la Nature; & malgré ſes variations, le magnétiſme eſt encore aſſujetti à la loi générale qui porte & dirige la marche du fluide électrique vers les poles de la terre.

Si les forces magnétiques & électriques étoient ſimples, comme celles de la gravitation, elles ne produiroient aucun mouvement compoſé; la direction en ſeroit toujours droite, ſans déclinaiſon ni inclinaiſon, & tous les effets en ſeroient auſſi conſtans qu'ils ſont variables.

L'attraction, la répulsion de l'aimant, son mouvement, tant en déclinaison qu'en inclinaison, démontrent donc que l'effet de cette force magnétique est un mouvement composé, une impulsion différemment dirigée; & cette force magnétique agissant, tantôt en plus, tantôt en moins, comme la force électrique, & se dirigeant de même de l'équateur aux deux poles, pouvons-nous douter que le Magnétisme ne soit une modification, une affection particulière de l'électricité, sans laquelle il n'existeroit pas?

Les effets de cette force magnétique, étant moins généraux que ceux de l'électricité, peuvent montrer plus aisément la direction de cette force électrique. Cette direction, vers les poles, nous est démontrée en effet par celle de l'aiguille aimantée, qui s'incline de plus en plus, & en sens contraire, vers les poles terrestres. Et ce qui prouve encore que le magnétisme n'est qu'un effet de cette force électrique, qui s'étend de l'équateur aux poles, c'est que des barres de fer ou d'acier, placées dans la direction de ce grand courant, acquièrent, avec le tems, une vertu magnétique plus ou moins sensible, qu'elles n'obtiennent qu'avec peine, & qu'elles ne reçoivent même en aucune manière, lorsqu'elles sont situées dans un plan trop éloigné de la direction, tant en déclinaison qu'en inclinaison, du grand courant électrique. Ce courant général, qui part de l'équateur pour se rendre aux poles, est

ſouvent troublé par des courans particuliers dépendans de cauſes locales & accidentelles. Lorſque, par exemple, le fluide électrique a été accumulé par diverſes circonſtances, dans certaines portions de l'intérieur du globe, il ſe porte avec plus ou moins de violence, de ces parties où il abonde, vers les endroits où il manque. Il produit ainſi des foudres ſouterraines, des commotions plus ou moins fortes, des tremblemens de terre plus ou moins étendus. Il ſe forme alors, non-ſeulement dans l'intérieur, mais même à la ſurface des terrains remués par ces ſecouſſes, un courant électrique qui ſuit la même direction que la commotion ſouterraine, & cette force accidentelle ſe manifeſte par la vertu magnétique que reçoivent des barres de fer ou d'acier, placées dans le même ſens que ce courant paſſager & local. L'action de cette force particulière, peut être non-ſeulement égale, mais même ſupérieure à celle de l'électricité générale qui va de l'équateur aux poles. Si l'on place en effet des barres de fer, les unes dans le ſens du courant général de l'équateur aux poles, & les autres dans la direction du courant particulier, dépendant de l'accumulation du fluide électrique dans l'intérieur du globe, & qui produit le tremblement de terre ; ce dernier courant, dont l'effet eſt cependant inſtantané, & ne doit guère durer plus longtems que les foudres ſouterraines qui les produiſent, donne la vertu magnétique aux barres qui ſe trouvent

dans ſa direction, quelqu'angle qu'elles faſſent avec le méridien magnétique, tandis que des barres entièrement ſemblables, & ſituées depuis un très-long tems dans le ſens de ce méridien, ne préſentent aucun ſigne de la plus foible aimantation *(e)*. Ce dernier fait, qui

---

(*e*) Ces faits ont été mis hors de doute par des expériences qui ont été faites par M. de Rozière, Capitaine au Corps-Royal du Génie. « J'ai » placé, dit cet habile Phyſicien, le 4 Juillet 1784, dans mon cabinet » deux barres d'acier brut, telles que les reçoivent les marchands cou- » teliers pour leur travail, chacune de deux pieds de longueur, de dix » lignes de largeur & de trois lignes d'épaiſſeur, ſur des cordons de » ſoie, ſuſpendus de manière qu'elles fuſſent horizontales & éloignées » de ſix pieds de tous les corps environnans, l'une dans la direction de » l'eſt à l'oueſt, & l'autre dans le méridien magnétique; m'étant aſſuré » avant d'iſoler ces barres, comme à l'ordinaire, qu'elles n'avoient » aucune vertu magnétique, & deſirant ſavoir s'il ſeroit poſſible, avec le » tems & les procédés ſimples que je viens de déſigner, de la leur » faire acquérir, j'ai, pour cet effet, répété, chaque jour, les expériences » néceſſaires pour m'en aſſurer ſans en avoir rien découvert de nou- » veau, que le 15 Octobre 1784, jour remarquable, dans lequel je fus » ſingulièrement étonné en réitérant les expériences que j'avois faites » précédemment, & même ledit jour, entre huit & neuf heures du » matin, de voir la barre placée dans la direction de l'eſt à l'oueſt, » attirer très-ſenſiblement par ſes deux bouts, la même limaille de fer » que j'avois depuis long-tems employée ſans ſuccès; voulant alors m'aſ- » ſurer plus particulièrement de ce phénomène, j'eſſayai de lui pré- » ſenter de fines aiguilles d'acier, que j'avois vérifiées n'avoir aucune des » propriétés de l'Aimant; elles furent, ainſi que la limaille, attirées » viſiblement; je répétai la choſe pluſieurs fois de ſuite, en changeant

eſt important, démontre le rapport immédiat du magnétiſme & de l'électricité, & prouve en même-tems que le fluide électrique eſt non-ſeulement la cauſe de la plupart des tremblemens de terre, mais qu'il produit auſſi l'aimantation de toutes les matières ferrugineuſes ſur leſquelles il exerce ſon action.

---

les aiguilles; malgré cela, j'obtins conſtamment le même réſultat, &« je parvins enfin à en faire porter de très-légères par le bout de la« barre, tourné du côté de l'oueſt; le bout oppoſé me parut un peu« moins fort; mais la différence étoit ſi petite, qu'il falloit apporter la« plus grande attention pour s'en appercevoir. Depuis cette époque, cette« barre a conſtamment conſervé la vertu magnétique qu'elle poſsède« encore aujourd'hui, 6 Octobre 1786, au même degré d'intenſité; ce« dont je juge par le poids qu'elle ſoutient, &c. &c. «

Il eſt néceſſaire de faire obſerver que le bout de la barre tourné vers« l'oueſt, formoit & forme encore aujourd'hui le pole boréal, & celui« oppoſé le pole auſtral, ce qui eſt parfaitement démontré par les pointes« qu'ils attirent des aiguilles de mes bouſſoles. Mais ce qu'il eſt ſur-« tout eſſentiel de faire remarquer, c'eſt que la barre placée dans la« direction du méridien magnétique, eſt abſolument dans le même état« que le premier jour où elle a été miſe en expérience, c'eſt-à-dire,« qu'elle n'a pas donné juſqu'à préſent le plus léger ſigne qu'elle fût« devenue magnétique; ces deux barres n'ont point été déplacées depuis« le premier jour qu'elles ont été miſes en expérience. «

Le 15 Octobre 1784, à midi & quelques minutes, j'étois occupé« à écrire dans mon cabinet, ſitué au deuxième étage, ayant deux« fenêtres du côté de l'oueſt, qui étoient ouvertes, ainſi qu'une porte« placée à l'eſt; ce qui formoit dans mon cabinet un courant d'air. Le«

Raſſemblant donc tous les rapports entre les phénomènes, toutes les convenances entre les principaux effets du magnétiſme & de l'électricité, il me ſemble qu'on ne peut pas ſe refuſer à croire qu'ils ſont produits par une ſeule & même cauſe, & je ſuis perſuadé que ſi on réfléchit ſur la théorie que je viens d'expoſer, on en reconnoîtra clairement l'identité. Simplifier les cauſes, & généraliſer les effets, doit être le but du Phyſicien, & c'eſt auſſi tout ce que peut

---

„ vent étoit nord, & l'air preſque calme; le baromètre à vingt-ſept „ pouces quatre lignes & demie; le thermomètre à dix degrés au-deſſus „ du terme de la congellation, le ciel ſerein, lorſque j'entendis un bruit „ ſourd, aſſez ſemblable à celui d'une voiture fortement chargée, rou„ lant ſur le pavé; au même inſtant le plancher ſupérieur de mon cabi„ net, & celui de ma chambre craquèrent avec violence, & je me ſentis „ balancer deux ou trois fois ſur ma chaiſe aſſez rudement. Je puis cer„ tifier par la manière dont j'étois placé, & d'après le mouvement d'oſ„ cillation que j'ai éprouvé, que les ſecouſſes de ce tremblement de „ terre ont duré environ trois à quatre ſecondes, & qu'elles ſuivoient la „ direction de l'eſt à l'oueſt; ce qui d'ailleurs m'a été confirmé par deux „ autres faits qui ſe ſont paſſés ſous mes yeux. Il eſt bon d'obſerver que „ les derniers jours qui ont précédé celui du tremblement de terre, ont „ été beaux, le vent étant au nord; que le lendemain dudit jour, il „ y eut un brouillard très-conſidérable, qui fut le dernier de l'au„ tomne; il dura pluſieurs heures de la matinée, après quoi le tems redevint ſerein & continua ainſi pendant pluſieurs jours. „ *Extrait d'une lettre de M. de Rozière à M. le Comte de Buffon, du* 14 *Décembre* 1786.

le Génie aidé de l'expérience, & guidé par les obſervations.

Or nous ſommes aujourd'hui bien aſſurés que le globe terreſtre a une chaleur qui lui eſt propre, & qui s'exhale inceſſamment par des émanations perpendiculaires à ſa ſurface; nous ſavons que ces émanations ſont conſtantes, très-abondantes dans les régions voiſines de l'équateur, & preſque nulles dans les climats froids. Ne doivent-elles pas dès-lors ſe porter de l'équateur aux deux poles par des courans oppoſés? & comme l'hémiſphère auſtral eſt plus refroidi que le boréal, qu'il préſente à ſa ſurface une plus grande étendue de plages glacées, & qu'il eſt expoſé pendant quelques jours de moins à l'action du ſoleil *(f)*, les émanations de la chaleur, qui forment les courans électriques & magnétiques, doivent s'y porter en plus grande quantité que dans l'hémiſphère boréal. Les poles magnétiques boréaux du globe, ſont dès-lors moins puiſſans que les poles magnétiques auſtraux. C'eſt l'oppoſé de ce qu'on obſerve dans les aimans, tant naturels qu'artificiels, dont le pole boréal eſt plus fort que le pole auſtral, ainſi que nous le prouverons dans les articles ſuivans, & comme c'eſt un effet conſtant du magnétiſme, que les poles ſemblables ſe repouſſent, &

(*f*) Voyez les Epoques de la Nature.

que les poles différens s'attirent, il n'eſt point ſurprenant que, dans quelque hémiſphère qu'on tranſporte l'aiguille aimantée, ſon pole nord ſe dirige vers le pole boréal du globe, dont il diffère par la quantité de ſa force, quoiqu'il porte le même nom, & qu'également ſon pole ſud ſe tourne toujours vers le pole auſtral de la terre, dont la force diffère auſſi, par ſa quantité, de celle du pole auſtral de l'aiguille aimantée. L'on verra donc aiſément comment, par une ſuite de l'inégalité des deux courans électriques, l'aiguille aimantée, qui marque les déclinaiſons, ſe tourne toujours vers le pole nord du globe, dans quelque hémiſphère qu'elle ſoit placée, tandis qu'au contraire, l'aiguille qui marque l'inclinaiſon de l'Aimant, s'incline vers le nord dans l'hémiſphère boréal, & vers le pole ſud dans l'hémiſphère auſtral, pour obéir à la force générale, qui va de l'équateur aux deux poles terreſtres, en ſuivant la courbure du globe, de même que les particules de limaille de fer, répandues ſur un Aimant, s'inclinent vers l'un ou l'autre des deux poles de cet Aimant, ſuivant qu'elles en ſont plus voiſines, ou que l'un des poles a plus de ſupériorité ſur l'autre. Ces phénomènes, dont l'explication a toujours paru difficile, ſont de nouvelles preuves de notre théorie, & montrent ſa liaiſon avec les grands faits de l'hiſtoire du globe.

Voilà donc les deux phénomènes de la direction aux poles, & de l'inclinaiſon à l'horizon ramenés à une

cauſe ſimple, dont les effets ſeroient toujours les mêmes ſi tous les êtres organiſés, & toutes les matières brutes, recevoient également les influences de cette force. Mais, dans les êtres vivans, la quantité de l'électricité qu'ils poſſèdent, ou qu'ils peuvent recevoir, eſt relative à leur organiſation; & il s'en trouve qui, comme la torpille, non-ſeulement la reçoivent, mais ſemblent l'attirer, au point de former une ſphère particulière d'électricité, combinée avec la vertu magnétique; comme auſſi, dans les matières brutes, le fer ſe fait une ſphère particulière d'électricité, à laquelle on a donné le nom de magnétiſme; & s'il exiſtoit des corps auſſi électriques que la torpille, & en aſſez grande quantité, pour former de grandes maſſes, auſſi conſidérables que celles des mines de fer en différens endroits du globe, n'eſt-il pas plus que probable, que le cours de l'électricité générale ſe fléchiroit vers ces maſſes électriques, comme elle ſe fléchit vers les grandes maſſes ferrugineuſes qui ſont à la ſurface du globe, & qu'elles produiroient les inflexions de cette force électrique ou magnétique, en la déterminant à ſe porter vers ces ſphères particulières d'attraction, comme vers autant de poles électriques plus ou moins éloignés des poles terreſtres, ſelon le giſſement des Continens & la ſituation de ces maſſes électriques.

Et comme la ſituation des poles magnétiques peut changer, & change réellement, tant par les travaux

de l'homme, leſquels peuvent enfouir ou découvrir les matières ferrugineuſes, que par les grands mouvemens de la Nature dans les tremblemens de terre, & dans la production des baſaltes & des laves, qui tous ſont magnétiques, on ne doit pas être ſi fort émerveillé du mouvement de l'aiguille aimantée vers l'oueſt, ou vers l'eſt; car ſa direction doit varier & changer, ſelon qu'il ſe forme de nouvelles chaînes de baſaltes & de laves, & qu'il ſe découvre de nouvelles mines, dont l'action favoriſe ou contrarie celle des mines plus anciennes.

Par exemple, la déclinaiſon de l'aiguille, à Paris, étoit, en 1580, de onze degrés à l'eſt. Le pole magnétique, c'eſt-à-dire les maſſes ferrugineuſes & magnétiques qui le formoient, étoient donc ſituées dans le nord de l'Europe, & peut-être en Sibérie; mais comme depuis cette année 1580 l'on a commencé à défricher quelques terrains dans l'Amérique ſeptentrionale, & qu'on a découvert & travaillé des mines de fer en Canada, & dans pluſieurs autres parties de cette région de l'Amérique, l'aiguille s'eſt peu-à-peu portée vers l'oueſt, par l'attraction de ces mines nouvelles plus puiſſantes que celle des anciennes; & ce mouvement progreſſif de l'aiguille pourroit devenir rétrograde, s'il ſe découvroit dans le nord de l'Europe & de l'Aſie d'autres grandes maſſes ferrugineuſes, qui par leur expoſition à l'air, & leur aimantation, deviendroient

bientôt

bientôt des poles magnétiques auſſi, & peut-être plus puiſſans que celui qui détermine aujourd'hui la déclinaiſon de l'aiguille vers le nord de l'Amérique, & dont l'exiſtence eſt prouvée par les obſervations.

Parmi ces cauſes toutes accidentelles, qui doivent faire changer la direction de l'Aimant, l'on doit compter comme l'une des plus puiſſantes, l'éruption des volcans, & les torrens de laves & de baſaltes, dont la ſubſtance eſt toujours mêlée de beaucoup de fer. Ces laves & ces baſaltes occupent ſouvent de très-grandes étendues à la ſurface de la terre, & doivent par conſéquent influer ſur la direction de l'Aimant; en ſorte qu'un volcan qui, par ſes éjections, produit ſouvent de longues chaînes de collines compoſées de laves & de baſaltes, forme, pour ainſi dire, de nouvelles mines de fer, dont l'action doit ſeconder ou contrarier l'effet des autres mines ſur la direction de l'Aimant.

Nous pouvons même aſſurer que ces baſaltes peuvent former, non-ſeulement de nouvelles mines de fer, mais auſſi de véritables maſſes d'Aimant, car leurs colonnes ont ſouvent des poles bien décidés d'attraction & de répulſion. Par exemple, les colonnades de baſalte des bords de la Volane, près de Val en Vivarais, ainſi que celles de la montagne de Chenavari, près de Rochemaure, qui ont plus de douze pieds de hauteur, préſentent pluſieurs colonnes douées de cette vertu magnétique, laquelle peut leur avoir été communiquée

par les foudres électriques, ou par le magnétiſme général du globe *(g)*.

Il en eſt de même des tremblemens de terre, & des bouleverſemens que produiſent leurs mouvemeus ſubits & déſaſtreux; ce ſont les foudres de l'électricité ſouterraine, dont les coups frappent & ſoulèvent par ſecouſſes de grandes portions de terre, & dès-lors toute la matière ferrugineuſe, qui ſe trouve dans cette grande étendue, devient magnétique par l'action de cette foudre électrique; ce qui produit encore de nouvelles mines attirables à l'Aimant, dans les lieux où il n'exiſtoit auparavant que du fer en rouille, en ocre, & qui, dans cet état, n'étoit point magnétique.

Les grands incendies des forêts produiſent auſſi une quantité conſidérable de matière ferrugineuſe & magnétique. La plus grande partie des terres du nouveau monde étoient, non-ſeulement couvertes, mais encore encombrées de bois morts ou vivans, auxquels on a mis le feu pour donner du jour, & rendre la terre ſuſceptible de culture. Et c'eſt ſur-tout dans l'Amérique ſeptentrionale que l'on a brûlé, & que l'on brûle encore ces immenſes forêts dans une vaſte étendue; & cette cauſe particulière peut avoir influé ſur la déclinaiſon vers l'oueſt, de l'Aimant en Europe.

(g) *Note communiquée par M. Faujas de Saint-Fond.*

On ne doit donc regarder la déclinaiſon de l'Aimant que comme un effet purement accidentel, & le magnétiſme comme un produit particulier de l'électricité du globe. Nous allons expoſer en détail tous les faits qui ont rapport aux phénomènes de l'Aimant, & l'on verra qu'aucun ne démentira la vérité de cette aſſertion.

ARTICLE II.

De la nature & de la formation de l'Aimant.

L'AIMANT n'eſt qu'un minéral ferrugineux, qui a ſubi l'action du feu, & enſuite a reçu, par l'électricité générale du globe terreſtre, ſon magnétiſme particulier. L'Aimant primordial eſt une mine de fer en roche vitreuſe, qui ne diffère des autres mines de fer produites par le feu primitif, qu'en ce qu'elle attire puiſſament les autres matières ferrugineuſes, qui ont de même ſubi l'action du feu. Ces mines de l'Aimant primordial, ſont moins fuſibles que les autres mines primitives de fer; elles approchent de la nature du régule de ce métal, & c'eſt par cette raiſon qu'elles ſont plus difficiles à fondre; l'Aimant primordial a donc ſouffert une plus violente ou plus longue impreſſion du feu primitif que les autres mines de fer, & il a en même-tems acquis la vertu magnétique par l'action de la force, qui, dès le commencement, a produit l'électricité du globe.

Cet Aimant de première formation a communiqué ſa vertu aux matières ferrugineuſes qui l'environnoient;

il a même formé de nouveaux Aimans, par le mélange de ſes débris avec d'autres matières, & ces Aimans de ſeconde formation ne ſont auſſi que des minéraux ferrugineux, provenans des détrimens du fer en état métallique, & qui ſont devenus magnétiques par la ſeule expoſition à l'action de l'électricité générale. Et comme le fer qui demeure long-tems dans la même ſituation acquiert toutes les propriétés du véritable Aimant, on peut dire que l'Aimant & le fer ne ſont au fonds que la même ſubſtance qui peut également prendre du magnétiſme à l'excluſion de toutes les autres matières minérales, puiſque cette même propriété magnétique ne ſe trouve dans aucun autre métal, ni dans aucune autre matière vitreuſe ou calcaire. L'Aimant de première formation, eſt une fonte ou régule de fer, mêlé d'une matière vitreuſe, pareille à celle des autres mines primordiales de fer; mais, dans les Aimans de ſeconde formation, il s'en trouve dont la matière pierreuſe eſt calcaire ou mêlangée d'autres ſubſtances hétérogènes. Ces Aimans ſecondaires varient plus que les premiers, par la couleur, la peſanteur, & par la quantité de force magnétique.

Mais cette matière vitreuſe ou calcaire des différentes pierres d'Aimant, n'eſt nullement ſuſceptible de magnétiſme, & ce n'eſt qu'aux parties ferrugineuſes contenues dans ces pierres, qu'on doit attribuer cette propriété; & dans toute pierre d'Aimant, vitreuſe ou

calcaire, la force magnétique eſt d'autant plus grande, que la pierre contient plus de parties ferrugineuſes ſous le même volume, en ſorte que les meilleurs Aimans, ſont ceux qui ſont les plus peſans: c'eſt par cette raiſon qu'on peut donner au fer, & mieux encore à l'acier, comme plus peſant que le fer, une force magnétique encore plus grande que celle de la pierre d'Aimant, parce que l'acier ne contient que peu ou point de particules terreuſes, & qu'il eſt preſqu'uniquement compoſé de parties ferrugineuſes réunies enſemble ſous le plus petit volume, c'eſt-à-dire, d'auſſi près qu'il eſt poſſible.

Ce qui démontre l'affinité générale entre le magnétiſme & toutes les mines de fer qui ont ſubi l'action du feu primitif, c'eſt que toutes ces mines ſont attirables à l'Aimant que réciproquement elles attirent, au lieu que les mines de fer en rouille, en ocre & en grains, formées poſtérieurement par l'intermède de l'eau, ont perdu cette propriété magnétique, & ne la reprennent qu'après avoir ſubi de nouveau l'action du feu. Il en eſt de même de tous nos fers & de nos aciers; c'eſt parce qu'ils ont, comme les mines primitives, ſubi l'action d'un feu violent qu'ils ſont attirables à l'Aimant. Ils ont donc, comme les mines primordiales de fer, un magnétiſme paſſif que l'on peut rendre actif, ſoit par le contact de l'Aimant, ſoit par la ſimple expoſition à l'impreſſion de l'électricité générale.

Pour bien entendre comment s'eſt opérée la formation des premiers Aimans, il ſuffit de conſidérer que toute matière ferrugineuſe qui a ſubi l'action du feu, & qui demeure quelque-tems expoſée à l'air dans la même ſituation, acquiert le magnétiſme & devient un véritable Aimant; ainſi, dès les premiers tems de l'établiſſement des mines primordiales de fer, toutes les parties extérieures de ces maſſes, qui étoient expoſées à l'air & qui ſont demeurées dans la même ſituation, auront reçu la vertu magnétique par la cauſe générale qui produit le magnétiſme du globe, tandis que toutes les parties de ces mêmes mines qui n'étoient pas expoſées à l'action de l'atmoſphère, n'ont point acquis cette vertu magnétique; il s'eſt donc formé dès-lors, & il peut encore ſe former des Aimans ſur les ſommets & les faces découvertes des mines de fer, & dans toutes les parties de ces mines qui ſont expoſées à l'action de l'atmoſphère.

Ainſi, les mines d'Aimant ne ſont que des mines de fer qui ſe ſont aimantées par l'action de l'électricité générale; elles ne ſont pas à beaucoup près en auſſi grandes maſſes que celles de fer, parce qu'il n'y a que les parties découvertes de ces mines qui aient pu recevoir la vertu magnétique; les mines d'Aimant ne doivent donc ſe trouver, & ne ſe trouvent en effet que dans les parties les plus extérieures de ces mines primordiales de fer & jamais à de grandes profondeurs, à moins

que ces mines n'aient été excavées, ou qu'elles ne ſoient voiſines de quelques cavernes, dans leſquelles les influences de l'atmoſphère auroient pu produire le même effet que ſur les ſommets ou ſur les faces découvertes de ces mines primitives.

Maintenant on ne peut douter que le magnétiſme général du globe ne forme deux courans, dont l'un ſe porte de l'équateur au nord, & l'autre en ſens contraire de l'équateur au ſud; la direction de ces courans eſt ſujette à variation, tant pour les lieux que pour le tems, & ces variations proviennent des inflexions du courant de la force magnétique, qui ſuit le giſſement des matières ferrugineuſes, & qui change à meſure qu'elles ſe découvrent à l'air ou qu'elles s'enfouiſſent par l'affaiſſement des cavernes, par l'effet des volcans, des tremblemens de terre, ou de quelque autre cauſe qui change leur expoſition; elles acquièrent donc ou perdent la vertu magnétique par ce changement de poſition, & dès-lors la direction de cette force doit varier, & tendre vers ces mines ferrugineuſes nouvellement découvertes, en s'éloignant de celles qui ſe ſont enfoncées.

Les variations dans la direction de l'Aimant, démontrent que les poles magnétiques ne ſont pas les mêmes que les poles du globe, quoiqu'en général la direction de la force qui produit le magnétiſme, tende de l'équateur aux deux poles terreſtres. Les matières ferrugineuſes qui

qui ſeules peuvent recevoir du courant de cette force les propriétés de l'Aimant, forment des poles particuliers ſelon le giſſement local, & la quantité plus ou moins grande des mines d'Aimant & de fer.

L'Aimant primordial n'a pas acquis au même inſtant ſon attraction & ſa direction; car le fer reçoit d'abord la force attractive, & ne prend des poles qu'en plus ou moins de tems, ſuivant ſa poſition & ſelon la proportion de ſes dimenſions. Il paroît donc que, dès le tems de l'établiſſement & de la formation des premières mines de fer par le feu primitif, les parties expoſées à l'action de l'atmoſphère ont reçu d'abord la force attractive, & ont pris enſuite des poles fixes, & acquis la puiſſance de ſe diriger vers les parties polaires du globe. Ces premiers Aimans ont certainement conſervé ces forces attractives & directives, quoiqu'elles agiſſent ſans ceſſe au-dehors, ce qui ſembleroit devoir les épuiſer, mais au contraire elles ſe communiquent de l'Aimant au fer, ſans ſouffrir aucune perte ni diminution.

Pluſieurs Phyſiciens, qui ont traité de la nature de l'Aimant, ſe ſont perſuadés qu'il circuloit dans l'Aimant une matière qui en ſortoit inceſſamment après y être entrée, & en avoir pénétré la ſubſtance. Le célèbre Géomètre Euler, & pluſieurs autres *(a)*, voulant ex-

(*a*) Je voudrois excepter de ce nombre Daniel Bernoulli, homme

pliquer mécaniquement les phénomènes magnétiques, ont adopté l'hypothèſe de Deſcartes, qui ſuppoſe dans la ſubſtance de l'Aimant des conduits & des pores ſi étroits, qu'ils ne ſont perméables qu'à cette matière magnétique, ſelon eux, plus ſubtile que toute autre matière ſubtile; &, ſelon eux encore, ces pores de l'Aimant & du fer, ſont garnis de petites ſoupapes, de filets ou de poils mobiles, qui tantôt obéiſſent, & tantôt s'oppoſent au courant de cette matière ſi ſubtile. Ils ſe ſont efforcés de faire cadrer les phénomènes du magnétiſme, avec ces ſuppoſitions peu naturelles & plus que précaires, ſans faire attention que leur opinion n'eſt fondée que ſur la fauſſe idée qu'il eſt poſſible d'expliquer mécaniquement tous les effets des forces de la Nature. Euler a même cru pouvoir démontrer la cauſe de l'attraction univerſelle, par l'action du même fluide, qui, ſelon lui, produit le magnétiſme. Cette prétention, quoique vaine & mal conçue, n'a

---

d'un eſprit excellent; « je me ſens, dit-il, de la répugnance à croire » que la Nature ait formé cette matière cannelée, & ces conduits magné- » tiques qui ont été imaginés par quelques phyſiciens, uniquement pour nous donner le ſpectacle des différens jeux de l'Aimant.... » Néanmoins ce grand mathématicien rapporte comme les autres à des cauſes mécaniques les effets de l'Aimant; ſes hypothèſes ſont ſeulement plus générales & moins multipliées. *Voyez les pièces qui ont remporté le prix de l'Académie des Sciences, année 1746.*

pas laiſſé de prévaloir dans l'eſprit de quelques Phyſiciens, & cependant, ſi l'on conſidère ſans préjugé la Nature & ſes effets, & ſi l'on réfléchit ſur les forces d'attraction & d'impulſion qui l'animent, on reconnoîtra que leurs cauſes ne peuvent ni s'expliquer, ni même ſe concevoir par cette mécanique matérielle, qui n'admet que ce qui tombe ſous nos ſens, & rejette, en quelque ſorte, ce qui n'eſt apperçu que par l'eſprit; & de fait, l'action de la peſanteur ou de l'attraction, peut-elle ſe rapporter à des effets mécaniques, & s'expliquer par des cauſes ſecondaires, puiſque cette attraction eſt une force générale, une propriété primitive, & un attribut eſſentiel de toute matière? Ne ſuffit-il pas de ſavoir que toute matière s'attire, & que cette force s'exerçe, non-ſeulement dans toutes les parties de la maſſe du globe terreſtre, mais s'étend même depuis le ſoleil juſqu'aux corps les plus éloignés dans notre univers, pour être convaincu que la cauſe de cette attraction ne peut nous être connue, puiſque ſon effet étant univerſel, & s'exerçant généralement dans toute matière, cette cauſe ne nous offre aucune différence, aucun point de comparaiſon, ni par conſéquent aucun indice de connoiſſance, aucun moyen d'explication? En ſe ſouvenant donc que nous ne pouvons rien juger que par comparaiſon, nous verrons clairement qu'il eſt non-ſeulement vain, mais abſurde de vouloir rechercher & expliquer la cauſe d'un effet

général & commun à toute matière, tel que l'attraction univerſelle, & qu'on doit ſe borner à regarder cet effet général comme une vraie cauſe à laquelle on doit rapporter les autres forces, en comparant leurs différens effets; & ſi nous comparons l'attraction magnétique à l'attraction univerſelle, nous verrons qu'elles diffèrent très-eſſentiellement. L'Aimant eſt, comme toute autre matière, ſujet aux loix de l'attraction générale, & en même-tems il ſemble poſſéder une force attractive particulière, & qui ne s'exerce que ſur le fer ou ſur un autre Aimant; or nous avons démontré que cette force, qui nous paroît attractive, n'eſt dans le réel qu'une force impulſive, dont la cauſe & les effets ſont tous différens de ceux de l'attraction univerſelle.

Dans le ſyſtème adopté par la plupart des Phyſiciens, on ſuppoſe un grand tourbillon de matière magnétique, circulant autour du globe terreſtre, & de petits tourbillons de cette même matière, qui non-ſeulement circule d'un pole à l'autre de chaque Aimant, mais entre dans leurs ſubſtances, & en ſort pour y rentrer. Dans la phyſique de Deſcartes, tout étoit tourbillon, tout s'expliquoit par des mouvemens circulaires & des impulſions tourbillonnantes; mais ces tourbillons, qui rempliſſoient l'univers, ont diſparu; il ne reſte que ceux de la matière magnétique dans la tête de ces Phyſiciens. Cependant l'exiſtence de ces tourbillons magnétiques eſt auſſi peu fondée que celle des tour-

billons planétaires; & on peut démontrer, par plusieurs faits *(b)*, que la force magnétique ne se meut pas en tourbillon autour du globe terrestre non plus qu'autour de l'Aimant.

La vertu magnétique, que l'Aimant possède éminemment, peut de même appartenir au fer, puisque l'Aimant la lui communique par le simple contact, & que même le fer l'acquiert sans ce secours, lorsqu'il est exposé aux impressions de l'atmosphère; le fer

---

(*b*) L'un de nos savans Académiciens, M. le Monnier, qui s'est occupé des phénomènes de l'Aimant, a fait plusieurs expériences pour démontrer le peu de fondement de cette hypothèse des tourbillons autour de l'Aimant. Il a mis sur un carton deux Aimans, dont les poles de différens noms étoient voisins; en ce cas, selon le système commun, les deux tourbillons magnétiques doivent s'être réunis en un seul, & par conséquent il ne devroit se former sur la limaille du carton que deux vides répondant aux deux poles; mais le fait est qu'il se forme toujours quatre vides, ce qui démontre que les deux tourbillons ne sont pas confondus, & que la matière magnétique ne passe pas d'un Aimant à l'autre..... & certainement s'il y a un tourbillon, il s'étend bien à deux ou trois lignes de la pierre. Cependant que l'on aimante une aiguille de bousole, en la faisant couler à l'ordinaire sur la pierre, &, en même-tems, en lui faisant toucher les deux boutons de l'armure, ou en la tenant éloignée de ces boutons de deux ou trois lignes seulement, elle prendra dans les deux cas, deux directions diamétralement opposées, tout le reste ayant été parfaitement égal : la même extrémité de l'aiguille qui se tourneroit au nord, se tournera au sud, &c. *Histoire de l'Académie des Sciences, année* 1733, *pages* 15 & 16.

devient alors un véritable Aimant, s'il reſte long-tems dans la même ſituation; de plus il s'aimante aſſez fortement par la percuſſion, par le frottement de la lime, ou ſeulement en le pliant & repliant pluſieurs fois; mais ces derniers moyens ne donnent au fer qu'un magnétiſme paſſager, & ce métal ne conſerve la vertu magnétique, que quand il l'a empruntée de l'Aimant, ou bien acquiſe par une expoſition à l'action de l'électricité générale pendant un tems aſſez long pour prendre des poles fixes dans une direction déterminée.

Lorſque le fer, tenu long-tems dans la même ſituation, acquiert de lui-même la vertu magnétique, qu'il la conſerve, & qu'il peut même la communiquer à d'autres fers, comme le fait l'Aimant, doit-on ſe réfuſer à croire que, dans les mines primitives, les parties qui ſe ſont trouvées expoſées à ces mêmes impreſſions de l'atmoſphère, ne ſoient pas celles qui ont acquis la vertu magnétique? & que par conſéquent toutes les pierres d'Aimans qui ne forment que de petits blocs en comparaiſon des montagnes & des autres maſſes des mines primordiales de fer, étoient auſſi les ſeules parties expoſées à cette action extérieure, qui leur a donné les propriétés magnétiques. Rien ne s'oppoſe à cette vue ou plutôt à ce fait; car la pierre d'Aimant eſt certainement une matière ferrugineuſe, moins fuſible à la vérité que la plupart des autres mines de fer; & cette dernière propriété indique ſeulement qu'il a fallu peut-

être le concours de deux circonſtances, pour la production de ces Aimans primitifs, dont la première a été la ſituation & l'expoſition conſtante à l'impreſſion du magnétiſme général; & la ſeconde, une qualité différente dans la matière ferrugineuſe, qui compoſe la ſubſtance de l'Aimant. Car la mine d'Aimant n'eſt plus difficile à fondre que les autres mines de fer en roche, que par cette différence de qualité; l'Aimant primordial approche, comme nous l'avons dit, de la nature du régule de fer, qui eſt bien moins fuſible que ſa mine. Ainſi, cet Aimant primitif eſt une mine de fer, qui, ayant ſubi une plus forte action du feu que les autres mines, eſt devenue moins fuſible; & en effet les mines d'Aimant ne ſe trouvent pas comme les autres mines de fer, par grandes maſſes continues, mais par petits blocs placés à la ſurface de ces mêmes mines, où le feu primitif, animé par l'air, étoit plus actif que dans leur intérieur.

Ces blocs d'Aimant ſont plus ou moins gros, & communément ſéparés les uns des autres; chacun a ſa ſphère particulière d'attraction & ſes poles, & puiſque le fer peut acquérir de lui-même toutes ces propriétés dans les mêmes circonſtances, ne doit-on pas en conclure que, dans les mines primordiales de fer, les parties qui étoient expoſées au feu plus vif que l'air excitoit à la ſurface du globe en incandeſcence, auront ſubi une plus violente action de ce feu, & ſe feront

en même-tems diviſées, fendues, ſéparées, & qu'elles auront acquis d'elles-mêmes cette puiſſance magnétique, qui ne diminue ni ne s'épuiſe, & demeure toujours la même, parce qu'elle dépend d'une cauſe extérieure, toujours ſubſiſtante & toujours agiſſante.

La formation des premiers Aimans me paroît donc bien démontrée, mais la cauſe première du magnétiſme en général, n'en étoit pas mieux connue. Pour deviner ou même ſoupçonner qu'elles peuvent être la cauſe, ou les cauſes d'un effet particulier de la Nature, tel que le magnétiſme, il falloit auparavant conſidérer les phénomènes en expoſant tous les faits acquis par l'expérience & l'obſervation. Il falloit les comparer entre eux, & avec d'autres faits analogues, afin de pouvoir tirer du réſultat de ces comparaiſons, les lumières qui devoient nous guider dans la recherche des cauſes inconnues & cachées; c'eſt la ſeule route que l'on doive prendre & ſuivre, puiſque ce n'eſt que ſur des faits, bien avérés, bien entendus, qu'on peut établir des raiſonnemens ſolides; & plus ces faits ſeront multipliés, plus il deviendra poſſible d'en tirer des inductions plauſibles, & de les réunir pour en faire la baſe d'une théorie bien fondée, telle que nous paroît être celle que j'ai préſentée dans le premier chapitre de ce traité.

Mais comme les faits particuliers qu'il nous reſte à expoſer, ſont auſſi nombreux que ſinguliers, qu'ils paroiſſent quelquefois oppoſés ou contraires, nous commencerons

mencerons par les phénomènes qui ont rapport à l'attraction ou à la répulsion de l'Aimant, & ensuite nous exposerons ceux qui nous indiquent sa direction avec ses variations, tant en déclinaison qu'en inclinaison ; chacune de ces grandes propriétés de l'Aimant doit être considérée en particulier, & d'autant plus attentivement, qu'elles paroissent moins dépendantes les unes des autres, & qu'en ne les jugeant que par les apparences, leurs effets sembleroient provenir de causes différentes.

Au reste, si nous recherchons le tems où l'Aimant & ses propriétés ont commencé d'être connus, ainsi que les lieux où ce minéral se trouvoit anciennement, nous verrons, par le témoignage de Théophraste, que l'Aimant étoit rare chez les Grecs, qui ne lui connoissoient d'autre propriété que celle d'attirer le fer ; mais du tems de Pline, c'est-à-dire trois siècles après, l'Aimant étoit devenu plus commun, & aujourd'hui il s'en trouve plusieurs mines dans les terres voisines de la Grèce, ainsi qu'en Italie, & particulièrement à l'Isle d'Elbe. On doit donc présumer que la plupart des mines de ces contrées ont acquis, depuis le tems de Théophraste, leur vertu magnétique à mesure qu'elles ont été découvertes, soit par des effets de Nature, soit par le travail des hommes ou par le feu des volcans.

On trouve de même des mines d'Aimant dans presque toutes les parties du monde, & sur-tout dans

les pays du Nord, où il y a beaucoup plus de mines primordiales de fer que dans les autres régions de la terre. Nous avons donné ci-devant la defcription des mines aimantées de Sibérie *(c)*, & l'on fait que l'Aimant eft fi commun en Suède & en Norwège, qu'on en fait un commerce aſſez conſidérable *(d)*.

Les Voyageurs nous aſſurent qu'en Aſie il y a de bons Aimans au Bengale, à Siam *(e)*, à la

(c) Voyez les ſupplémens à cette Hiſtoire naturelle, tom. V, *in*-4.°, pages 531 & ſuivantes.

(d) La pierre d'Aimant eſt en ſi grande quantité en Norwège & en Suède, qu'on l'envoie par tonneaux hors du pays. Pontoppidam, *Journal étranger, mois de Septembre 1755, page 213.*

(e) Il y a deux mines d'Aimant dans le Royaume de Siam..... Ces mines ſont dans une montagne à laquelle elles paroiſſent comme attachées ; elles ſemblent être diviſées en deux roches, qui apparemment ſont réunies ſous terre ; la grande qui s'étend d'Orient en Occident, peut avoir vingt-quatre ou vingt-cinq pas géométriques de longueur, & quatre ou cinq de largeur. Dans ſa plus grande hauteur, elle a neuf ou dix pieds. La petite qui eſt au Nord de la grande, dont elle n'eſt éloignée que de ſept ou huit pieds, a trois toiſes de long, peu de hauteur & de largeur ; elle eſt d'un Aimant bien plus vif que l'autre. Elle attiroit avec une force extraordinaire les inſtrumens de fer dont on ſe ſervoit. On ne pouvoit en détacher aucun morceau, parce que les inſtrumens de fer qui étoient fort mal trempés, étoient auſſi-tôt reboulés. On s'attacha à la grande, dont on eut peine de rompre quelques morceaux qui avoient de la ſaillie, & qui donnoient de la priſe au marteau. On ne laiſſa pas que d'en tirer quelques bonnes pierres ; les poles de la mine, autant qu'on

Chine (*f*), & aux Iſles Philippines (*g*) ; ils font auſſi mention de ceux de l'Afrique (*h*) & de l'Amérique (*i*).

---

en peut juger par les morceaux de fer qu'on y appliqua, regardoient le midi & le ſeptentrion ; car on n'a pu rien reconnoître par la bouſſole, l'aiguille s'affolant ſi-tôt qu'on l'en approchoit. *Hiſt. génér. des voyages, tom. IX, pages* 206 & 245.

(*f*) Il y a peu de Provinces dans la Chine, où l'on ne trouve des pierres d'Aimant. On en apporte auſſi du Japon à la Chine, mais on les emploie particulièrement aux uſages de la médecine ; elles ſe vendent au poids, & les plus chères ne ſe vendent jamais plus de huit ſols l'once, *idem, tom. VI, page* 85.

(*g*) On trouve beaucoup d'Aimant à Mindanao... *Voyage de M. le Gentil aux Indes. Paris* 1781, *tom. II, page* 36.

(*h*) On trouve dans le Bambouk, en Afrique, d'excellentes pierres d'Aimant, dont on a envoyé pluſieurs morceaux en France. *Hiſt. génér. des voyages, tom. II, page* 644.

(*i*) On fit voir à Gemelli-Caréri, dans un cabinet de raretés, au Mexique, une pierre d'Aimant, de la groſſeur d'une pomme ordinaire, qui enlevoit dix livres de fer, *idem, tom. XI, page* 536 ; le corrégiment de Copiapo, au Chili, produit quantité de pierres d'Aimant, *idem, tom. XIII, page* 144.

ARTICLE III.

De l'attraction & de la répulsion de l'Aimant.

LE MOUVEMENT du magnétisme semble être composé de deux forces, l'une attractive & l'autre directive. Un Aimant, de quelque figure qu'il soit, attire le fer de tous côtés & dans tous les points de sa surface ; & plus les pierres d'Aimant sont grosses, moins elles ont de force attractive, relativement à leur volume : elles en ont d'autant plus, qu'elles sont plus pesantes, & toutes ont beaucoup moins de puissance d'attraction quand elles sont nues, que quand elles sont armées de fer ou d'acier. La force directive, au contraire, se marque mieux, & avec plus d'énergie, sur les Aimans nuds, que sur ceux qui sont armés.

Quelques savans Physiciens, & entr'autres, Taylor & Muschembroëck, ont essayé de déterminer, par des expériences, l'étendue de la sphère d'attraction de l'Aimant, & l'intensité de cette action à différentes distances ; ils ont observé, qu'avec de bons Aimans, cette force attractive étoit sensible jusqu'à treize ou quatorze pieds de distance, &, sans doute, elle s'étend encore

plus loin; ils ont auſſi reconnu que rien ne pouvoit intercepter l'action de cette force, en ſorte qu'un Aimant renfermé dans une boîte, agit toujours à la même diſtance. Ces faits ſuffiſent pour qu'on puiſſe concevoir, qu'en plaçant & cachant des Aimans & du fer en différens endroits, même aſſez éloignés, on peut produire des effets qui paroiſſent merveilleux, parce qu'ils s'opèrent à quelque diſtance, ſans action apparente d'aucune matière intermédiaire, ni d'aucun mouvement communiqué.

Les Anciens n'ont connu que cette première propriété de l'Aimant; ils ſavoient que le fer, de quelque côté qu'on le préſente, eſt toujours attiré par l'Aimant; ils n'ignoroient pas que deux Aimans préſentés l'un à l'autre, s'attirent ou ſe repouſſent. Les Phyſiciens modernes, ont démontré que cette attraction & cette répulſion entre deux Aimans, ſont égales, & que la plus forte attraction ſe fait lorſqu'on préſente directement les poles de différent nom, c'eſt-à-dire, le pole auſtral d'un Aimant, au pole boréal d'un autre Aimant; & que, de même, la répulſion eſt la plus forte, quand on préſente l'un à l'autre les poles de même nom. Enſuite ils ont cherché la loi de cette attraction & de cette répulſion, & ils ont reconnu, qu'au lieu d'être comme la loi de l'attraction univerſelle, en raiſon inverſe du quarré de la diſtance, cette attraction & cette répulſion magnétiques ne décroiſſent pas même autant

que la diſtance augmente *(a)*; mais lorſqu'ils ont voulu graduer l'échelle de cette loi, ils y ont trouvé tant d'inconſtance, & de ſi grandes variations, qu'ils n'ont pu déterminer aucun rapport fixe, aucune proportion ſuivie, entre les degrés de puiſſance de cette force attractive, & les effets qu'elle produit à différentes diſtances: tout ce qu'ils ont pu conclure d'un nombre infini d'expériences, c'eſt que la force attractive de l'Aimant décroît proportionnellement plus dans les grandes que dans les petites diſtances.

Nous venons de dire que les Aimans ne ſont pas tous d'égale force, à beaucoup près; que plus les pierres d'Aimant ſont groſſes, moins elles ont de force attractive, relativement à leur volume, & qu'elles en ont d'autant plus qu'elles ſont plus peſantes, à volume égal; mais nous devons ajouter, que les Aimans les plus puiſſans ne ſont pas toujours les plus généreux,

---

(*a*) Muſchembroëck, *diſſertatio de magnete*, *pages 16 & ſuiv.*, pour connoître la loi de cette attraction, ce Phyſicien s'eſt ſervi d'Aimans de forme ronde, &, par une balance très-mobile, il a meſuré l'effet de cette force à toutes diſtances, depuis une demi-ligne juſqu'à pluſieurs pouces; en comparant les réſultats d'un très-grand nombre d'expériences, il a vu que cette force attractive des Aimans ſphériques, non-ſeulement ne diminuoit pas comme celle de l'attraction univerſelle, en raiſon inverſe du quarré de la diſtance, mais que la diminution de cette force magnétique n'eſt pas même en raiſon inverſe de la ſimple diſtance.

en ſorte que quelquefois ces Aimans plus puiſſans ne communiquent pas au fer autant de leur vertu attractive, que des Aimans plus foibles & moins riches, mais en même-tems moins avares de leur propriété.

La ſphère d'activité des Aimans foibles, eſt moins étendue que celle des Aimans forts; &, comme nous l'avons dit, la force attractive des uns & des autres, décroît beaucoup plus dans les grandes que dans les petites diſtances; mais, dans le point de contact, cette force, dont l'action eſt très-inégale à toutes les diſtances dans les différens Aimans, produit alors un effet moins inégal dans l'Aimant foible & dans l'Aimant fort, de ſorte qu'il faut employer des poids moins inégaux pour ſéparer les Aimans forts & les Aimans foibles, lorſqu'ils ſont unis au fer ou à l'Aimant par un contact immédiat.

Le fer attire l'Aimant, autant qu'il en eſt attiré; tout deux, lorſqu'ils ſont en liberté, font la moitié du chemin, pour s'approcher ou ſe joindre. L'action & la réaction ſont ici parfaitement égales; mais un Aimant attire le fer de quelque côté qu'on le préſente, au lieu qu'il n'attire un autre Aimant que dans un ſens, & qu'il le repouſſe dans le ſens oppoſé.

La limaille de fer eſt attirée plus puiſſamment par l'Aimant, que la poudre même de la pierre d'Aimant, parce qu'il y a plus de parties ferrugineuſes dans le fer forgé, que dans cette pierre, qui néanmoins agit

de plus loin ſur le fer aimanté, qu'elle ne peut agir ſur du fer non-aimanté, car le fer n'a par lui-même aucune force attractive; deux blocs de ce métal, mis l'un auprès de l'autre, ne s'attirent pas plus que deux maſſes de toute autre matière; mais, dès que l'un ou l'autre, ou tous deux, ont reçu la vertu magnétique, ils produiſent les mêmes effets, & préſentent les mêmes phénomènes que la pierre d'Aimant, qui n'eſt en effet qu'une maſſe ferrugineuſe aimantée par la cauſe générale du magnétiſme. Le fer ne prend aucune augmentation de poids par l'imprégnation de la vertu magnétique; la plus groſſe maſſe de fer ne pèſe pas un grain de plus, quelque fortement qu'elle ſoit aimantée; le fer ne reçoit donc aucune matière réelle par cette communication, puiſque toute matière eſt peſante, ſans même en excepter celle du feu *(b)*. Cependant le feu violent agit ſur l'Aimant & ſur le fer aimanté; il diminue beaucoup, ou plutôt il ſuſpend leur force magnétique lorſqu'ils ſont échauffés juſqu'à l'incandeſcence, & ils ne reprennent cette vertu, qu'à meſure qu'ils ſe refroidiſſent. Une chaleur égale à celle du plomb fondu *(c)*, ne ſuffit pas pour produire cet effet;

(*b*) Voyez le deuxième vol. *in*-4.° des ſupplémens à cette Hiſtoire naturelle, article de la peſanteur du feu.

(*c*) Pour faire des Aimans d'un volume conſidérable, les ouvriers joignent enſemble pluſieurs petits morceaux d'Aimant qu'ils réuniſſent,

&

& d'ailleurs le feu, quelque violent qu'il ſoit, laiſſe toujours à l'Aimant & au fer aimanté quelque portion de leurs forces ; car, dans l'état de la plus grande incandeſcence, ils donnent encore des ſignes ſenſibles, quoique foibles, de leur magnétiſme ; M. Epinus a même éprouvé que des Aimans naturels portés à l'état d'incandeſcence, refroidis enſuite, & placés entre deux grandes barres d'acier fortement aimantées, acquéroient un magnétiſme plus fort (*d*) ; &, par la comparaiſon de ſes expériences, il paroît que plus un Aimant eſt

---

en les appliquant d'abord les uns contre les autres, & les plongeant enſuite dans du plomb ou de l'étain fondus. La chaleur communiquée par ces métaux fondus à cette maſſe d'Aimant, n'en diminue pas la force, & il faut un bien plus grand degré de chaleur, & même un feu très-violent, pour opérer cette diminution ou ſuſpenſion de force de l'Aimant & du fer aimanté. *Muſchembroëck, page 73.*

(*d*) Le premier Aimant que j'ai ſoumis à l'expérience, dit M. Epinus, « étoit un parallélipipède régulier, il étoit noirâtre, ſans éclat métallique, « très-homogène, très-compact, & tel que ſont communément les Aimans « de mauvaiſe qualité. Il n'avoit preſque pas de force, car il peſoit nud « deux onces $\frac{58}{64}$, avec ſon armure trois onces $\frac{62}{64}$, & n'élevoit que « quatre onces. Je l'ai dépouillé de ſon armure, je l'ai placé entre deux « grandes barres d'acier fortement aimantées, ſuivant la manière que j'ai « décrite, &, après une demi-heure, j'ai trouvé que ſa vertu étoit aug- « mentée, & que rejoint à ſon armure, il pouvoit élever 12 onces $\frac{1}{2}$; je « l'ai expoſé au feu libre des charbons, je l'ai laiſſé dans une forte incan- « deſcence pendant une demi-heure ; j'ai trouvé, après ſon refroidiſſe- «

vigoureux par ſa nature, mieux il reçoit & conſerve ce ſurcroît de force.

L'action du feu ne fait donc que diminuer ou ſuſpendre la vertu magnétique, & concourt même quel-

---

» ment, qu'il avoit perdu preſque toute la force magnétique qu'il poſ-» ſédoit. Je l'ai placé pendant un quart-d'heure entre les deux barres » aimantées dont j'ai déjà parlé, & j'ai trouvé que, garni de ſon armure, » il élevoit déjà plus de dix-huit onces; il a donc, après ſon incandeſ-» cence, obtenu par le moyen des barres aimantées, dans un court » eſpace de tems, une force beaucoup plus conſidérable que celle qu'il » avoit acquiſe, pendant un tems plus long, avant d'être expoſé au feu. » Il eſt donc évident que l'aptitude de cet Aimant, à recevoir le » magnétiſme, a été augmentée par mon procédé dans le rapport de » trente-ſept à vingt-ſept, ce qui revient à-peu-près à celui de ſept » à cinq.

» Un autre Aimant qui peſoit nud quatre onces $\frac{1}{4}$, & cinq onces $\frac{7}{8}$ avec » ſon armure, préſentoit auſſi une matière uniforme & compacte, mais » il paroiſſoit plus riche en métal que le premier Aimant; lorſqu'il étoit » revêtu de ſon armure, il portoit ſix onces $\frac{3}{4}$; placé une demi-heure » entre les Aimans artificiels, avant d'être expoſé à l'action du feu, » il ne put pas porter au-delà de vingt-deux onces $\frac{3}{4}$; tenu en incan-» deſcence au milieu des charbons pendant une demi-heure, & enſuite » refroidi, il avoit perdu preſque toute ſa force; mais placé pendant un » quart-d'heure au milieu des Aimans artificiels, il éleva facilement trente-» ſept onces $\frac{1}{2}$, & ſon aptitude à recevoir la vertu magnétique, ſe trouva » augmentée dans le rapport d'environ huit à cinq. Il paroît donc que » la méthode que je décris, produit des effets d'autant plus grands, que » les Aimans ſont plus généreux, avant d'être préſentés au feu. J'ai vu » auſſi, par le moyen du dernier Aimant dont je viens de parler, que

quefois à l'augmenter ; cependant la percuſſion, qui produit toujours de la chaleur lorſqu'elle eſt réitérée, ſemble détruire cette force en entier ; car, ſi l'on frappe fortement, & par pluſieurs coups ſucceſſifs, une lame de fer aimantée, elle perdra ſa vertu magnétique, tandis qu'en frappant de même une ſemblable lame non-aimantée, celle-ci acquerra, par cette percuſſion, d'autant plus de force magnétique que les coups ſeront plus forts & plus réitérés ; mais il faut remarquer que la percuſſion, ainſi que l'action du feu, qui ſemble détruire la vertu magnétique, ne font que la changer ou la chaſſer, pour en ſubſtituer une autre,

---

l'augmentation de force obtenue par ma méthode, étoit aſſez durable « & ne ſe diſſipoit pas facilement, car ce ſecond Aimant n'avoit encore « rien perdu de ſa vigueur au bout de ſix mois. »

M. Epinus croit qu'on pourroit augmenter encore plus la vigueur des Aimans par la cémentation qui leur donneroit plus de qualité que la ſimple torréfaction au feu nud. Il propoſe de tailler en parallélipipèdes les Aimans tirés immédiatement de la mine, en leur donnant le plus de longueur qu'il ſe pourra, pour les cémenter au feu & les plonger enſuite dans l'eau froide ; après quoi, il propoſe de les placer entre deux ou pluſieurs barres d'acier aimantées, & de les frotter avec deux Aimans artificiels, ſuivant la méthode du double contact. Il faudra auſſi les armer après avoir choiſi pour poles les points les plus éloignés l'un de l'autre. Ces Aimans préſenteront alors la plus grande force magnétique qu'ils puiſſent comporter. *Epinus*, *N.os* 359, 360 & 362.

puiſqu'elles ſuffiſent pour aimanter le fer qui ne l'eſt pas; elles ôtent donc au fer aimanté, la force communiquée par l'Aimant, & en même-tems y portent & lui ſubſtituent une nouvelle force magnétique, qui devient très-ſenſible lorſque la percuſſion eſt continuée; le fer perd la première, & acquiert la ſeconde, qui eſt ſouvent plus foible & moins durable; il arrive ici le même effet, à-peu-près, que quand on paſſe ſur un Aimant foible du fer aimanté par un Aimant fort, ce fer perd la grande force magnétique qui lui avoit été communiquée par l'Aimant fort, & il acquiert en même-tems la petite force que peut lui donner l'Aimant foible.

Si l'on met dans un vaſe de la limaille de fer, & qu'on la comprime aſſez pour en faire une maſſe compacte, à laquelle on donnera la vertu magnétique, en l'appliquant ou la frottant contre l'Aimant, elle la recevra comme toute autre matière ferrugineuſe; mais cette même limaille de fer comprimée, qui a reçu la vertu magnétique, perdra cette vertu dès qu'elle ne fera plus maſſe, & qu'elle ſera réduite au même état pulvérulent où elle étoit avant d'avoir été comprimée. Il ſuffit donc de changer la ſituation reſpective des parties conſtituantes de la maſſe pour faire évanouïr la vertu magnétique; chacune des particules de limaille, doit être conſidérée comme une petite aiguille aimantée, qui dès-lors a ſa direction & ſes poles. En changeant

donc la ſituation reſpective des particules, leurs forces attractives & directives ſeront changées & détruites les unes par les autres; ceci doit s'appliquer à l'effet de la percuſſion, qui, produiſant un changement de ſituation dans les parties du fer aimanté, fait évanouïr ſa force magnétique. Cela nous démontre auſſi la cauſe d'un phénomène qui a paru ſingulier, & aſſez difficile à expliquer.

Si l'on met une pierre d'Aimant au-deſſus d'une quantité de limaille de fer que l'on agitera ſur un carton, cette limaille s'arrangera, en formant pluſieurs courbes ſéparées les unes des autres, & qui laiſſent deux vides aux endroits qui correſpondent aux poles de la pierre; on croiroit que ces vides ſont occaſionnés par une répulſion qui ne ſe fait que dans ces deux endroits, tandis que l'attraction s'exerce ſur la limaille dans tous les autres points; mais lorſqu'on préſente l'Aimant ſur la limaille de fer, ſans la ſecouer, ce ſont, au contraire, les poles de la pierre qui toujours s'en chargent le plus. Ces deux effets oppoſés ſembleroient, au premier coup-d'œil, indiquer que la force magnétique eſt tantôt très-active, & tantôt abſolument inactive aux poles de l'Aimant; cependant il eſt très-certain, & même néceſſaire, que ces deux effets, qui ſemblent être contraires, proviennent de la même cauſe, & comme rien ne trouble l'effet de cette cauſe dans l'un des cas, & qu'elle eſt troublée dans l'autre

par les ſecouſſes qu'on donne à la limaille, on doit en inférer que la différence ne dépend que du mouvement donné à chaque particule de la limaille.

En général, ces particules étant autant de petites aiguilles, qui ont reçu de l'Aimant les forces attractives & directives preſque en même-tems & dans le même ſens, elles doivent perdre ces forces & changer de direction, dès que, par le mouvement qu'on leur imprime, leur ſituation eſt changée. La limaille ſera par conſéquent attirée, & s'ammoncelera, lorſque les poles auſtraux de ces petites aiguilles ſeront diſpoſés dans le ſens du pole boréal de l'Aimant, & cette même limaille formera des vides, lorſque les poles boréaux des particules ſeront dans le ſens du pole boréal de l'Aimant, parce que, dans tout Aimant, ou fer aimanté, les poles de différens noms, s'attirent, & ceux du même nom ſe repouſſent.

Il peut arriver cependant quelquefois, lorſqu'on préſente un Aimant vigoureux à un Aimant foible, que les poles de même nom s'attirent au lieu de ſe repouſſer; mais ils ont ceſſé d'être ſemblables lorſqu'ils tendent l'un vers l'autre; l'Aimant fort détruit par ſa puiſſance la vertu magnétique de l'Aimant foible, & lui en communique une nouvelle, qui change ſes poles; on peut expliquer, par cette même raiſon, pluſieurs phénomènes analogues à cet effet, & particulièrement celui que M. Epinus a obſervé le pre-

mier, & que nous citons, par extrait, dans la note ci-deſſous *(e)*.

(*e*) Que l'on tienne verticalement un Aimant au-deſſus d'une table, ſur laquelle on aura placé une petite aiguille d'acier à une certaine diſtance du point au-deſſus duquel l'Aimant ſera ſuſpendu; l'aiguille tendra vers l'Aimant, & ſon extrémité la plus voiſine de l'Aimant s'élevera au-deſſus de la ſurface de la table; ſi l'on frappe légèrement la table par-deſſous, l'aiguille ſe ſoulèvera en entier, & lorſqu'elle ſera retombée, elle ſe trouvera plus près du point correſpondant au-deſſous de l'Aimant; ſon extrémité s'élevant davantage, formera, avec la table, un angle moins aigu, & à force de petits coups réitérés, elle parviendra préciſément au-deſſous de l'Aimant & ſe tiendra perpendiculaire. Si, au contraire, on place l'Aimant au-deſſous de la table, ce ſera l'extrémité de l'aiguille la plus éloignée de l'Aimant qui s'élèvera; l'aiguille miſe en mouvement par de légères ſecouſſes, ſe trouvera toujours, après être retombée, à une plus grande diſtance du point correſpondant au-deſſus de l'Aimant; ſon extrémité s'élèvera moins au-deſſus de la table, & formera un angle plus aigu. L'aiguille acquiert la vertu magnétique par la proximité de l'Aimant. L'extrémité de l'aiguille oppoſée à cet Aimant, prend un pole contraire au pole de l'Aimant dont elle eſt voiſine; elle doit donc être attirée pendant que l'autre extrémité ſera repouſſée. Ainſi, l'aiguille prendra ſucceſſivement une poſition où l'une de ſes extrémités ſera le plus près, & l'autre le plus loin poſſible de l'Aimant; elle doit donc tendre à ſe diriger parallélement à une ligne droite que l'on pourroit tirer de ſon centre de gravité à l'Aimant: lorſque l'aiguille s'élève pour obéir à la petite ſecouſſe, la tendance que nous venons de reconnoître lui donne, pendant qu'elle eſt en l'air, une nouvelle poſition relativement à l'Aimant, & s'il eſt ſuſpendu au-deſſus de la table, cette nouvelle poſition eſt telle, que l'aiguille en retom-

Nous devons ajouter à ces faits un autre fait, qui démontre également que la réſidence fixe, ainſi que la direction décidée de la force magnétique, ne dépendent dans le fer & l'Aimant que de la ſituation conſtante de leurs parties dans le ſens où elles ont reçu cette force; le fer n'acquiert de lui-même la vertu magnétique, & l'Aimant ne la communique au fer, que dans une ſeule & même direction; car ſi l'on aimante un fil de fer ſelon ſa longueur, & qu'enſuite on le plie de manière qu'il forme des angles & crochets, il perd dès-lors ſa force magnétique, parce que la direction n'eſt pas la même, & que la ſituation des parties a été changée dans les plis qui forment ces crochets; les poles des diverſes parties du fer ſe trouvent alors ſitués les uns relativement aux autres, de manière à diminuer ou détruire mutuellement leur vertu, au lieu de la conſerver ou l'accroître; & non-ſeulement la

---

bant ſe trouve plus près du point correſpondant au-deſſous de l'Aimant; ſi, au contraire, l'Aimant eſt au-deſſous de la table, la nouvelle poſition donnée à l'aiguille, pendant qu'elle eſt encore en l'air, fait néceſſairement qu'après être tombée, elle ſe trouve plus éloignée du point au-deſſous duquel l'Aimant a été placé. Il eſt inutile de dire que ſi l'on remplace la petite aiguille par de la limaille de fer, l'on voit les mêmes effets produits dans toutes les particules qui compoſent la limaille.

Extrait de la ſeconde des diſſertations que M. Epinus a publiées à la ſuite de ſon eſſai ſur la théorie de l'Electricité & du Magnétiſme.

force

force magnétique ſe perd dans ces parties angulaires, mais même elle ne ſubſiſte plus dans les autres parties du fil de fer qui n'ont point été pliées; car le déplacement des poles & le changement de direction occaſionnés par les plis, ſuffiſent pour faire perdre cette force au fil de fer dans toute ſon étendue.

Mais ſi l'on paſſe un fil de fer par la filière, dans le même ſens qu'il a été aimanté, il conſervera ſa vertu magnétique, quoique les parties conſtituantes aient changé de poſition, en s'éloignant les unes des autres, & que toutes aient concouru, plus ou moins, à l'alongement de ce fil de fer par leur déplacement; preuve évidente que la force magnétique ſubſiſte ou s'évanouit, ſelon que la direction ſe conſerve la même, lorſque le déplacement ſe fait dans le même ſens, ou que cette direction devient différente lorſque le déplacement ſe fait dans un ſens oppoſé.

On peut conſidérer un morceau de fer ou d'acier, comme une maſſe de limaille, dont les particules ſont ſeulement plus rapprochées, & réunies de plus près que dans le bloc de limaille comprimée; auſſi faut-il un violent mouvement, tel que celui d'une flexion forcée, ou d'une forte percuſſion, pour détruire la force magnétique dans le fer & l'acier, par le changement de la ſituation reſpective de leurs parties; au lieu qu'en donnant un coup aſſez léger ſur la maſſe de la limaille comprimée, on fait évanouir à l'inſtant

la force magnétique, parce que ce coup ſuffit pour changer la ſituation reſpective de toutes les particules de la limaille.

Si l'on ne paſſe qu'une ſeule fois une lame de fer ou d'acier ſur l'Aimant, elle ne reçoit que très-peu de force magnétique par ce premier frottement; mais, en le réitérant quinze ou vingt fois, toujours dans le même ſens, le fer ou l'acier prendront preſque toute la force magnétique qu'ils peuvent comporter, & on ne leur en donneroit pas davantage en continuant plus long-tems les mêmes frottemens; mais ſi, après avoir aimanté une pièce de fer ou d'acier dans un ſens, on la paſſe ſur l'Aimant dans le ſens oppoſé, elle perd la plus grande partie de la vertu qu'elle avoit acquiſe, & peut même la perdre tout-à-fait, en réitérant les frottemens dans ce ſens contraire; ce ſont ces phénomènes qui ont fait imaginer à quelques Phyſiciens que la force magnétique rend mobiles les particules dont le fer eſt compoſé. Au reſte, ſi l'on ne fait que poſer le fer ou l'acier ſur l'Aimant, ſans les preſſer l'un contre l'autre, ou les appliquer fortement, en les paſſant dans le même ſens, ils ne reçoivent que peu de vertu magnétique, & ce ne ſera qu'en les tenant réunis pluſieurs heures de ſuite, qu'ils en acquerront davantage, & cependant toujours moins qu'en les frottant dans le même ſens, lentement & fortement, un grand nombre de fois ſur l'Aimant.

Le feu, la percuſſion & la flexion, ſuſpendent ou détruiſent également la force magnétique, parce que ces trois cauſes changent également la ſituation reſpective des parties conſtituantes du fer & de l'Aimant. Ce n'eſt même que par ce ſeul changement de la ſituation reſpective de leurs parties, que le feu peut agir ſur la force magnétique, car on s'eſt aſſuré que cette force paſſe de l'Aimant au fer, à travers la flamme, ſans diminution ni changement de direction; ainſi, ce n'eſt pas ſur la force même que ſe porte l'action du feu; mais ſur les parties intégrantes de l'Aimant ou du fer, dont le feu change la poſition, & lorſque, par le refroidiſſement, cette poſition des parties ſe rétablit, telle qu'elle étoit avant l'incandeſcence, la force magnétique reparoît, & devient quelquefois plus puiſſante qu'elle ne l'étoit auparavant.

Un Aimant artificiel & homogène, tel qu'un barreau d'acier fortement aimanté, exerce ſa force attractive dans tous les points de ſa ſurface, mais fort inégalement, car ſi l'on projette de la limaille de fer ſur cet Aimant, il n'y aura preſque aucun point de ſa ſuperficie qui ne retienne quelques particules de cette limaille, ſur-tout ſi elle eſt réduite en poudre très-fine; les poles & les angles de ce barreau, feront les parties qui s'en chargeront le plus, & les faces n'en retiendront qu'une bien moindre quantité; la poſition des particules de limaille, ſera auſſi fort différente; on les verra

perpendiculaires ſur les parties polaires de l'Aimant, & elles ſeront inclinées plus ou moins vers ces mêmes poles, dans toutes les autres parties de ſa ſurface.

Rien n'arrête la vertu magnétique; un Aimant placé dans l'air ou dans le vide, plongé dans l'eau, dans l'huile, dans le mercure, ou dans tout autre fluide, agit toujours également; renfermé dans une boîte de bois, de pierre, de plomb, de cuivre, ou de tout autre métal, à l'exception du fer, ſon action eſt encore la même; l'interpoſition des corps les plus ſolides (*f*) ne lui porte aucune atteinte, & ne fait pas obſtacle à la tranſmiſſion de ſa force; elle n'eſt affoiblie que par le fer interpoſé, qui acquérant par cette poſition la vertu magnétique, peut augmenter, contrebalancer ou détruire celle qui exiſtoit déja, ſuivant que les directions de ces deux forces particulières coincident ou divergent.

Mais, quoique les corps interpoſés ne diminuent pas l'étendue de la ſphère active de l'Aimant ſur le fer, ils ne laiſſent pas de diminuer beaucoup l'intenſité de la force attractive, lorſqu'ils empêchent leur contact. Si l'on interpoſe entre le fer qu'on veut unir à l'Aimant

---

(*f*) Un bloc de plomb d'un pied d'épaiſſeur interpoſé entre l'Aimant & le fer, n'en diminue pas la force attractive. *Muſchembroëck, page* 59.

un corps auſſi mince que l'on voudra, ſeulement une feuille de papier, l'Aimant ne pourra ſoutenir qu'une très-petite maſſe de fer, en comparaiſon de celle qu'il auroit ſoutenue, ſi le fer lui avoit été immédiatement appliqué; cette différence d'effet provient de ce que l'intenſité de la force eſt ſans comparaiſon beaucoup plus grande au point de contact, & qu'en mettant obſtacle à l'union immédiate du fer avec l'Aimant, par un corps intermédiaire, on lui ôte la plus grande partie de ſa force, en ne lui laiſſant que celle qu'il exerceroit au-delà de ſon point de contact. Mais cet effet, qui eſt ſi ſenſible à ce point, devient nul, ou du moins inſenſible à toute autre diſtance, car les corps interpoſés à un pied, un pouce, & même à une ligne de l'Aimant, ne paroiſſent faire aucun obſtacle à l'exercice de ſon attraction.

Le fer, réduit en rouille, ceſſe d'être attirable à l'Aimant; la rouille eſt une diſſolution du fer par l'humidité de l'air, ou, pour mieux dire, par l'action de l'acide aërien, qui, comme nous l'avons dit, a produit tous les autres acides; auſſi agiſſent-ils tous ſur le fer, & à-peu-près de la même manière, car tous le diſſolvent, lui ôtent la propriété d'être attiré par l'Aimant; mais il reprend cette même propriété lorſqu'on fait exhaler ces acides par le moyen du feu. Cette propriété n'eſt donc pas détruite en entier dans la rouille, & dans les autres diſſolutions

du fer *(g)*, puiſqu'elle ſe rétablit dès que le diſſolvant en eſt ſéparé.

L'action du feu produit dans le fer un effet tout contraire à celui de l'impreſſion des acides ou de l'humidité de l'air; le feu le rend d'autant plus attirable à l'Aimant, qu'il a été plus violemment chauffé. Ce ſablon ferrugineux *(h)*, dont nous avons parlé, & qui eſt toujours mêlé avec la platine, eſt plus attirable à l'Aimant que la limaille de fer, parce qu'il a ſubi une plus forte action du feu, & la limaille de fer,

---

(*g*) En faiſant diſſoudre la limaille de fer dans les acides vitrioliques ou nitreux, elle ceſſe d'être attirable à l'Aimant, cependant on ne peut pas dire qu'elle perd entièrement la vertu magnétique; il en eſt de même du vitriol de fer, dont l'attraction eſt à la vérité très-petite, mais non pas nulle, comme le dit l'Emery (*Mémoires de l'Académie des Sciences*, *année* 1706). Il faut, pour s'en appercevoir, le préſenter à une très-longue aiguille aimantée, la diſſolution ſéparant les parties du fer, fait le même effet que le mouvement de ſecouſſe qu'on donne à la limaille, en diſpoſant ſes parties en différens ſens, & c'eſt ce qui détruit la vertu magnétique, *Muſchembroëck*, *page* 125.

(*h*) Muſchembroëck & quelques Phyſiciens, ont douté que ce ſablon fût réellement du fer, parce qu'à l'exception de ſon attraction par l'Aimant, il paroît avoir perdu toutes ſes autres propriétés métalliques; mais ſa denſité démontre qu'il eſt ferrugineux; car, ſelon Muſchembroëck lui-même, la peſanteur ſpécifique de ce ſablon, étoit à celle du ſable, comme 161 à 71, ce qui eſt à-peu-près le rapport du poids ſpécifique de la fonte de fer, au poids du grès ou du marbre blanc.

chauffée juſqu'au blanc, devient auſſi plus attirable qu'elle ne l'étoit auparavant; on peut même dire qu'elle devient tout-à-fait magnétique en certaines circonſtances, puiſque les petites écailles de fer qui ſe ſéparent de la loupe en incandeſcence frappée par le marteau, préſentent les mêmes phénomènes que l'Aimant. Elles s'attirent, ſe repouſſent & ſe dirigent, comme le font les aiguilles aimantées. On obtient le même effet, en faiſant ſublimer le fer par le moyen du feu *(i)*; & les volcans donnent par ſublimation des matières ferrugineuſes qui ont du magnétiſme & des poles, comme les fers ſublimés & chauffés.

On augmente prodigieuſement la force attractive de l'Aimant, en la réuniſſant avec la force directive, au moyen d'une armure de fer ou d'acier; car cette armure fait converger les directions, en ſorte qu'il ne reſte à l'Aimant armé, qu'une portion des forces directives qu'il avoit étant nud, & que ce même Aimant nud, qui, par ſes parties polaires, ne pouvoit ſoutenir qu'un certain poids de fer, en ſoutiendra dix, quinze & vingt fois davantage, s'il eſt bien armé; & plus le poids qu'il ſoutiendra, étant nud, ſera petit, plus l'augmentation du poids qu'il pourra porter, étant armé,

---

(i) Expériences faites par MM. de l'Arbre & Quinquet, & communiquées à M. le Comte de Buffon, en 1786.

ſera grande ; les forces directives de l'Aimant ſe réuniſſent donc avec ſa force attractive, & toutes ſe portant ſur l'armure, y produiſent une intenſité de force bien plus grande, ſans que l'Aimant en ſoit plus épuiſé ; cela ſeul prouveroit que la force magnétique ne réſide pas dans l'Aimant, mais qu'elle eſt déterminée vers le fer & l'Aimant, par une cauſe extérieure, dont l'effet peut augmenter ou diminuer, ſelon que les matières ferrugineuſes lui ſont préſentées d'une manière plus ou moins avantageuſe ; la force attractive n'augmente ici que par ſa réunion avec la force directive, & l'armure ne fait que réunir ces deux forces ſans leur donner plus d'extenſion ; car, quoique l'attraction, dans l'Aimant armé, agiſſe beaucoup plus puiſſamment ſur le fer qu'elle retient plus fortement, elle ne s'étend pas plus loin que celle de l'Aimant nud.

Cette plus forte attraction produite par la réunion des forces attractives & directives de l'Aimant, paroît s'exercer en raiſon des ſurfaces ; par exemple, ſi la ſurface plane du pied de l'armure contre laquelle on applique le fer eſt de 36 lignes quarrées, la force d'attraction ſera quatre fois plus grande, que ſur une ſurface de neuf lignes quarrées ; autre preuve que la cauſe de l'attraction magnétique eſt extérieure, & ne pénètre pas la maſſe de l'Aimant, puiſqu'elle n'agit qu'en raiſon des ſurfaces, au lieu que celle de l'attraction univerſelle, agiſſant toujours en raiſon des maſſes,

maſſes, eſt une force qui réſide dans toute matière. D'ailleurs toute force dont les directions ſont différentes, & qui ne tend pas directement du centre à la circonférence, ne peut pas être regardée comme une force intérieure, proportionnelle à la maſſe, & n'eſt en effet qu'une action extérieure qui ne peut ſe meſurer que par ſa proportion avec la ſurface *(k)*.

Les deux poles d'un Aimant ſe nuiſant réciproquement par leur action contraire, lorſqu'ils ſont trop voiſins l'un de l'autre, la poſition de l'armure & la figure de l'Aimant, doivent également influer ſur ſa force, & c'eſt, par cette raiſon, que des Aimans foibles gagnent quelquefois davantage à être armés, que des Aimans plus forts. Cette action contraire de deux poles trop rapprochés, ſert à expliquer, pourquoi deux barres aimantées, qui ſe touchent, n'attirent pas un morceau de fer avec autant de force, que lorſqu'elles ſont à une certaine diſtance l'une de l'autre *(l)*.

Les pieds de l'armure doivent être placés ſur les poles de la pierre pour réunir le plus de force; ces

---

(*k*) M. Daniel Bernoulli a trouvé, par pluſieurs expériences, que la force attractive des Aimans artificiels de figure cubique, croiſſoit comme la ſurface & non pas comme la maſſe de ces Aimans. *Lettre de M. Daniel Bernoulli à M. Trembley, publiée dans le premier volume du voyage de M. de Sauſſure.*

(*l*) Voyez l'Ouvrage de M. Epinus, N.° 248.

poles ne ſont pas des points mathématiques, ils ont une certaine étendue, & l'on reconnoît aiſément les parties polaires d'un Aimant, en ce qu'elles retiennent le fer avec une grande énergie, & l'attirent avec plus de puiſſance que toutes les autres parties de la ſurface de ce même Aimant, ne peuvent le retenir ou l'attirer. Les meilleurs Aimans ſont ceux dont les poles ſont les plus décidés, c'eſt-à-dire, ceux dans leſquels cette inégalité de force eſt la plus grande. Les plus mauvais Aimans, ſont ceux dont les poles ſont les plus indécis, c'eſt-à-dire, ceux qui ont pluſieurs poles & qui attirent le fer à-peu-près également dans tous les points de leur ſurface; & le défaut de ces Aimans vient de ce qu'ils ſont compoſés de pluſieurs pièces mal ſituées, relativement les unes aux autres, car, en les diviſant en pluſieurs parties, chacun de ces fragmens n'aura que deux poles bien décidés & fort actifs.

Nous avons dit que ſi l'on aimante un fil de fer, en le frottant longitudinalement dans le même ſens, il perdra la vertu magnétique en le pliant en crochet, ou le courbant & le contournant en anneau, & cela parce que la force magnétique ne s'étant déterminée vers ce fil de fer, que par un frottement dans le ſens longitudinal, elle ceſſe de ſe diriger vers ce même fer, dès que ce ſens eſt changé ou interrompu, & lorſqu'il devient directement oppoſé, cette force produit néceſſairement un effet contraire au premier; elle

repouſſe au lieu d'attirer, & ſe dirige vers l'autre pole.

La répulſion dans l'Aimant, n'eſt donc que l'effet d'une attraction en ſens contraire, & qu'on oppoſe à elle-même; toutes deux ne partent pas du corps de l'Aimant, mais proviennent, & ſont des effets d'une force extérieure, qui agit ſur l'Aimant en deux ſens oppoſés; & dans tout Aimant, comme dans le globe terreſtre, la force magnétique forme deux courans, en ſens contraire, qui partent tous deux de l'équateur en ſe dirigeant aux deux poles.

Mais on doit obſerver qu'il y a une inégalité de force entre les deux courans magnétiques du globe, dont l'hémiſphère boréal offrant à ſa ſurface beaucoup plus de terres que d'eau, & étant par conſéquent moins froid que l'hémiſphère auſtral, ne doit pas déterminer ce courant avec autant de puiſſance, en ſorte que ce courant magnétique boréal a moins d'intenſité de force que le courant de l'hémiſphère auſtral, dans lequel la quantité des eaux & des glaces étant beaucoup plus grande que dans le boréal, la condenſation des émanations terreſtres provenant des régions de l'équateur, doit être auſſi plus rapide & plus grande; cette même inégalité ſe reconnoît dans les Aimans. M. de Bruno a fait, à ce ſujet, quelques expériences, dont nous citons la plus déciſive dans la note ci-deſſous *(m)*.

(*m*) « Je poſai un grand barreau magnétique ſur une table de mar-

Deſcartes avoit dit auparavant que le côté de l'Aimant, qui tend vers le nord, peut ſoutenir plus de fer dans nos régions ſeptentrionales, que le côté oppoſé *(n)*; & ce fait a été confirmé par Rohault, & aujourd'hui par les expériences de M. de Bruno. Le pole boréal eſt donc le plus fort dans les Aimans, tandis que c'eſt au contraire le pole le plus foible ſur le globe terreſtre; & c'eſt préciſément ce qui détermine les poles boréaux des Aimans à ſe porter vers le nord, comme vers un pole dont la quantité de force eſt différente de celle qu'ils ont reçue.

Lorſqu'on préſente deux Aimans l'un à l'autre, & que l'on oppoſe les poles de même nom, il eſt néceſſaire qu'ils ſe repouſſent, parce que la force magnétique, qui ſe porte de l'équateur du premier Aimant à ſon pole, agit dans une direction contraire, & diamétralement oppoſée à la force magnétique, qui ſe

---

„bre blanc, je plaçai une aiguille aimantée en équilibre ſur ſon pivot, „au point qui ſéparoit le grand barreau en deux parties égales. Le pole „auſtral s'inclina vers le pole boréal du grand barreau. J'approchai inſenſiblement cette aiguille vers le pole auſtral du grand barreau, juſqu'à „ce qu'enfin je m'apperçus que la petite aiguille étoit dans une ſituation parfaitement horizontale. „ *Recherches ſur la direction du fluide magnétique, page* 116.

(*n*) Principes de la philoſophie de Deſcartes, article XXIX, des propriétés de l'Aimant.

porte en ſens contraire dans le ſecond Aimant. Ces deux forces ſont de même nature, leur quantité eſt égale, & par conſéquent ces deux forces égales & oppoſées doivent produire une répulſion, tandis qu'elles n'offrent qu'une attraction, ſi les deux Aimans ſont préſentés l'un à l'autre par les poles de différens noms, puiſqu'alors les deux forces magnétiques, au lieu d'être égales, diffèrent par leur nature & par leurs quantités. Ceci ſeul ſuffiroit pour démontrer que la force magnétique ne circule pas en tourbillon autour de l'Aimant, mais ſe porte ſeulement de ſon équateur à ſes poles en deux ſens oppoſés.

Cette répulſion, qu'exercent l'un contre l'autre les poles de même nom, ſert à rendre raiſon d'un phénomène, qui d'abord a ſurpris les yeux de quelques Phyſiciens. Si l'on ſoutient deux aiguilles aimantées, l'une au-deſſus de l'autre, & ſi on leur communique le plus léger mouvement, elles ne ſe fixent point dans la direction du méridien magnétique; mais elles s'en éloignent également des deux côtés, l'une à droite, & l'autre à gauche, de la ligne de leur direction naturelle.

Or cet écartement provient de l'action répulſive de leurs poles ſemblables, &, ce qui le prouve, c'eſt qu'à meſure qu'on fait deſcendre l'aiguille ſupérieure, pour l'approcher de l'inférieure, l'angle de leur écartement devient plus grand, tandis qu'au contraire il devient plus petit à meſure qu'on fait remonter cette

même aiguille ſupérieure au-deſſus de l'inférieure, & lorſque les aiguilles ſont aſſez éloignées l'une de l'autre pour n'être plus ſoumiſes à leur influence mutuelle, elles reprennent alors leur vraie direction, & n'obéiſſent plus qu'à la force du magnétiſme général. Cet effet, dont la cauſe eſt aſſez évidente, n'a pas laiſſé d'induire en erreur ceux qui l'ont obſervé les premiers; ils ont imaginé qu'on pourroit, par ce moyen, conſtruire des bouſſoles, dont l'une des aiguilles indiqueroit le pole terreſtre, tandis que l'autre ſe dirigeroit vers le pole magnétique, en ſorte que la première marqueroit le vrai nord, & la ſeconde, la déclinaiſon de l'Aimant; mais le peu de fondement de cette prétention eſt ſuffiſamment démontré par l'angle que forment les deux aiguilles, & qui augmente ou diminue par l'influence mutuelle de leurs poles, en les rapprochant ou les éloignant l'un de l'autre.

On déterminera plus puiſſamment, plus promptement cette force extérieure du magnétiſme général vers le fer, en le tenant dans la direction du méridien magnétique de chaque lieu, & l'on a obſervé qu'en mettant dans cette ſituation des verges de fer, les unes en incandeſcence & les autres froides, les premières reçoivent la vertu magnétique bien plutôt & en bien plus grande meſure (*o*) que les dernières.

(*o*) Nous devons cependant obſerver que le fer prend, à la vérité,

Ce fait ajoute encore aux preuves que j'ai données de la formation des mines d'Aimant par le feu primitif.

Il faut une certaine proportion dans les dimenſions du fer, pour qu'il puiſſe s'aimanter promptement de lui-même, & par la ſeule action du magnétiſme général ; cependant tous les fers étant poſés dans une ſituation perpendiculaire à l'horizon, prendront dans nos climats quelque portion de vertu magnétique. M. le Chevalier de Lamanon ayant examiné les fers employés dans tous les vaiſſeaux qu'il a vus dans le port de Breſt, en 1785, a trouvé que tous ceux qui étoient placés verticalement, avoient acquis la vertu magnétique *(p)*. Il faut ſeulement un aſſez long-tems pour que cet effet ſe manifeſte dans les fers qui ſont gros & courts, moins de tems pour ceux qui ſont épais & longs, & beaucoup moins pour ceux qui ſont longs & menus *(q)*. Ces derniers s'aimantent en quelques

---

plus de force magnétique dans l'état d'incandeſcence, mais qu'il ne la conſerve pas en même quantité après ſon refroidiſſement ; un fer tant qu'il eſt rouge attire l'aiguille aimantée plus fortement, & la fait mouvoir de plus loin, que quand il eſt refroidi.

(*p*) Lettre de M. le Chevalier de Lamanon à M. le Comte de Buffon, datée de Madère 1785.

(*q*) Prenez, dit Muſchembroëck, une verge de ſix pieds de longueur & d'un cinquième de pouce de diamètre ; tenez-la perpendiculairement

minutes, & il faut des mois & des années pour les autres. De quelque manière même que le fer ait reçu la vertu magnétique, il paroît que juſqu'à un certain point, & toutes choſes égales, la force qu'il acquiert, eſt en raiſon de ſa longueur *(r)* ; les barreaux de fer qui ſont aux fenêtres des anciens édifices, ont ſouvent acquis, avec le tems, une aſſez grande force magnétique, pour pouvoir, comme de véritables Aimans, attirer & repouſſer d'une manière ſenſible l'aiguille aimantée à pluſieurs pieds de diſtance.

Mais cette communication du magnétiſme au fer, s'opère très-inégalement ſuivant les différens climats; on s'eſt aſſuré, par l'obſervation, que, dans toutes les contrées des zones tempérées & froides, le fer tenu verticalement acquiert plus promptement & en plus grande meſure la vertu magnétique, que dans les régions qui ſont ſous la zone torride, dans leſquelles même il ne prend ſouvent que peu ou point de vertu magnétique dans cette poſition verticale.

à l'horizon, elle s'aimantera en une minute de tems, & attirera par ſon extrémité inférieure le pole auſtral de l'aiguille aimantée, & repouſſera par cette même extrémité le pole boréal. Si vous renverſez la verge, vous verrez dans moins d'une minute que l'extrémité ſupérieure, devenue l'inférieure, attirera le pole auſtral qu'elle repouſſoit auparavant. *Diſſert. de magnete, page* 260.

(*r*) Epinus, N.° 152.

Nous

Nous avons dit que les Aimans ont proportionnellement d'autant plus de force qu'ils ſont en petit volume. Une pierre d'Aimant dont le volume excède vingt-ſept ou trente pouces cubiques, peut à peine porter un poids égal à celui de ſa maſſe, tandis que, dans les petites pierres d'Aimant d'un ou deux pouces cubiques, il s'en trouve qui portent vingt, trente & même cinquante fois leurs poids. Mais, pour faire des comparaiſons exactes, il faut que le fer ſoit de la même qualité, & que les dimenſions & la figure de chaque morceau ſoient ſemblables & égales; car un Aimant, qui ſoutiendroit un cube de fer du poids d'une livre, ne pourra ſoutenir un fil de fer, long d'un pied, qui ne peſeroit pas un gros, & ſi les maſſes à ſoutenir ne ſont pas entièrement de fer, quoique de même forme, ſi, par exemple, on applique à l'Aimant deux maſſes d'égal poids & de figure ſemblable, dont l'une ſeroit entièrement de fer, & dont l'autre ne ſeroit de fer que dans la partie ſupérieure, & de cuivre ou d'autre matière dans la partie inférieure, cette maſſe compoſée de deux matières, ne ſera pas attirée ni ſoutenue avec la même force que la maſſe de fer continu, & elle tiendra d'autant moins à l'Aimant que la portion de fer ſera plus petite & que celle de l'autre matière ſera plus grande.

Lorſqu'on diviſe un gros Aimant en pluſieurs parties, chaque fragment, quelque petit qu'il ſoit, aura

toujours des poles (*f*). La vertu magnétique augmentera au lieu de diminuer par cette diviſion; ces fragmens, pris ſéparément, porteront beaucoup plus de poids que quand ils étoient réunis en un ſeul bloc. Cependant les gros Aimans, même les plus foibles, répandent en proportion leur force à de plus grandes diſtances que les petits Aimans les plus forts, & ſi l'on joint enſemble pluſieurs petits Aimans pour n'en faire qu'une maſſe, la vertu de cette maſſe s'étendra beaucoup plus loin que celle d'aucun des morceaux, dont

---

(*f*) Lorſqu'on coupe un Aimant par le milieu de ſon axe, chacune de ſes parties a conſtamment deux poles, & devient un Aimant complet. Les parties, qui étoient contiguës ſous l'équateur avant la ſection, & qui n'étoient rien moins que des poles, le ſont devenues, & même des poles de différens noms, en ſorte que chacune de ces parties pourroit devenir également pole boréal & pole auſtral, ſuivant que la ſection ſe ſeroit faite plus près du pole auſtral ou du pole boréal du grand Aimant; & la même choſe arriveroit à chacune de ces moitiés, ſi on les coupoit par le milieu, de la même manière. *Extrait de l'article Aimant dans l'Encyclopédie, par M. le Monnier, qui a traité cette matière avec autant de méthode que de juſteſſe & de diſcernement.*

M. Epinus a éprouvé que ſi on rompt en deux une barre de l'acier le plus dur, qu'on approche les deux morceaux l'un au bout de l'autre, qu'on les preſſe de manière qu'ils n'en forment qu'un ſeul, & qu'on aimante cette barre compoſée, on n'y trouvera que deux poles; mais, ſi enſuite on ſépare les deux morceaux, ils offriront chacun deux poles oppoſés; le pole boréal & le pole auſtral demeurant, chacun, au bout qu'ils occupoient, N.ºs 103 & 104.

ce bloc eſt compoſé. Dans tous les cas, cette force agit de plus loin ſur un autre Aimant, ou ſur le fer aimanté, que ſur le fer qui ne l'eſt pas (*t*).

On peut reconnoître aſſez préciſément les effets de l'attraction de l'Aimant ſur le fer, & ſur le fer aimanté, par le moyen des bouſſoles dont l'aiguille nous offre auſſi, par ſon mouvement, les autres phénomènes du magnétiſme général. La direction de l'aiguille vers les parties polaires du globe terreſtre, ſa déclinaiſon & ſon inclinaiſon dans les différens lieux du globe, ſont les effets de ce magnétiſme dont nous avons tiré le grand moyen de parcourir les mers & les terres inconnues, ſans autre guide que cette aiguille qui ſeule peut nous conduire, lorſque l'aſpect du ciel nous manque, & que tous les aſtres ſont voilés par les nuages, les brouillards & les brumes (*u*).

(*t*) Les diſtances auxquelles l'Aimant agit ſur le fer aimanté & ſur celui qui ne l'eſt pas, ſont dans le rapport de cinq à deux. *Muſchembroëck, page* 117.

(*u*) Il faut que les aiguilles des bouſſoles ſoient faites de bon acier homogène, ſans ſoufflures ni fêlures; leur ſurface doit être polie, ſans inégalités ni cavités, ſur-tout ſans points ſaillans qui ne manqueroient pas de troubler l'effet général du magnétiſme par des effets particuliers & contraires; leur forme doit être auſſi ſimple que leur matière eſt pure; il faut ſeulement que ces aiguilles diminuent, & ſe terminent en pointe aux deux extrémités. On a reconnu, après pluſieurs eſſais, qu'une

Ces aiguilles une fois bien aimantées, ſont de véritables Aimans; elles nous en préſentent tous les phénomènes, & même les démontrent d'une manière plus préciſe qu'on ne pourroit les reconnoître dans les Aimans mêmes; car l'Aimant & le fer bien aimanté, produiſent les mêmes effets, & lorſqu'une petite barre d'acier a été aimantée au point de prendre toute la vertu magnétique, dont elle eſt ſuſceptible, c'eſt dès-lors un Aimant qui, comme le véritable Aimant, peut

---

aiguille de cinq pouces & demi ou ſix pouces de longueur, étoit plus préciſe dans ſes indications de la déclinaiſon, que les aiguilles plus courtes ou plus longues; le poids de cette aiguille de ſix pouces ſera de cent cinquante ou cent ſoixante grains. Si elle étoit plus légère, elle ſeroit moins aſſurée ſur ſon pivot; & ſi elle étoit plus peſante, la réſiſtance, par le frottement ſur ce même pivot, la rendroit moins agile. Les aiguilles pour les bouſſoles d'inclinaiſon, doivent être un peu plus longues. On aura ſoin de tremper les unes & les autres, pour en rendre l'acier plus élaſtique, & on leur donnera la couleur bleue, pour les préſerver plus long-tems de la rouille. Ce pivot ne ſera ni de fer ni d'acier, mais de cuivre, ou de toute autre matière dure & ſuſceptible de poli; l'extrémité de ce pivot doit être arrondie & convexe, pour entrer & s'ajuſter exactement dans la cavité de la chappe, qui ſera de la même matière dure & polie; & ſi l'on enduit cette cavité d'un peu d'huile, ou mieux encore d'une petite quantité de poudre très-fine, de talc ou de molybdène, le mouvement de l'aiguille aura toute la liberté que l'on peut lui donner ou plutôt obtenir. Pour faire des aiguilles de bouſſoles, dit Muſchembroëck, l'acier doit être préféré au fer, parce qu'il prend beaucoup plus de force magnétique. On a obſervé

communiquer ſa force, ſans en rien perdre, à tous les fers & à tous les aciers qu'on lui préſentera.

Mais ni l'Aimant naturel, ni ces Aimans artificiels, ne communiquent pas d'abord autant de force qu'ils en ont; une lame de fer ou d'acier paſſée ſur l'Aimant, en reçoit une certaine meſure de vertu magnétique, qu'on eſtime par le poids que cette lame peut ſoutenir; ſi l'on paſſe une ſeconde lame ſur la première, cette ſeconde lame ne recevra de même qu'une partie de la force de la première, & ne pourra ſoutenir qu'un moindre poids; une troiſième lame paſſée ſur la ſeconde, ne prendra de même qu'une portion de la force de cette ſeconde lame, & enfin dans une quatrième lame paſſée ſur la troiſième, la vertu communiquée ſera preſque inſenſible ou même nulle.

---

qu'il en recevoit juſqu'à ſept fois plus; il la reçoit à la vérité plus lentement, mais il la conſerve beaucoup plus long-tems que le fer. *Diſſertatio de magnete*, *page* 230.

Les aiguilles aimantées de différentes longueurs, ne s'arrêtent pas préciſément dans la même direction, quoiqu'on leur préſente un ſeul & même Aimant; mais c'eſt leur différente forme qui donne lieu à cette différence; celles qui m'ont le mieux réuſſi, c'eſt-à-dire, celles dont la direction a toujours été la même, avoient les deux bouts droits & ſemblables. *Mémoire ſur les aiguilles aimantées*, *par M. du Fay*, *dans ceux de l'Académie des Sciences*, *année 1733*.... Suivant M. Mitchel, la meilleure proportion des dimenſions pour faire des aiguilles de bouſſole, ou des lames d'acier artificielles, eſt ſix pouces de longueur, ſix lignes de largeur, & un tiers de ligne d'épaiſſeur.

Chacune de ces lames conſerve néanmoins toute la vertu qu'elle a reçue, ſans perte ni diminution, quoiqu'elles paroiſſent en faire largeſſe en la communiquant; car l'Aimant ou le fer aimanté ne font aucune dépenſe réelle de cette force; elle ne leur appartient donc pas en propre & ne fait pas partie de leur ſubſtance; ils ne font que la déterminer plus ou moins vers le fer qui ne l'a pas encore reçue.

Ainſi, je le répète, cette force ne réſide pas en quantité réelle & matérielle dans l'Aimant, puiſqu'elle paſſe ſans diminution de l'Aimant au fer & du fer au fer, qu'elle ſe multiplie au lieu de s'évanouir, & qu'elle augmente au lieu de diminuer par cette communication; car chaque lame de fer en acquiert ſans que les autres en perdent, & la force reſte évidemment la même dans chacune, après mille & mille communications. Cette force eſt donc extérieure, & de plus, elle eſt, pour ainſi dire, infinie relativement aux petites maſſes de l'Aimant & du fer, qui ne font que la déterminer vers leur propre ſubſtance; elle exiſte à part, & n'en exiſteroit pas moins, quand il n'y auroit point de fer ni d'Aimant dans le monde; mais il eſt vrai qu'elle ne produiroit pas les mêmes effets, qui tous dépendent du rapport particulier que la matière ferrugineuſe ſe trouve avoir avec l'action de cette force.

ARTICLE IV.

Divers procédés pour produire & compléter l'aimantation du fer.

PLUSIEURS CIRCONSTANCES concourent à rendre plus ou moins complète la communication de la force magnétique de l'Aimant au fer ; premièrement, tous les Aimans ne donnent pas au même fer une égale force attractive ; les plus forts lui communiquent ordinairement plus de vertu que les Aimans plus foibles ; secondement, la qualité du fer influe beaucoup sur la quantité de vertu magnétique qu'il peut recevoir du même Aimant ; plus le fer est pur, & plus il peut s'aimanter fortement ; l'acier, qui est le fer le plus épuré, reçoit plus de force magnétique, & la conserve plus long-tems que le fer ordinaire ; troisièmement, il faut une certaine proportion dans les dimensions du fer ou de l'acier que l'on veut aimanter, pour qu'ils reçoivent la plus grande force magnétique qu'ils peuvent comporter ; la longueur, la largeur & l'épaisseur de ces fers ou aciers, ont leurs proportions & leurs limites ; ces dimensions respectives ne doivent être ni trop

grandes ni trop petites, & ce n'eſt qu'après une infinité de tâtonnemens, qu'on a pu déterminer à-peu-près leurs proportions relatives, dans les maſſes de fer ou d'acier que l'on veut aimanter au plus haut degré (*a*).

Lorſqu'on préſente à un Aimant puiſſant du fer doux & du fer dur, les deux fers acquièrent la vertu magnétique, & en reçoivent autant qu'ils peuvent en comporter; & le fer dur, qui en comporte le plus, peut en recevoir davantage; mais ſi l'Aimant n'eſt pas aſſez puiſſant pour communiquer aux deux fers toute la force qu'ils peuvent recevoir, on trouvera que le fer tendre, qui reçoit avec plus de facilité la vertu magnétique, aura, dans le même tems, acquis plus de force que le fer dur. Il peut auſſi arriver que l'action de l'Aimant ſur les fers ſoit telle, que le fer tendre ſera pleinement imprégné, tandis que le fer dur n'aura pas été expoſé à cette action pendant aſſez de tems, pour recevoir toute la force magnétique qu'il peut com-

---

(*a*) « Il faut une certaine proportion déterminée entre la longueur, la largeur & l'épaiſſeur d'un morceau de fer ou d'acier, pour qu'il prenne la plus grande force magnétique poſſible; car lorſque ces dimenſions ſont trop petites ou trop grandes, il prend moins de force dans les deux cas; mais la plus grande différence ſe trouve entre deux morceaux, dont l'un auroit dix pouces de longueur, & l'autre quatre pouces, car celui-ci n'a porté, dans l'expérience, qu'un grain & demi, tandis que l'autre en portoit trente-trois. » *Muſchembroëck, expérience* 32.

porter,

porter, de ſorte que tous deux peuvent préſenter, dans ces deux cas, des forces magnétiques égales, ce qui explique les contradictions des artiſtes ſur la qualité du fer qu'on doit préférer pour faire des Aimans artificiels (*b*).

Une verge de fer, longue & menue, rougie au feu, & enſuite plongée perpendiculairement dans l'eau, acquiert, en un moment, la vertu magnétique. L'on pourroit donc aimanter promptement des aiguilles de bouſſole ſans aimant. Il ſuffiroit, après les avoir fabriquées, de les faire rougir au feu, & de les tremper enſuite dans l'eau froide *(c)*. Mais, ce qui paroît ſingulier, quoique naturel, c'eſt-à-dire dépendant des mêmes cauſes, c'eſt que le fer en incandeſcence, comme l'on voit, s'aimante très-promptement, en le plongeant verticalement dans l'eau pour le refroidir, au lieu que le fer aimanté perd ſa vertu magnétique par le feu, & ne la reprend pas étant de même plongé dans l'eau. Et c'eſt parce qu'il conſerve un peu de cette vertu que le feu ne lui enlève pas toute entière; car cette

---

(*b*) Voyez l'ouvrage de M. Epinus, page 367.

(*c*) Nous devons cependant obſerver que ces aiguilles ne ſont pas auſſi actives, ni auſſi préciſes que celles qu'on a aimantées, en les paſſant vingt ou trente fois dans le même ſens, ſur le pole d'un Aimant bien armé.

portion qu'il conſerve de ſon ancien magnétiſme l'empêche d'en recevoir un nouveau.

On peut faire avec l'acier des Aimans artificiels, auſſi puiſſans, auſſi durables que les meilleurs Aimans naturels; on a même obſervé qu'un Aimant bien armé, donne à l'acier plus de vertu magnétique qu'il n'en a lui-même. Ces Aimans artificiels demandent ſeulement quelques attentions dans la fabrication, & de juſtes proportions dans leurs dimenſions *(d)*. Pluſieurs Phy-

---

(*d*) Pour rendre le fer un véritable aimant, il faut, 1.° le frotter ſur un des poles d'un Aimant bien armé; 2.° plus on paſſe lentement le fer, & plus on le preſſe contre cette armure, ou pole de l'Aimant, & plus il reçoit de force magnétique. 3.° Il ne faut aimanter le fer, qu'en le frottant ſur l'armure d'un ſeul pole, & non pas ſucceſſivement ſur les deux poles. 4.° Il faut frotter le fer ſur toute ſa longueur; & on remarque que l'extrémité qui touche le pole la dernière, conſerve le plus de force. 5.° Un morceau d'acier poli reçoit plus de vertu magnétique qu'un morceau de fer ſimple & de même figure; &, toutes choſes d'ailleurs égales, on aimante plus fortement un morceau de fer long, mince & pointu, qu'un autre d'une forme toute différente. 6.° c'eſt par la raiſon de la plus grande longueur, qu'une lame d'épée, par exemple, reçoit plus de vertu magnétique qu'une lame de couteau; cependant il y a de certaines proportions d'épaiſſeur & de longueur, hors deſquelles le fer reçoit moins de vertu magnétique; il eſt certain qu'on peut donner à des barreaux d'acier, d'une figure convenable, & trempés fort durs, une quantité de vertu magnétique très-conſidérable. L'acier trempé a cet avantage ſur le fer & ſur l'acier doux, qu'il retient beaucoup plus de vertu magnétique, quoiqu'il ait plus de peine à s'en charger. *Extrait*

ficiens, & quelques Artiſtes habiles, ont, dans ces derniers tems, ſi bien réuſſi, tant en France *(e)* qu'en Angleterre, qu'on pourroit, au moyen d'un de ces Aimans artificiels, ſe paſſer à l'avenir des Aimans de nature.

Il y a plus; on peut, ſans Aimant ni fer aimanté, & par un procédé auſſi remarquable qu'il eſt ſimple, exciter dans le fer la vertu magnétique à un très-haut degré; ce procédé conſiſte à poſer ſur la ſurface polie

---

de l'article Aimant, dans l'Encyclopédie, par M. le Monnier . . . . . M. du Fay dit que la figure des morceaux de fer que l'on veut aimanter, contribue beaucoup à la formation des poles, ou plutôt à leur établiſſement. Par exemple, on ne parviendra que difficilement à établir des poles ſur un morceau de fer, dont la forme eſt ſphérique; car il eut beau frotter une petite boule de fer ſur un bon Aimant, il ne put jamais parvenir à lui donner des poles bien déterminés. *Mémoires de l'Académie des Sciences, 1733.* Ce que dit ici M. du Fay, eſt vrai en général; cependant cela dépend encore de la force des Aimans qu'on emploie pour communiquer la vertu magnétique à ces boules; car M. Knigth a très-bien aimanté de petites boules de fer, en employant des Aimans artificiels très-vigoureux.

(*e*) M. le Noble, Chanoine de Saint-Louis du-Louvre, s'eſt ſur-tout diſtingué dans cet art; il a compoſé des Aimans artificiels de pluſieurs lames d'acier réunies; il a trouvé le moyen de les aimanter plus fortement, & de leur donner les figures & les dimenſions convenables, pour produire les plus grands effets; &, comparaiſon faite des Aimans de M. le Noble, avec ceux d'Angleterre, ils m'ont paru au moins égaux & même ſupérieurs.

d'une forte pièce de fer, telle qu'une enclume, des barreaux d'acier, & à les frotter enſuite un grand nombre de fois, en les retournant ſur leurs différentes faces, toujours dans le même ſens, au moyen d'une groſſe barre de fer tenue verticalement, & dont l'extrémité inférieure, pour le plus grand effet, doit être aciérée & polie. Les barreaux d'acier ſe trouvent après ces frottemens fortement aimantés, ſans que l'enclume ni la barre, qui ſemblent leur communiquer la vertu magnétique, la poſſèdent ou la prennent ſenſiblement elles-mêmes; & rien ne ſemble plus propre à démontrer l'affinité réelle & le rapport intime du fer avec la force magnétique, lors même qu'elle ne s'y manifeſte pas ſenſiblement, & qu'elle n'y eſt pas formellement établie, puiſque ne la poſſédant pas, il la communique en déterminant ſon cours, & ne lui ſervant que de conducteur.

MM. Mitchel & Canton, au lieu de ſe ſervir d'une ſeule barre de fer, pour produire des Aimans artificiels, ont employé, avec ſuccès, deux barres déja magnétiques; leur méthode a été appellée méthode du double contact, à cauſe du double moyen qu'ils ont préféré. Elle a été perfectionnée par M. Epinus, qui a cherché & trouvé la manière la plus avantageuſe de placer les forces dans les Aimans artificiels, afin que celles qui attirent & celles qui repouſſent, ſe ſervent le plus & ſe nuiſent le moins poſſible. Voici ſon pro-

cédé, qui eſt l'un des meilleurs auxquels on puiſſe avoir recours pour cet effet, & nous penſons qu'on doit le préférer pour aimanter les aiguilles des bouſſoles. M. Epinus ſuppoſe que l'on veuille augmenter juſqu'au degré de ſaturation la vertu de quatre barres déja douées de quelque magnétiſme. Il en met deux horizontalement, parallélement, & à une certaine diſtance l'une de l'autre, entre deux parallélipipèdes de fer; il place ſur une de ces barres horizontales les deux autres barres qui lui reſtent; il les incline, l'une à droite, l'autre à gauche, de manière qu'elles forment un angle de quinze à vingt degrés avec la barre horizontale, & que leurs extrémités inférieures ne ſoient ſéparées que par un eſpace de quelques lignes; il les conduit enſuite d'un bout de la barre à l'autre, alternativement dans les deux ſens, & en les tenant toujours à la même diſtance l'une de l'autre; après que la première barre horizontale a été ainſi frottée ſur ſes deux ſurfaces, il répète l'opération ſur la ſeconde barre; il remplace alors la première paire de barres par la ſeconde, qu'il place de même entre les deux parallélipipèdes, & qu'il frotte de la même manière que nous venons de le dire avec la première paire; il recommence enſuite l'opération ſur cette première paire, & il continue de frotter alternativement une paire ſur l'autre, juſqu'à ce que les barres ne puiſſent plus acquérir du magnétiſme. M. Epinus emploie le même

procédé avec trois barres, ou avec un plus grand nombre; mais, ſelon lui, la manière la plus courte & la plus sûre, eſt d'aimanter quatre barres; on peut coucher entièrement les Aimans ſur la barre que l'on frotte, au lieu de leur faire former un angle de quinze ou vingt degrés, ſi la barre eſt aſſez courte pour que ſes extrémités ne ſe trouvent par trop voiſines des poles extérieurs des Aimans, qui jouiſſent de forces oppoſées à celles de ces extrémités.

Lorſque la barre à aimanter eſt très-longue, il peut ſe faire que l'ingénieux procédé de M. Epinus, ainſi que celui de M. Canton, produiſe une ſuite de poles alternativement contraires, ſur-tout ſi le fer eſt mou & par conſéquent ſuſceptible de recevoir plus promptement le magnétiſme.

M. Epinus s'eſt ſervi du procédé du double contact de deux manières; 1.° avec quatre barres d'un fer médiocrement dur, longues de deux pieds, larges d'un pouce & demi, épaiſſes d'un demi-pouce, & douze lames d'acier de ſix pouces de long, de quatre lignes de large & d'une demi-ligne d'épais. Les quatre premières étoient d'un acier mou, quatre autres avoient la dureté de l'acier ordinaire, avec lequel on fait les reſſorts, & les quatre autres barres étoient d'un acier dur juſqu'au plus haut degré de fragilité. Il a tenu verticalement une des grandes barres & l'a frappée fortement, environ deux cens fois, à l'aide d'un gros marteau; elle

a acquis, par cette percuſſion, une vertu magnétique aſſez forte, pour ſoutenir un petit clou de fer; l'extrémité inférieure a reçu la vertu du pole boréal, & l'extrémité ſupérieure la vertu du pole auſtral; il a aimanté de même les autres trois grandes barres. Il a enſuite placé l'une des petites lames d'acier mou, ſur une table entre deux des grandes barres, comme dans le procédé du double contact, & l'a frottée ſuivant le même procédé avec les deux autres grandes barres; il l'a ainſi magnétiſée; il l'a ſucceſſivement remplacée par les trois autres lames d'acier mou, & a porté la force magnétique de ces quatre lames au degré de ſaturation; il a placé, après cela, deux des lames qui avoient la dureté des reſſorts, entre deux parallélipipèdes de fer mou, les a frottées avec deux faiſceaux formés des quatre grandes barres, a fait la même opération ſur les deux autres, a remplacé les quatre grandes barres par les quatre petites lames d'acier mou, & a porté ainſi juſqu'à la ſaturation la force magnétique des quatre lames ayant la dureté des reſſorts: il a terminé ſon procédé par répéter la même opération, & pour aimanter juſqu'à ſaturation les lames qui préſentoient le plus de dureté, il les a ſubſtituées à celles qui n'avoient que la dureté du reſſort, & il a mis celles-ci à la place des grandes barres.

La ſeconde manière que M. Epinus a employée, ne diffère de la première, qu'en ce qu'il a fait faire

les quatre grandes barres d'un fer très-mou, & qu'il a mis la petite lame molle à aimanter, ainſi que les deux grandes barres placées à ſon extrémité, dans la direction de l'inclinaiſon de l'aiguille aimantée. Il a enſuite frotté la petite lame d'acier avec les deux autres grandes barres, en les tenant parallélement à la petite lame, ou en ne leur faiſant former qu'un angle très-aigu *(f)*.

Si l'on approche d'un Aimant une longue barre de fer, la portion la plus voiſine de l'Aimant acquiert à cette extrémité, comme nous l'avons dit, un pole oppoſé à celui qu'elle touche ; une ſeconde portion de cette même barre offre un pole contraire à celui de la portion contigue à l'Aimant; une troiſième préſente le même pole que la première, une quatrième, que la ſeconde & ainſi de ſuite; les poles alternativement oppoſés de ces parties de la barre, ſont d'autant plus foibles, qu'ils s'éloignent davantage de l'Aimant, & leur nombre, toutes choſes égales, eſt proportionné à la longueur de la barre *(g)*.

Si on applique le pole d'un Aimant ſur le milieu d'une lame, elle acquiert, dans ce point, un pole contraire, & dans les deux extrémités, deux poles ſem-

---

(*f*) Epinus, n.os 255, 383 & ſuivans.

(*g*) Epinus, n.° 203.

blables

blables à celui qui la touche; ſi le fer eſt épais, la ſurface oppoſée à l'Aimant acquiert auſſi un pole ſemblable à celui qui eſt appliqué contre le fer, & ſi la barre eſt un peu longue, les deux extrémités préſentent la ſuite des poles alternativement contraires, dont nous venons de parler (*h*).

La facilité avec laquelle le fer reçoit la vertu magnétique par le contact ou le voiſinage d'un Aimant, l'attraction mutuelle des poles oppoſés, & la répulſion des poles ſemblables, ſont confirmées par les phénomènes ſuivans.

Lorſque l'on donne à un morceau de fer la forme d'une fourche, & qu'on applique une des branches à un Aimant, le fer devient magnétique, & ſon extrémité inférieure peut ſoutenir une petite maſſe de fer; mais ſi on approche de la ſeconde branche de la fourche un Aimant dont le pole ſoit oppoſé à celui du premier Aimant, le morceau de fer ſoumis à deux forces qui tendent à ſe détruire, recevant deux vertus contraires, ou, pour mieux dire, n'en recevant plus aucune, perd ſon magnétiſme, & laiſſe échapper le poids qu'il ſoutenoit.

Si l'on ſuſpend un petit fil de fer mou, long de quelques pouces, & qu'on approche un Aimant de ſon

---

(*h*) Epinus, n.os 211 & 212.

extrémité inférieure, en préſentant auſſi à cette extrémité un morceau de fer, ce morceau acquerra une vertu oppoſée à celle du pole voiſin de l'Aimant, il repouſſera l'extrémité inférieure du fil de fer qui aura obtenu une force ſemblable à celle qu'il poſſèdera, & attirera l'extrémité ſupérieure qui jouira d'une vertu contraire.

Lorſqu'on ſuſpend un poids à une lame d'acier mince, aimantée & horizontale, & que l'on place au-deſſus de cette lame une ſeconde lame aimantée, de même force, d'égale grandeur, couchée ſur la première, la recouvrant en entier, & préſentant un pole oppoſé au pole qui ſoutient le poids, ce poids n'eſt plus retenu. Si la lame ſupérieure jouit d'une plus grande force que l'inférieure, le poids tombera avant qu'elle ne touche la ſeconde lame ; mais, en continuant de l'approcher, elle agira par ſon excès de force ſur les nouveaux poids qu'on lui préſentera, & les ſoutiendra, malgré l'action contraire de la lame inférieure.

Lorſque l'on ſuſpend un poids à un Aimant, & que l'on approche un ſecond Aimant au-deſſus de ce poids, la force du premier Aimant eſt augmentée dans le cas où les poles contraires ſont oppoſés, & ſe trouve diminuée quand les poles ſemblables ſont les plus voiſins; les mêmes effets arriveront, & le poids ſera également ſoumis à deux forces, agiſſant dans la

même direction, ſi l'on remplace le ſecond Aimant par un morceau de fer auquel la proximité du premier Aimant communiquera une vertu magnétique oppoſée à celle du pole le plus voiſin *(i)*. Ceci avoit été obſervé précédemment par M. de Réaumur, qui a reconnu qu'un Aimant enlevoit une maſſe de fer placée ſur une enclume de fer, avec plus de facilité que lorſqu'elle étoit placée ſur une autre matière.

Les faits que nous venons de rapporter, nous démontrent *(k)* pourquoi un Aimant acquiert une nouvelle vertu, en ſoutenant du fer qu'il aimante par ſon voiſinage, & pourquoi, ſi on lui enlève des poids qu'on étoit parvenu à lui faire porter, en le chargeant graduellement, il refuſe de les ſoutenir lorſqu'on les lui rend tous à-la-fois.

L'expérience nous apprend, dit M. Epinus, que le fer expoſé à un froid très-âpre, devient beaucoup plus dur & plus caſſant; ainſi, lorſqu'on aimante une barre de fer, le degré de la force qu'elle acquiert, dépend, ſelon lui, en grande partie du degré de froid auquel elle eſt expoſée, en ſorte que la même barre aimantée de la même manière, n'acquiert pas dans l'été la même vertu que dans l'hiver, ſur-tout pendant un froid

---

(*i*) Epinus, n.os 156 & ſuivans.

(*k*) *Idem*, n.° 208.

très-rigoureux; néanmoins ce ſavant Phyſicien convient qu'il faudroit confirmer ce fait par des expériences exactes & réitérées *(l)*. Au reſte, on peut aſſurer qu'en général la grande chaleur & le grand froid diminuent la vertu magnétique des Aimans & des fers aimantés, en modifiant leur état, & en les rendant par-là plus ou moins ſuſceptibles de l'action de l'électricité générale *(m)*.

On peut voir, dans l'eſſai ſur le fluide électrique de feû M. le Comte de Treſſan, une expérience du Docteur Knight que j'ai cru devoir rapporter ici, parce qu'elle eſt relative à l'aimantation de l'Aimant, & d'ailleurs parce qu'elle peut ſervir à rendre raiſon de pluſieurs autres expériences ſurprenantes en appa-

---

(l) M. Epinus dit s'être aſſuré que le fer dur conſerve ſa vertu magnétique beaucoup plus que le fer tendre; il dit auſſi que ce fer dur l'acquiert au plus haut degré en reſtant très-long-tems dans la ſituation favorable au magnétiſme, & que, quand les fers durs ſe trouvent dans cette poſition convenable pendant pluſieurs années, ils prennent une ſi grande force magnétique, que ces Aimants, produits par le tems, ſont quelquefois plus vigoureux que les Aimans tirés immédiatement de leurs mines... Voyez l'ouvrage de M. Epinus, qui a pour titre, *tentamen theoriæ electricitatis & magnetiſmi. Petropoli, 1759, in-4.°, n.os 345 & 367.*

(m) M. De Rozières, que nous avons déjà cité, l'a prouvé par pluſieurs expériences... Lettre de M. de Rozières, Capitaine au Corps-royal du Génie, à M. le Comte de Buffon, du 14 décembre 1786.

rence, & dont la cauſe a été pendant long-tems cachée aux Phyſiciens (*n*). Au reſte, elle s'explique très-aiſé-

---

(*n*) « L'expérience, dit M. de Treſſan, la plus ſingulière à faire ſur les Aimans artificiels du docteur Knigth, eſt celle dont il m'envoya « les détails de Londres en 1748, avec l'appareil néceſſaire pour la ré- « péter. Non-ſeulement M. Knigth avoit déjà trouvé alors le ſecret de « donner un magnétiſme puiſſant à des barres de quinze pouces de « longueur, faites d'un acier parfaitement dur, telles que celles qui ſont « aujourd'hui connues; mais il avoit inventé une compoſition dont il « s'eſt réſervé le ſecret, avec laquelle il forme de petites pierres, d'une « matière noire (en apparence pierreuſe & métallique). Celles qu'il « m'a envoyées ont un pouce de long, huit lignes de large, & deux « bonnes lignes d'épaiſſeur; il y a joint pluſieurs petites balles de la « même compoſition; les petites balles que j'ai, ont l'une cinq, l'autre « quatre, & les autres trois lignes de diamètre. Il nomme ces petites « ſphères *Terrella*. «

Je fus moins ſurpris de trouver un fort magnétiſme dans les petits « quarrés longs, que je ne le fus de le trouver égal dans les petites « terrella, dont les poles ſont bien décidés & bien fixes, ces petites « ſphères s'attirant & ſe repouſſant vivement, ſelon les poles qu'elles ſe « préſentent. «

Je préparai donc, (ſelon l'inſtruction que j'avois reçue de M. Knigth) « une glace bien polie & poſée bien horizontalement, je diſpoſai en rond « cinq de ces terrella, & je plaçai au milieu un de ces Aimans factices « de la même matière, lequel je pouvois tourner facilement ſur ſon « centre; je vis ſur-le-champ toutes les terrella s'agiter & ſe retourner « pour préſenter à l'aimant factice la polarité correſpondante à la ſienne; « les plus légères furent pluſieurs fois attirées juſqu'au contact, & ce ne « fut qu'avec peine que je parvins à les placer à la diſtance proportion- «

ment par la répulſion des poles ſemblables & l'attraction des poles de différent nom.

„nelle, en raiſon compoſée de leurs ſphères d'activité reſpective. Alors, „en tournant doucement l'Aimant factice ſur ſon centre, j'eus la ſatisfaction „de voir toutes ces terrella tourner ſur elles-mêmes, par une rotation „correſpondante à celle de cet aimant; & cette rotation étoit pareille „à celle qu'éprouve une roue de rencontre, lorſqu'elle eſt mûe par une „autre roue à dents; de ſorte que lorſque je retournois mon Aimant, „de la droite à la gauche, la rotation des terrella étoit de la gauche à „la droite, & l'inverſe arrivoit toujours, lorſque je tournois mon Aimant de l'autre ſens.„ *Eſſai ſur le fluide électrique, par M. le Comte de Treſſan. Paris, 1786, tome* 1.er, *page 26 juſqu'à 29.*

ARTICLE V.

De la direction de l'Aimant & de ſa Déclinaiſon.

APRÈS AVOIR CONSIDÉRÉ les effets de la force attractive de l'Aimant, conſidérons les phénomènes de ſes forces directives. Un Aimant, ou ce qui revient au même, une aiguille aimantée ſe dirige toujours vers les poles du globe, ſoit directement, ſoit obliquement, en déclinant à l'eſt ou à l'oueſt, ſelon les tems & les lieux, car ce n'eſt que pendant un aſſez petit intervalle de tems, comme de quelques années, que dans un même lieu, la direction de l'Aimant paroît être conſtante, & en tout tems il n'y a que quelques endroits ſur la terre où l'aiguille ſe dirige droit aux poles du globe, tandis que par-tout ailleurs elle décline de plus ou moins de degrés à l'eſt ou à l'oueſt ſuivant les différentes poſitions de ces mêmes lieux.

Les grandes ou petites aiguilles aimantées ſur un Aimant fort ou foible, contre les poles ou contre les autres parties de la ſurface de ces Aimans, prennent toutes la même direction en marquant également la même déclinaiſon dans chaque lieu particulier.

Les François ſont, de l'aveu même des étrangers, les premiers en Europe qui aient fait uſage de cette connoiſſance de la direction de l'Aimant pour ſe conduire dans leurs navigations *(a)*; dès le commencement du douzième ſiècle, ils naviguoient ſur la méditerranée guidés par l'aiguille aimantée, qu'ils appelloient la la marinette *(b)*; & il eſt à préſumer que, dans ce tems, la déclinaiſon de l'Aimant étoit conſtante, car cette aiguille n'auroit pu guider des Navigateurs qui ne connoiſſoient pas ſes variations, & ce n'eſt que dans les ſiècles ſuivans qu'on a obſervé ſa déclinaiſon dans les différens lieux de la terre, & même aujourd'hui l'art néceſſaire à la préciſion de ces obſervations n'eſt pas encore à ſa perfection. La marinette n'étoit qu'une bouſſole imparfaite, & notre compas de mer, qui eſt

---

(*a*) Par le témoignage des auteurs Chinois, dont MM. le Roux & de Guignes ont fait l'extrait, il paroît certain que la propriété qu'a le fer aimanté de ſe diriger vers les poles, a été très-anciennement connue des Chinois; la forme de ces premières bouſſoles étoit une figure d'homme qui tournoit ſur un pivot, & dont le bras droit montroit toujours le midi. Le tems de cette invention, ſuivant certaines chroniques de la Chine, eſt 1115 ans avant l'ère chrétienne, & 2700 ſelon d'autres. (Voyez l'extrait des annales de la Chine, par MM. le Roux & de Guignes). Mais, malgré l'ancienneté de cette découverte, il ne paroît pas que les Chinois en aient jamais tiré l'avantage de faire de longs voyages.

(*b*) Muſchembroëck. *Diſſertatio de magnete.*

la bouſſole

la bouſſole perfectionnée, n'eſt pas encore un guide auſſi fidèle qu'il ſeroit à deſirer; nous ne pouvons même guère eſpérer de le rendre plus sûr, malgré les obſervations très-multipliées des Navigateurs dans toutes les parties du monde, parce que la déclinaiſon de l'Aimant change ſelon les lieux & les tems. Il faut donc chercher à reconnoître ces changemens de direction en différens tems, pendant un auſſi grand nombre d'années que les obſervations peuvent nous l'indiquer, & enſuite les comparer aux changemens de cette déclinaiſon dans un même tems en différens lieux.

En recueillant le petit nombre d'obſervations faites à Paris dans les ſeizième & dix-ſeptième ſiècles, il paroît qu'en l'année 1580, l'aiguille aimantée déclinoit de onze degrés trente minutes vers l'eſt, qu'en 1618, elle déclinoit de huit degrés, & qu'en l'année 1663 elle ſe dirigeoit droit au pole; l'aiguille aimantée s'eſt donc ſucceſſivement approchée du pole de onze degrés trente minutes pendant cette ſuite de quatre-vingt-trois ans, mais elle n'eſt demeurée qu'un an ou deux ſtationnaire, dans cette direction où la déclinaiſon eſt nulle; après quoi l'aiguille s'eſt de plus en plus éloignée de la direction au pole *(c)*, toujours en déclinant vers

(*c*) Dans l'année 1670, la déclinaiſon étoit de 1 degré 30 minutes vers l'oueſt, & l'aiguille a continué de décliner dans les années

l'oueſt; de ſorte qu'en 1785, le 30 Mai, la déclinaiſon étoit à Paris de vingt-deux degrés *(d)*. De même on peut voir, par les obſervations faites à Londres,

---

ſuivantes, toujours vers l'oueſt; en 1680, elle déclinoit de 2 deg. 40 min. En 1681, de 2 deg. 30 min. En 1683, de 3 deg. 50 min. En 1684, de 4 deg. 10 min. En 1685, de 4 deg. 10 min En 1686, de 4 deg. 30 min. En 1692, de 5 deg. 50 min. En 1693, de 6 deg. 20 min. En 1695, de 6 deg. 48 min. En 1696, de 7 deg. 8 min. En 1698, de 7 deg. 40 min. En 1699, de 8 deg. 10 min. En 1700, de 8 deg. 12 min. En 1701, de 8 deg. 25 min. En 1702, de 8 deg. 48 min. En 1703, de 9 deg. 6 min. En 1704, de 9 deg. 20 min. En 1705, de 2 deg. 35 min. En 1706, de 9 deg. 48 min. En 1707, de 10 deg. 10 min. En 1708, de 10 deg. 15 min. En 1709, de 11 deg. 15 min. En 1714, de 11 deg. 30 min. En 1717, de 12 deg. 20 min. En 1719, de 12 deg. 30 min. En 1720, 1721, 1722, 1723 & 1724, de 13 deg. En 1725, de 13 deg. 15 min. En 1727 & 1728, de 14 deg. *Muſchembroëck, diſſertatio de magnete, page* 152.... En 1729, de 14 deg. 10 min. En 1730, de 14 deg. 25 min. En 1731, de 14 deg. 45 min. En 1732 & 1733, de 15 deg. 15 min. En 1734 & 1740, de 15 deg. 45 min. En 1744, 1745, 1746, 1747 & 1749, de 16 deg. 30 min. *Encyclopédie, article aiguille aimantée.* En 1755, de 17 deg. 30 min. En 1756, de 17 deg. 45 min. En 1757 & 1758, de 18 deg. En 1759, de 18 deg. 10 min. En 1760, de 18 deg. 20 min. En 1765, de 18 deg. 55 min. 20 ſec. En 1767, de 19 deg. 16 min. En 1768, de 19 deg. 25 min. *Connoiſſance des tems*, années 1769, 1770, 1771 & 1772.

(*d*) Extrait des obſervations faites à l'Obſervatoire royal en l'année 1785.

qu'avant l'année 1657 l'aiguille déclinoit à l'eſt, & qu'après cette année 1657, où ſa direction tendoit droit au pole, elle a décliné ſucceſſivement vers l'oueſt *(e)*.

La déclinaiſon s'eſt donc trouvée nulle à Londres, ſix ans plutôt qu'à Paris, & Londres eſt plus occidental que Paris de deux degrés vingt-cinq minutes. Le méridien magnétique coincidoit avec le méridien de Londres en 1657, & avec le méridien de Paris en 1663; il a donc ſubi, pendant ce tems, un changement d'occident en orient, par un mouvement de deux degrés vingt-cinq minutes, en ſix ans, & l'on pourroit croire que ce mouvement ſeroit relatif à l'intervalle des méridiens terreſtres, ſi d'autres obſervations ne s'oppoſoient pas à cette ſuppoſition; le méridien magnétique de la ligne ſans déclinaiſon, paſſoit par Vienne en Autriche, dès l'an-

---

(*e*) L'aiguille aimantée n'avoit aucune déclinaiſon à Vienne en Autriche dans l'année 1638; elle n'en avoit de même aucune en 1600 au Cap des aiguilles en Afrique; &, avant ces époques, la déclinaiſon étoit vers l'eſt dans tous les lieux de l'Europe & de l'Afrique. *Muſchembroëck, page 166....* Ceci ſemble prouver que la marche de la ligne ſans déclinaiſon, ne ſe fait pas par un mouvement régulier, qui rameneroit ſucceſſivement la déclinaiſon de l'eſt à l'oueſt; car Vienne étant à quatorze degrés deux minutes trente ſecondes à l'eſt de Paris, cette ligne ſans déclinaiſon auroit dû arriver à Paris, plutôt qu'à Londres, qui eſt à l'oueſt de Paris, & l'on voit que c'eſt tout le contraire, puiſqu'elle eſt arrivée ſix ans plutôt à Londres qu'à Paris.

née 1638 ; cette ligne auroit donc dû arriver à Paris plutôt qu'à Londres ; & cependant c'eſt à Londres qu'elle eſt arrivée ſix ans plutôt qu'à Paris. Cela nous démontre que le mouvement de cette ligne n'eſt point du tout relatif aux intervalles des méridiens terreſtres.

Il ne me paroît donc pas poſſible de déterminer la marche de ce mouvement de déclinaiſon, parce que ſa progreſſion eſt plus qu'irrégulière, & n'eſt point du tout proportionnelle au tems, non plus qu'à l'eſpace ; elle eſt tantôt plus prompte, tantôt plus lente, & quelquefois nulle ; l'aiguille demeurant ſtationnaire, & même devenant rétrograde pendant quelques années, & reprenant enſuite un mouvement de déclinaiſon dans le même ſens progreſſif. M. Caſſini, l'un de nos plus ſavans Aſtronomes, a été informé qu'à Quebec la déclinaiſon n'a varié que de trente minutes, pendant 37 ans conſécutifs ; c'eſt peut-être le ſeul exemple d'une ſtation auſſi longue ; mais on a obſervé pluſieurs ſtations moins longues en différens lieux : par exemple, à Paris, l'aiguille a marqué la même déclinaiſon pendant cinq années, depuis 1720 juſqu'en 1724, & aujourd'hui ce mouvement progreſſif eſt fort ralenti ; car, pendant ſeize années, la déclinaiſon n'a augmenté que de deux degrés, ce qui ne fait que ſept minutes & demie par an, puiſqu'en 1769, la déclinaiſon étoit de vingt degrés, & qu'en 1785, elle s'eſt trouvée de vingt-

deux (*f*). Je ne crois donc pas que l'on puiſſe, par des obſervations ultérieures & même très-multipliées, déterminer quelque choſe de précis ſur le mouvement progreſſif ou rétrograde de l'aiguille aimantée, parce que ce mouvement n'eſt point l'effet d'une cauſe conſtante, ou d'une loi de la Nature, mais dépend de circonſtances accidentelles, particulières à certains lieux, & variables ſelon les tems; je crois pouvoir aſſurer, comme je l'ai dit, que le défrichement des terres, & la découverte ou l'enfouiſſement des mines de fer, ſoit par les tremblemens de terre, les effets des foudres ſouterraines & de l'éruption des volcans, ſoit par l'incendie des forêts, & même par le travail des hommes, doivent changer la poſition des poles magnétiques ſur le globe, & fléchir en même-tems la direction de l'Aimant.

En 1785, la déclinaiſon de l'aiguille aimantée étoit de vingt-deux degrés; en 1784, elle n'a été que de vingt-un degrés vingt-une minutes; en 1783, de vingt-un degrés onze minutes (*g*); en 1782, de vingt-un degrés trente-ſix minutes (*h*).

(*f*) Ce fait eſt confirmé par les obſervations de M. Cotte, qui prouvent que la déclinaiſon moyenne de l'aiguille aimantée, en 1786, n'a été à Laon que de vingt-un degrés trente-une minutes. *Voyez le Journal de Phyſique du mois de Mai 1787.*

(*g*) Connoiſſance des tems, années 1787 & 1788.

(*h*) *Idem*, année 1786.

Et en conſultant les obſervations qui ont été faites par l'un de nos plus habiles Phyſiciens M. Cotte, nous voyons qu'en prenant le terme moyen, entre les réſultats des obſervations faites à Montmorency, près Paris, tous les jours de l'année, le matin, à midi & le ſoir, c'eſt-à-dire, le terme moyen de 1095 obſervations; la déclinaiſon, en l'année 1781, a été de vingt degrés ſeize minutes cinquante-huit ſecondes; & les différences entre les obſervations ont été ſi petites, que M. Cotte a cru pouvoir les regarder comme nulles (*i*).

En 1780, cette même déclinaiſon moyenne a été de dix-neuf degrés cinquante-cinq minutes vingt-ſept ſecondes; en 1779, de dix-neuf degrés quarante-une minutes huit ſecondes; en 1778, de dix-neuf degrés trente-deux minutes cinquante-cinq ſecondes; en 1777, de dix-neuf degrés trente-cinq minutes cinquante-cinq ſecondes; en 1776, de dix-neuf degrés trente-trois minutes trente-une ſecondes; en 1775, de dix-neuf degrés quarante-une minutes quarante-une ſecondes (*k*).

(*i*) Connoiſſance des tems, année 1775, page 387.

(*k*) En 1780, la déclinaiſon moyenne priſe d'après 6022 obſervations, a été de 19 deg. 55 min. 27 ſec. Mais les variations de cette déclinaiſon ont été bien plus conſidérables qu'en 1781, car la plus

Ces obſervations ſont les plus exactes qui aient jamais été faites; celles des années précédentes, quoi-

---

grande déclinaiſon s'eſt trouvée de 20 deg. 15 min. le 29 juillet, & la moindre de 18 deg. 40 min. le même jour. La différence a donc été de 1 degré 35 min.; & cette variation, qui s'eſt faite le même jour, c'eſt-à-dire, en douze ou quinze heures, eſt plus conſidérable que le progrès de la déclinaiſon pendant 15 ans, puiſqu'en 1764, la déclinaiſon étoit de 18 deg. 55 min. 20 ſec., c'eſt-à-dire, de 15 min. 20 ſec, plus grande que celle du 29 juillet, à l'heure qu'elle s'eſt trouvée de 18 deg. 40 min. . . . . En 1779, la déclinaiſon moyenne, pendant l'année, a été de 19 deg. 41 min. 8 ſec. La plus grande déclinaiſon s'eſt trouvée de 20 deg., le 6 Décembre, à la ſuite d'une aurore boréale, & la plus petite, de 19 deg. 15 min., en Janvier & Février; la différence a donc été de 45 min. L'obſervateur remarque que l'augmentation moyenne a augmenté de 8 à 9 min. depuis l'année précédente, & que la variation diurne s'eſt ſoutenue avec beaucoup de régularité, excepté dans certains jours où elle a été troublée, le plus ſouvent à l'approche ou à la ſuite d'une aurore boréale; au reſte, ajoute-t-il, l'aiguille aimantée tend à ſe rapprocher du nord chaque jour, depuis trois ou quatre heures du ſoir, juſqu'à cinq ou ſix heures du matin, & elle tend à s'en éloigner depuis cinq ou ſix heures du matin, juſqu'à trois ou quatre heures du ſoir . . . . En 1778, la déclinaiſon moyenne, pendant l'année, a été de 19 deg. 32 min. 55 ſec. La plus grande déclinaiſon a été de 20 deg. le 29 Juin; on avoit obſervé une aurore boréale la veille à 11 heures du ſoir; la plus petite déclinaiſon a été de 18 deg. 54 min. le 26 Janvier; ainſi, la différence a été de 1 deg. 6 min. En 1777, la déclinaiſon moyenne, pendant l'année, a été de 19 deg. 35 min. La plus grande déclinaiſon s'eſt trouvée de 19 deg. 58 min. le 19 Juin, & la plus petite de 18 deg. 45 min. au mois de décembre; ainſi, la différence a été de 1 deg. 13

que bonnes, n'offrent pas le même degré d'exactitude, & à meſure qu'on remonte dans le paſſé, les obſervations deviennent plus rares & moins préciſes, parce qu'elles n'ont été faites qu'une fois ou deux par mois, & même par année.

Comparant donc ces obſervations entr'elles, on voit que, pendant les onze années, depuis 1775 juſqu'en 1785, l'augmentation de la déclinaiſon vers l'oueſt n'a été que de deux degrés dix-huit minutes dix-neuf ſecondes, ce qui n'excède pas de beaucoup la variation de l'aiguille dans un ſeul jour, qui quelquefois eſt de plus d'un degré & demi. On ne peut donc pas en conclure affirmativement, que la progreſſion actuelle de l'aiguille vers l'oueſt ſoit conſidérable; il ſe pourroit, au contraire, que l'aiguille fût preſque ſtationnaire depuis quelques années, d'autant qu'en 1774 la déclinaiſon moyenne a été de dix-neuf degrés cin-

---

min.... En 1776, la déclinaiſon moyenne, pendant l'année, a été de 19 deg. 33 min. 31 ſec. La plus grande déclinaiſon s'eſt trouvée de 20 deg. en Mars, Avril & Mai, & la plus petite déclinaiſon en Janvier & Février, de 19 deg.; ainſi, la différence a été de 1 deg..... En 1775, la déclinaiſon moyenne, pendant l'année, a été de 19 deg. 41 min 41 ſec.; la plus grande déclinaiſon s'eſt trouvée de 20 deg. 10 min. le 15 avril, & la plus petite de 19 deg. le 15 décembre; ainſi, la différence a été de 1 deg. 10 min.... *Connoiſſance des tems, années 1778 & ſuivantes.*

quante-cinq

quante-cinq minutes trente-cinq ſecondes (*l*); en 1773, de vingt degrés une minute quinze ſecondes (*m*); en 1772, de dix-neuf degrés cinquante-cinq minutes vingt-cinq ſecondes, & cette augmentation, de la déclinaiſon vers l'oueſt, a été encore plus petite dans les années précédentes, puiſqu'en 1771 cette déclinaiſon a été de dix-neuf degrés cinquante-cinq minutes, comme en 1772 (*n*); qu'en 1770 elle a été de dix-neuf degrés cinquante-cinq minutes (*o*); & en 1769 de vingt degrés (*p*).

Le mouvement, en déclinaiſon vers l'oueſt, paroît donc s'être très-ralenti depuis près de vingt ans. Cela ſemble indiquer que ce mouvement pourra dans quelque-tems devenir rétrograde, ou du moins que ſa progreſſion ne s'étendra qu'à quelques degrés de plus; car je ne penſe pas qu'on puiſſe ſuppoſer ici une révolution entière, c'eſt-à-dire, de trois cens ſoixante degrés dans le même ſens; il n'y a aucun fondement à cette ſuppoſition, quoique pluſieurs Phyſiciens l'aient admiſe,

---

(*l*) Connoiſſance des tems, année 1776, page 314.

(*m*) *Idem*, page 313.

(*n*) *Idem*, année 1774, page 256.

(*o*) *Idem*, année 1772.

(*p*) *Idem*, année 1771, page 232.

& que même ils en aient calculé la durée d'après les obſervations qu'ils avoient pu recueillir ; & ſi nous voulions ſuppoſer & calculer de même, d'après les obſervations rapportées ci-deſſus, nous trouverions que la durée de cette révolution ſeroit de 1996 ans & quelques mois, puiſqu'en 122 années, c'eſt-à-dire, depuis 1663 à 1785, la progreſſion a été de vingt-deux degrés ; mais ne ſeroit-il pas néceſſaire de ſuppoſer encore que le mouvement de cette progreſſion fût aſſez uniforme, pour faire dans l'avenir à-peu-près autant de chemin que dans le paſſé, ce qui eſt plus qu'incertain, & même peu vraiſemblable par pluſieurs raiſons, toutes mieux fondées que ces fauſſes ſuppoſitions.

Car ſi nous remontons au-delà de l'année 1663, & que nous prenions pour premier terme de la progreſſion de ce mouvement l'année 1580, dans laquelle la déclinaiſon étoit de onze degrés trente minutes vers l'eſt, le progrès de ce mouvement en 205 ans (c'eſt-à-dire depuis 1580, juſqu'à l'année 1785 compriſe), a été en totalité de trente-trois degrés trente minutes, ce qui donneroit environ 2201 ans pour la révolution totale de trois cens-ſoixante degrés. Mais ce mouvement n'eſt pas, à beaucoup près, uniforme, puiſque depuis 1580 juſqu'en 1663, c'eſt-à-dire en 83 ans, l'aiguille a parcouru onze degrés trente minutes par ſon mouvement de l'eſt au nord, tandis que

dans les 52 années ſuivantes, c'eſt-à-dire depuis 1663 juſqu'en 1715, elle a parcouru du nord à l'oueſt un eſpace égal de onze degrés trente minutes, & que dans les 50 années ſuivantes, c'eſt-à-dire depuis 1715 juſqu'en 1765, le progrès de cette déclinaiſon n'a été que d'environ ſept degrés & demi; car, dans cette année 1765, l'aiguille aimantée déclinoit à Paris de dix-huit degrés cinquante-cinq minutes vingt ſecondes, & nous voyons que depuis cette année 1765 juſqu'en 1785, c'eſt-à-dire en vingt ans, la déclinaiſon n'a augmenté que de deux degrés; différence ſi petite, en comparaiſon des précédentes, qu'on peut préſumer avec fondement que le mouvement total de cette déclinaiſon à l'oueſt eſt borné, quant à préſent, à un arc de vingt-deux ou vingt-trois degrés *(q)*.

La ſuppoſition que le mouvement ſuit la même marche de l'eſt au nord, que du nord à l'oueſt, n'eſt nullement appuyée par les faits; car ſi l'on conſulte les obſervations faites à Paris, depuis l'année 1610

(*q*) Dans le ſupplément aux voyages de Thévenot, publié en 1681, page 30, il eſt dit que la déclinaiſon de l'aiguille aimantée avoit été obſervée de cinq degrés vers l'eſt en 1269. Si l'on connoiſſoit le lieu où cette obſervation a été faite, elle pourroit démontrer que la déclinaiſon eſt quelquefois rétrograde, & par conſéquent que ſon mouvement ne produit pas une révolution entière.

juſqu'en 1663, c'eſt-à-dire, dans les 53 ans qui ont précédé l'année où la déclinaiſon étoit nulle, l'aiguille n'a parcouru que huit degrés de l'eſt au nord, tandis que dans un eſpace de tems preſque égal, c'eſt-à-dire dans les 59 années ſuivantes, depuis 1663 juſqu'en 1712, elle a parcouru treize degrés vers l'oueſt *(r)*. On ne peut donc pas ſuppoſer que le mouvement de la déclinaiſon ſuivè la même marche en s'approchant qu'en s'éloignant du nord, puiſque ces obſervations démontrent le contraire.

Tout cela prouve ſeulement que ce mouvement ne ſuit aucune règle, & qu'il n'eſt pas l'effet d'une cauſe conſtante; il paroît donc certain que cette variation ne dépend que de cauſes accidentelles ou locales, & ſpécialement de la découverte ou de l'enfouiſſement des mines & grandes maſſes ferrugineuſes, & de leur aimantation plus ou moins prompte & plus ou moins étendue, ſelon qu'elles ſont plus ou moins découvertes & expoſées à l'action du magnétiſme général. Ces changemens, comme nous l'avons dit, peuvent être produits par les tremblemens de terre, l'éruption des volcans, ou les coups des foudres ſouterraines, l'incendie des forêts, & même par le travail des hommes ſur les mines de fer. Il doit dès-lors ſe former de nouveaux poles magnétiques, plus foibles ou

(*r*) Muſchembroëck, page 154.

plus puiſſans que les anciens, dont on peut auſſi ſuppoſer l'anéantiſſement par les mêmes cauſes. Ce mouvement ne peut donc pas être conſidéré comme un grand balancement qui ſe feroit par des oſcillations régulières; mais comme un mouvement qui s'opère par ſecouſſes plus ou moins ſenſibles, ſelon le changement plus ou moins prompt des poles magnétiques, changement qui ne peut provenir que de la découverte & de l'aimantation des mines ferrugineuſes, leſquelles ſeules peuvent former des poles.

Si nous conſidérons les mouvemens particuliers de l'aiguille aimantée, nous verrons qu'elle eſt preſque continuellement agitée par de petites vibrations, dont l'étendue eſt au moins auſſi variable que la durée. M. Graham, en Angleterre *(s)*, & M. Cotte, à Paris *(t)*, ont donné dans leurs tables d'obſervations toutes les alternatives, toutes les viciſſitudes de ce mouvement de trépidation chaque mois, chaque jour & chaque heure. Mais nous devons remarquer que les réſultats de ces obſervations doivent être modifiés. Ces Phyſiciens ne ſe ſont ſervis que de bouſſoles, dans leſquelles l'aiguille portoit ſur un pivot, dont le frotte-

---

(*s*) Tranſactions philoſophiques, N.° 383, année 1724, page 96.

(*t*) Voyez la connoiſſance des tems, publiée par ordre de l'Académie des Sciences, depuis l'année 1770.

ment influoit plus que toute autre cauſe ſur la variation ; car M. Colomb, Capitaine au Corps-royal du Génie, de l'Académie des Sciences, ayant imaginé une ſuſpenſion, dans laquelle l'aiguille eſt ſans frottement, M. le Comte de Caſſini, de l'Académie des Sciences, & arrière-petit-fils du grand Aſtronome Caſſini, a reconnu, par une ſuite d'expériences, que cette variation diurne ne s'étendoit tout au plus qu'à quinze ou ſeize minutes, & ſouvent beaucoup moins *(x)*,

---

(u) « La méthode de M. Colomb conſiſte, dit M. de Caſſini, à » ſuſpendre à un fil de ſoie, de quinze à vingt pouces de longueur, » une aiguille aimantée entre les jambes d'un étrier, au haut duquel le » fil eſt accroché. L'étrier, le fil & l'aiguille ſont renfermés dans une » boîte dont toutes les parois ſont hermétiquement bouchées, & qui n'a » qu'une ouverture fermée d'une glace au-deſſus de l'extrémité de » l'aiguille, afin de pouvoir obſerver ſes mouvemens, & les meſurer » par le moyen d'un micromètre extérieur placé à cette extrémité.

» Cette ſuſpenſion a, comme l'on voit, de grands avantages ſur celle » des pivots, dans laquelle le frottement ſeul eſt capable d'anéantir l'effet » de la variation diurne. Depuis le 10 août 1780, juſqu'au 18 du même » mois, le plus grand écart de l'aiguille a eu lieu communément du » côté de l'oueſt, vers une heure après midi; l'aiguille ſe rapprochoit » du nord vers le ſoir, reſtoit à-peu-près fixe la nuit, & recommençoit » le lendemain matin à s'éloigner vers l'oueſt ; la variation diurne moyenne » a été de 14 minutes environ . . . . Depuis le 3 décembre juſqu'au 31 » Janvier 1781, le grand écart de l'aiguille a preſque toujours eu lieu » entre deux & trois heures après midi, l'aiguille s'avançant depuis le

tandis qu'avec les bouſſoles à pivot, cette variation diurne eſt quelquefois de plus d'un degré & demi;

---

lever du ſoleil, juſqu'à deux ou trois heures, du nord vers l'oueſt; & « rétrogradant enſuite dans l'après-midi pour revenir vers dix heures du « ſoir, à-peu-près au même point que le matin. La nuit, l'aiguille étoit « aſſez conſtamment ſtationnaire; la variation moyenne n'a été, dans « tout ce tems, que de cinq à ſix minutes .... Depuis le 20 Septembre « 1781, juſqu'au 29, la variation diurne moyenne a été entre 13 & 18 « minutes .... Depuis le 19 Mars 1782, juſqu'au 3 Avril, & depuis le « 30 Avril, juſqu'au 11 Mai, le plus grand écart de l'aiguille a eu lieu « aſſez conſtamment vers deux heures après midi, du côté de l'oueſt. « J'ai auſſi remarqué le plus communément la loi de progreſſion vers « l'oueſt, du matin, vers deux heures après midi; de rétrogradation vers « l'eſt, depuis deux heures juſqu'au ſoir, & de ſtation pendant la nuit. « Depuis le 14 Juin juſqu'au 25 Juillet, avec la même aiguille fortement « aimantée, & dans les appartemens ſupérieurs de l'obſervatoire, la loi « générale de la marche de l'aiguille du nord à l'oueſt, depuis huit heures « du matin juſqu'à midi, de la rétrogradation dans l'après-midi, & de « la ſtation pendant la nuit, a eu lieu, excepté le 17 Juin, où l'aiguille « a été fixe depuis dix heures & demie du matin, juſqu'au lendemain « à 11 heures du matin; même fixité le 21, depuis huit heures du matin « juſqu'à cinq heures après midi; le 25, depuis dix heures du ſoir juſqu'au « lendemain 26 à trois heures après midi; les 12, 21 & 23 Juillet toute « la journée. Les circonſtances qui accompagnent cette inaction de l'aiguille, « ſont une grande chaleur, & un très-beau tems; la variation diurne « dans ces deux mois a été fort inégale; nulle dans les tems très-chauds; « le plus communément de cinq à ſix min. dans d'autres jours; elle n'a « été de 12 & de 14 que le 14 & le 15 Juin. «

Tandis que M. Colomb s'occupoit des moyens de donner aux aiguilles «

mais comme, jusqu'à présent, les Navigateurs ne se sont servis que de boussoles à pivot, on ne peut compter,

---

„ la plus grande force magnétique possible, je m'appliquois de mon „ côté à perfectionner leur monture, leur enveloppe & leur établisse- „ ment. Jusqu'alors l'étrier qui portoit le fil de suspension, n'étoit fixé „ que par une forte semelle, d'un bois à la vérité très-sec & très-épais. „ La boîte de bois qui servoit d'enveloppe, & le micromètre étoient „ également assis sur cette même base, dont le moindre jeu devoit „ communiquer du mouvement à tout l'équipage. Je fis faire en plomb „ la boîte ou cage qui devoit renfermer l'aiguille; au lieu d'étrier, je „ fis visser & cramponner dans le haut de la boîte, contre ses parois, „ une traverse de cuivre, portant une longue vis, garnie d'un crochet, „ pour tenir le fil de suspension. Cette forte & solide boîte de plomb fut „ ensuite incrustée de deux pouces dans un dez de pierre dure, haut „ de dix pouces, sur seize de longueur, & huit d'épaisseur; & c'est „ sur ce dez que je fixai à demeure le micromètre entièrement isolé „ de la boîte; c'est ainsi qu'avec l'équipage le plus simple & le plus „ solide, j'espérai mettre, autant qu'il étoit possible, mes aiguilles à „ l'abri des courans d'air & des mouvemens étrangers; en effet, je n'avois „ plus à craindre l'effet de l'humidité des tems & des lieux. L'air ne „ pouvoit guère pénétrer dans une boîte de plomb qui n'avoit qu'une „ porte, dont les parois étoient bouchées & collées avec soin; enfin, le „ micromètre portant sur un massif, dez de pierre, ne pouvoit plus „ communiquer de mouvemens à l'aiguille; c'est avec ce nouvel appareil, „ que je fis les observations suivantes.

„ Depuis le 14 Février, jusqu'au 24 du même mois, avec une aiguille „ de lame de ressort fortement aimantée, renfermée dans une boîte de „ plomb, fixée sur un dez de pierre, longueur totale de l'aiguille un pied;

qu'à

qu'à un degré & demi, & même à deux degrés près, ſur la certitude de leurs obſervations.

---

du point de ſuſpenſion à l'extrémité boréale, neuf pouces une ligne, « le plus grand écart de l'aiguille vers l'oueſt a eu lieu entre midi & « une heure, preſque toutes les matinées, la progreſſion de l'aiguille a « été très-régulière, & de onze minutes; mais dans les ſoirées, l'aiguille « éprouvoit de fréquentes irrégularités. Depuis le 16 après midi, juſqu'au « 18 au matin, il n'a pas été poſſible d'obſerver, l'aiguille étant dans « une continuelle agitation; il a régné, pendant ce tems, un vent très « fort de *nord* & de *nord-eſt*; les jours où la marche de l'aiguille a été « régulière, la variation diurne a été d'environ douze minutes..... « M. Coulomb a reconnu que l'acier fondu étoit la matière qui ſe char- « geoit le plus de la vertu magnétique, & par conſéquent la plus propre « à faire des aiguilles très-fortement aimantées. A la fin d'Avril 1783, « il me remit deux de ces nouvelles aiguilles, que je plaçai dans deux « boîtes de plomb, telles que je les ai décrites ci-deſſus, établies dans « deux cabinets différens; ce qui me procura une nouvelle ſuite d'ob- « ſervations dont je vais rendre compte..... Depuis le premier Mai « juſqu'au 6 Juillet, avec deux aiguilles d'acier fondu, placées ſur champ, « aimantées le plus fortement poſſible, longueur totale de chaque aiguille « un pied une ligne; poids de l'aiguille, avec ſon contrepoids & l'anneau « de ſuſpenſion à l'extrémité boréale de l'aiguille, neuf pouces une « ligne; l'accord le plus parfait s'eſt remarqué pendant ces deux mois « d'expériences & de comparaiſon des deux aiguilles, qui ſe ſont trouvées « ſtationnaires, oſcillantes & écartées dans les mêmes circonſtances, dans « les mêmes intervalles de tems, de la même quantité, & dans le même « ſens. Les exceptions à cette règle ont été ſi rares, & les différences ſi « petites, que j'ai cru devoir l'attribuer à l'erreur des obſervations. Le «

En consultant les observations faites par les Voyageurs récens (*y*), on voit qu'il y a plusieurs points sur le globe, où la déclinaison est actuellement nulle ou moindre d'un degré, soit à l'est, soit à l'ouest, tant dans l'hémisphère boréal que dans l'hémisphère austral, & la suite de ces points où la déclinaison est nulle ou presque nulle, forme des lignes & même des bandes qui se prolongent dans les deux hémisphères. Ces mêmes observations nous indiquent aussi que les endroits où la déclinaison est la plus grande dans l'un & l'autre hémisphère, se trouvent aux plus hautes latitudes & beaucoup plus près des poles que de l'équateur.

» plus grand des écarts de nos aiguilles vers l'est a eu lieu dans le mois » de Mai, vers l'heure de midi; dans le mois de Juin entre deux & trois » heures; le vent de nord-est & d'est m'a semblé plus d'une fois ac- » compagner ces irrégularités. J'ai remarqué quelquefois qu'un change- » ment subit du beau au mauvais tems, ou du mauvais au beau, changeoit » aussi la direction ordinaire de l'aiguille pour quelques jours, & » qu'ensuite semblable changement la ramenoit à son premier état.

» La quantité de la variation diurne n'est pas la même dans toutes les » saisons; il paroît qu'on peut fixer la plus grande à quatorze minutes, & la » plus petite à cinq minutes. C'est en hiver que la variation diurne paroît » être la plus petite, & j'ai remarqué qu'en été, lorsque la chaleur est » considérable, la variation est nulle. » *Extrait du Mémoire de M. de Cassini, adressé aux Auteurs du Journal de Physique.*

(*y*) Voyez les trois voyages du Capitaine Cook.

Les cauſes, qui font varier la déclinaiſon & la tranſportent, pour ainſi dire, avec le tems, de l'eſt à l'oueſt, ou de l'oueſt à l'eſt du méridien terreſtre, ne dépendent donc que de circonſtances accidentelles & locales, ſur leſquelles néanmoins nous pouvons aſſeoir un jugement en rapprochant les différens faits ci-devant indiqués.

Nous avons dit qu'en l'année 1580, l'aiguille déclinoit à Paris de onze degrés trente minutes vers l'eſt; or nous remarquerons que c'eſt depuis cette année 1580, que la déclinaiſon paroît avoir commencé de quitter cette direction vers l'eſt, pour ſe porter ſucceſſivement vers le nord & enſuite vers l'oueſt; car, en l'année 1610, l'aiguille, ainſi que nous l'avons déjà remarqué, ne déclinoit plus que de huit degrés vers l'eſt; en 1640, elle ne déclinoit plus que de trois degrés, &, en 1663, elle ſe dirigeoit droit au pole. Enfin, depuis cette époque, elle n'a pas ceſſé de ſe porter vers l'oueſt. J'obſerverai donc que la période de ce progrès dans l'oueſt, auquel il faut joindre encore la période du retour ou du rappel de la déclinaiſon de l'eſt au nord, puiſque ce mouvement s'eſt opéré dans le même ſens; j'obſerverai, dis-je, que ces périodes de tems ſemblent correſpondre à l'époque du défrichement & de la dénudation de la terre dans l'Amérique Septentrionale, & aux progrès de l'éta-

bliſſement des Colonies dans cette partie du nouveau monde ; en effet, l'ouverture du ſein de cette nouvelle terre par la culture, les incendies des forêts dans de vaſtes étendues, & l'exploitation des mines de fer par les Européens dans ce continent, dont les habitans ſauvages n'avoient jamais connu, ni recherché ce métal, n'ont-elles pas dû produire un nouveau pole magnétique, & déterminer vers cette partie occidentale du globe, la direction de l'Aimant, qui précédemment n'éprouvoit pas cette attraction, & au lieu d'obéir à deux forces, étoit uniquement déterminée par le courant électrique qui va de l'équateur aux poles de la terre.

J'ai remarqué, ci-devant, que la déclinaiſon s'eſt trouvée conſtante à Quebec, durant une période de 37 ans; ce qui ſemble prouver l'action conſtante d'un nouveau pole magnétique dans les régions ſeptentrionales de l'Amérique. Enfin le ralentiſſement actuel du progrès de la déclinaiſon dans l'oueſt, offre encore un rapport ſuivi avec l'état de cette terre du nouveau monde, ou le principal progrès de la dénudation du ſol, & de l'exploitation des mines de fer, paroît actuellement être à-peu-près auſſi complet que dans les régions ſeptentrionales de l'ancien Continent.

On peut donc aſſurer que cette déclinaiſon de l'Aimant, dans les divers lieux, & ſelon les différens tems,

ne dépend que du giſſement des grandes maſſes ferrugineuſes dans chaque région, & de l'aimantation plus ou moins prompte de ces mêmes maſſes, par des cauſes accidentelles ou des circonſtances locales, telles que le travail de l'homme, l'incendie des forêts, l'éruption des volcans, & même les coups que frappe l'électricité ſouterraine ſur de grands eſpaces, cauſes qui peuvent toutes donner également le magnétiſme aux matières ferrugineuſes; & ce qui en complète les preuves, c'eſt qu'après les tremblemens de terre, on a vu ſouvent l'aiguille aimantée, ſoumiſe à de grandes irrégularités dans ſes variations (z).

Au reſte, quelque irrégulière que ſoit la variation de l'aiguille aimantée dans ſa direction, il me paroît néanmoins que l'on peut en fixer les limites, & même placer entre elles un grand nombre de points intermédiaires, qui, comme ces limites mêmes, ſeront conſtans & preſque fixes pour un certain nombre d'années, parce que le progrès de ce mouvement de déclinaiſon ne ſe faiſant actuellement que très-lentement, on peut le regarder comme conſtant pour le prochain avenir d'un petit nombre d'années; & c'eſt pour arriver à cette détermination, ou du moins pour en approcher, autant qu'il eſt poſſi-

(z) Voyez l'ouvrage déjà cité de M. Epinus, N.° 364.

ble, que j'ai réuni toutes les obſervations que j'ai pu recueillir dans les voyages & navigations faits depuis vingt ans, & dont je placerai d'avance les principaux réſultats dans l'article ſuivant.

ARTICLE VI.

De l'inclinaiſon de l'Aimant.

LA DIRECTION DE L'AIMANT, ou de l'aiguille aimantée, n'eſt pas l'effet d'un mouvement ſimple, mais d'un mouvement compoſé qui ſuit la courbure du globe de l'équateur aux poles. Si l'on poſe un Aimant ſur du mercure, dans une ſituation horizontale, & ſous le méridien magnétique du lieu, il s'inclinera de manière que le pole auſtral de cet Aimant s'élèvera au-deſſus, & que le pole boréal s'abaiſſera au-deſſous de la ligne horizontale dans notre hémiſphère boréal, & le contraire arrive dans l'hémiſphère auſtral; cet effet eſt encore plus aiſé à meſurer, au moyen d'une aiguille aimantée, placée dans un plan vertical: la bouſſole horizontale indique la direction avec ſes déclinaiſons, & la bouſſole verticale démontre l'inclinaiſon de l'aiguille; cette inclinaiſon change ſouvent plus que la déclinaiſon, ſuivant les lieux, mais elle eſt plus conſtante pour les tems; & l'on a même obſervé que la différence de hauteur, comme du ſommet d'une montagne à ſa vallée, ne

change rien à cette inclinaiſon. M. le Chevalier de Lamanon m'écrit, qu'étant ſur le Pic de Ténériffe, à 1900 toiſes au deſſus du niveau de la mer, il avoit obſervé que l'inclinaiſon de l'aiguille étoit la même qu'à Sainte-Croix ; ce qui ſemble prouver que les émanations du globe qui produiſent l'électricité & le magnétiſme s'élèvent à une très-grande hauteur dans les climats chauds *(a)* ; au reſte, l'inclinaiſon & la déclinaiſon ſont ſujettes à des trépidations preſque continuelles de jour en jour, d'heure en heure, &, pour ainſi dire, de moment à moment.

Les aiguilles des bouſſoles verticales doivent être faites & placées de manière que leur centre de gravité coincide avec leur centre de mouvement, au lieu que, dans les bouſſoles horizontales, le centre du mouvement de l'aiguille eſt un peu plus élevé que ſon centre de gravité.

Lorſqu'on commence à mettre en mouvement cette aiguille placée verticalement, elle ſe meut par des oſcillations qu'on a voulu comparer à celles du pendule de la gravitation ; mais les effets qu'ils préſentent ſont très-différens ; car la direction de cette aiguille, dans ſon inclinaiſon, varie ſelon les différens lieux,

---

(*a*) Lettre de M. le Chevalier de Lamanon à M. de Buffon, datée des Iſles Canaries, 178.

au lieu

au lieu que celle du pendule eſt conſtante dans tous les lieux de la terre, puiſqu'elle eſt toujours perpendiculaire à la ſurface du globe.

Nous avons dit que les particules de la limaille de fer ſont autant de petites aiguilles, qui prennent des poles par le contact de l'Aimant ; ces aiguilles ſe dreſſent perpendiculairement ſur les deux poles de l'Aimant, mais la poſition de ces particules aimantées devient d'autant plus oblique, qu'elles ſont plus éloignées de ces mêmes poles, & juſqu'à l'équateur de l'Aimant, où il ne leur reſte qu'une attraction ſans inclinaiſon. Cet équateur eſt le point de partage entre les deux directions & inclinaiſons en ſens contraire ; & nous devons obſerver que cette ligne de ſéparation des deux courans magnétiques, ne ſe trouve pas préciſément à la même diſtance des deux poles, dans les Aimans non plus que dans le globe terreſtre, & qu'elle eſt toujours à une moindre diſtance du pole le plus foible. Les particules de limaille s'attachent horizontalement ſur cette partie de l'équateur des Aimans, & leur inclinaiſon ne ſe manifeſte bien ſenſiblement, qu'à quelque diſtance de cette partie équatoriale ; la limaille commence alors à s'incliner ſenſiblement vers l'un & l'autre poles en-deçà & au-delà de cet équateur ; ſon inclinaiſon vers le pole auſtral eſt donc à contre-ſens de la première, qui tend au pole boréal de l'Aimant, & cette limaille ſe dreſſe

de même perpendiculairement ſur le pole auſtral comme ſur le pole boréal. Ces phénomènes ſont conſtans dans tous les Aimans ou fer aimanté; & comme le globe terreſtre poſſède en grand les mêmes puiſſances que l'Aimant nous préſente en petit, l'aiguille doit être perpendiculaire par une inclinaiſon de quatre-vingt-dix degrés ſur les poles magnétiques du globe; ainſi, les lieux où l'inclinaiſon de l'aiguille ſera de quatre-vingt-dix degrés, ſeront en effet les vrais poles magnétiques ſur la terre.

Nous n'avons rien négligé pour nous procurer toutes les obſervations qui ont été faites juſqu'ici ſur la déclinaiſon & l'inclinaiſon de l'aiguille aimantée *(b)*. Nous croyons que perſonne, avant nous, n'en avoit recueilli un auſſi grand nombre; nous les avons comparées avec ſoin, & nous avons reconnu que c'eſt aux environs de l'équateur que l'inclinaiſon eſt preſque toujours nulle; que l'équateur magnétique eſt au-deſſus de l'équateur terreſtre dans la partie de la mer des Indes, ſituée vers le quatre-vingt-dix-ſeptième degré de longitude *(c)*, & qu'il paroît, au contraire, au-deſſous

---

(*b*) De tous nos voyageurs, M. Eckberg & M. le Gentil, ſavant Aſtronome de l'Académie des Sciences, ſont ceux qui ont donné le plus d'attention à l'inclinaiſon de l'Aimant dans les régions qu'ils ont parcourues.

(*c*) Nous devons remarquer que, dans les articles de la déclinaiſon

de la ligne dans la portion de la mer Pacifique, qui correſpond au cent quatre-vingt-dix-ſeptième degré : on peut donc conjecturer que le pole magnétique eſt éloigné vers l'eſt du pole de la terre, relativement aux mers des Indes & Pacifique ; & par conſéquent il doit être ſitué dans les terres les plus ſeptentrionales de l'Amérique, ainſi que nous l'avons déja dit.

Dans la mer atlantique, l'eſpace où l'aiguille a été obſervée ſans déclinaiſon *(d)*, ſe prolonge juſqu'au cinquante-huitième degré de latitude auſtrale, & à l'égard de ſon étendue vers le nord, on le peut ſuivre juſqu'au trente-cinquième degré, ou environ, de latitude, ce qui lui donneroit en tout quatre-vingt-treize degrés de longueur, ſi l'on avoit fait, juſqu'à préſent, aſſez d'obſervations pour que nous fuſſions aſſurés qu'il n'eſt interrompu par aucun endroit où l'aiguille décline de plus de deux degrés vers l'eſt ou vers l'oueſt. Cet eſpace, ou cette bande ſans déclinaiſon, peut ſur-tout

---

& de l'inclinaiſon de l'Aimant, nous avons toujours compté les longitudes à l'eſt du méridien de Paris.

(d) Je dois obſerver ici que j'ai regardé comme nulles toutes les déclinaiſons qui ne s'étendoient pas à deux degrés au-deſſus de zéro, parce que les variations diurnes, & ſur-tout les accidens des aurores boréales & des tempêtes, font ſouvent changer la direction de l'aiguille de plus de deux degrés.

être interrompue dans le voiſinage des Continens & des Iſles. Car on ne peut douter que la proximité des terres n'influe beaucoup ſur la direction de l'aiguille. Cette déviation dépend des maſſes ferrugineuſes qui peuvent ſe trouver à la ſurface de ces terres, & qui agiſſant ſur le magnétiſme général, comme autant de poles magnétiques particuliers, doivent fléchir ſon cours, & en changer plus ou moins la direction : & ſi le voiſinage de certaines côtes a paru, au contraire, repouſſer l'aiguille aimantée, la nouvelle direction de l'aiguille n'a point été dans ces cas particuliers l'effet d'une répulſion qui n'a été qu'apparente ; mais elle a été produite par le magnétiſme général, ou par l'attraction particulière de quelques autres terres plus ou moins éloignées, & dont l'action aura ceſſé d'être troublée dans le voiſinage de certaines côtes dépourvues de mines de fer ou d'Aimant. Lors donc qu'à l'approche des terres l'aiguille aimantée éprouve conſtamment des changemens très-marqués dans ſa déclinaiſon, on peut en conclure l'exiſtence ou le défaut de mines de fer ou d'Aimant dans ces mêmes terres, ſuivant qu'elles attirent ou repouſſent l'aiguille aimantée.

En général, les bandes ſans déclinaiſon ſe trouvent toujours plus près des côtes orientales des grands Continens, que des côtes occidentales : celle qui a été obſervée dans la mer Atlantique, eſt, dans tous ſes

points, beaucoup plus voiſine des côtes orientales de l'Amérique, que des côtes occidentales de l'Afrique & de l'Europe; & celle qui traverſe la mer de l'Inde & la grande mer Pacifique, eſt placée à une aſſez petite diſtance à l'eſt des côtes de l'Aſie.

La bande ſans déclinaiſon de la mer des Indes, & qui ſe prolonge dans la mer Pacifique boréale, paroît s'étendre depuis environ le cinquante-neuvième degré de latitude ſud, juſqu'au quarantième degré de latitude nord.

Il eſt important d'obſerver que ſous la latitude boréale de dix-neuf degrés, ainſi que ſous la latitude auſtrale de cinquante-trois degrés, la bande ſans déclinaiſon de la mer Atlantique, & celle de la mer des Indes, ſont éloignées l'une de l'autre d'environ cent cinquante-ſept degrés, c'eſt-à-dire de près de la moitié de la circonférence du globe. Il eſt également remarquable qu'à partir de quelques degrés de l'équateur, on n'a obſervé dans la mer Pacifique boréale aucune déclinaiſon vers l'oueſt qu'on ne puiſſe rapporter aux variations inſtantanées & irrégulières de l'aiguille; ceci joint à toutes les directions des déclinaiſons, tant de la mer Atlantique que de la mer des Indes, confirme l'exiſtence d'un pole magnétique très-puiſſant dans le nord des terres de l'Amérique, & ce qui confirme encore cette vérité, c'eſt que la plus grande déclinaiſon orientale dans la mer Pacifique boréale,

a été obſervée par le Capitaine Cook, de trente-ſix degrés dix-neuf minutes, aux environs de ſoixante-dix degrés de latitude nord, & du cent quatre-vingt-quinzième de longitude, c'eſt-à-dire, à deux degrés, ou à-peu-près, au nord des terres de l'Amérique les plus voiſines de l'Aſie. D'un autre côté, M. le Chevalier de l'Angle a trouvé une déclinaiſon vers l'oueſt de quarante-cinq degrés, dans un point de la mer Atlantique, ſitué très-près des côtes orientales & boréales de l'Amérique. C'eſt donc dans ces terres ſeptentrionales du nouveau Continent, que toutes les directions des déclinaiſons ſe réuniſſent & coincident au pole magnétique, dont l'exiſtence nous paroît démontrée par tous les phénomènes.

La déclinaiſon n'éprouve que de petites viciſſitudes dans les baſſes latitudes, ſur-tout dans la grande mer de l'Inde, où l'on n'obſerve jamais qu'un petit nombre de degrés de déclinaiſon dans le voiſinage de l'équateur, tandis que, dans les plus hautes latitudes de l'hémiſphère auſtral, il paroît que la déclinaiſon de l'aiguille varie beaucoup de l'eſt à l'oueſt, ou de l'oueſt à l'eſt dans un très-petit eſpace.

La ligne, ſans déclinaiſon, qui paſſe entre Malaca, Bornéo, le détroit de la Sonde ſe replie vers l'eſt, & ſon inflexion ſemble être produite par les terres de la nouvelle Hollande.

Il y a, dans la mer Pacifique, une troiſième bande ſans déclinaiſon, qui paroît s'étendre depuis le ſeptième degré de latitude nord, juſqu'au cinquante-cinquième degré de latitude ſud. Cette bande traverſe l'équateur vers le deux cens trente-deuxième degré de longitude; mais, à vingt-quatre degrés de latitude auſtrale, elle paroît fléchir vers les côtes occidentales de l'Amérique méridionale, ce qui paroît être l'effet des maſſes ferrugineuſes, que l'on doit trouver dans ces contrées, ſi ſouvent brûlées par les feux des volcans, & agitées par les coups de la foudre ſouterraine.

La déclinaiſon la plus conſidérable qui ait été trouvée dans l'hémiſphère auſtral, eſt celle de quarante-trois degrés ſix minutes, obſervée par Cook, en Février 1773, ſous le ſoixantième degré de latitude, & le quatre-vingt-douzième degré trente-cinq minutes de longitude, loin de toute terre connue; & la plus forte déclinaiſon qu'on ait trouvée dans l'hémiſphère boréal, &, en même-tems, la plus grande de toutes celles qui ont été remarquées dans les derniers tems, eſt celle de quarante-cinq degrés, dont nous avons déjà parlé, & qui a été obſervée par M. le Chevalier de l'Angle, vers le ſoixante-deuxième degré de latitude, & le deux cens quatre-vingt-dix-ſept ou deux cens quatre-vingt-dix-huitième de longitude, entre le Groënland & la terre de Labrador; elles ſont toutes les deux vers l'oueſt, & toutes les deux ont eu lieu dans

des endroits éloignés de l'équateur d'environ ſoixante degrés.

Tels ſont les principaux faits, tant pour la déclinaiſon que pour l'inclinaiſon, qu'offre ce qu'on a reconnu de l'état actuel des forces magnétiques, qui s'étendent de l'équateur aux poles, & ſi nous voulons tirer quelques réſultats du petit nombre d'obſervations plus anciennes, nous trouverons que, depuis 1700, l'inclinaiſon de l'aiguille aimantée a varié en différens endroits; mais tout ce que l'on peut conclure de ces obſervations qui ſont en trop petit nombre, c'eſt que les changemens de la déclinaiſon & de l'inclinaiſon ont été inégaux & irréguliers dans les divers points des deux hémiſphères.

Et, pour ne conſidérer d'abord que les variations de la déclinaiſon, la plus grande irrégularité des changemens qu'elle a éprouvés ſur les différens points du globe, ſuffit pour empêcher d'admettre l'hypothèſe de Halley, qui ſuppoſoit dans l'intérieur de la terre, un grand noyau magnétique doué d'une ſorte de mouvement de rotation, indépendant de celui du globe, & qui, par ſa déclinaiſon, produiroit celle des Aimans, placés à la ſurface de la terre. M. Epinus *(e)*, qui d'abord paroiſſoit tenté d'adopter l'opinion de Halley,

---

(*e*) Voyez l'ouvrage déjà cité de ce ſavant Phyſicien.

a vu

a vu lui-même qu'elle ne pourroit pas s'accorder avec l'irrégularité des changemens de la déclinaiſon magnétique : au lieu du mouvement régulier d'une ſorte de grand Aimant imaginé par Halley, il a propoſé d'admettre des changemens irréguliers & locaux dans le noyau de la terre ; mais, indépendamment de l'impoſſibilité d'aſſigner les cauſes de ces changemens intérieurs, ils ne pourroient agir ſur la déclinaiſon des aiguilles, qu'autant que les portions du noyau gagneroient ou perdroient la vertu magnétique ; & nous avons vu que les maſſes ferrugineuſes ne pouvoient s'aimanter naturellement que très-près de la ſurface du globe, & par les influences de l'athmoſphère.

Depuis 1580, la déclinaiſon de l'aiguille a varié dans les divers endroits de la ſurface du globe, d'une manière très-inégale : elle s'eſt portée vers l'eſt avec des vîteſſes très-différentes, non-ſeulement ſelon les tems, mais encore ſelon les lieux ; & ceci eſt d'autant plus important à obſerver que ſes mouvemens ont toujours été très-irréguliers, & que nous ne faiſons ici aucune attention aux petites cauſes locales qui ont pu la déranger. Ces cauſes, dont les effets ne ſont pas conſtans, mais paſſagers, peuvent être de même nature que les cauſes plus générales du changement de déclinaiſon ; mais elles n'agiſſent qu'en certains endroits, où elles doivent détourner cette même déclinaiſon d'un grand nombre de degrés, juſqu'à la faire

aller en diminuant, lorſqu'elle devroit s'accroître, & peuvent même tout-à-coup la faire changer de l'eſt à l'oueſt, ou de l'oueſt à l'eſt. Par exemple, dans l'année 1618, la déclinaiſon étoit orientale de quinze degrés dans l'Iſle de Candie, tandis qu'elle étoit nulle à Malthe, & dans le détroit de Gibraltar, & qu'elle étoit de ſix degrés vers l'oueſt à Palerme & à Alexandrie; ce que l'on ne peut attribuer qu'à des cauſes particulières & à ces effets paſſagers que nous venons d'indiquer.

La bande ſans déclinaiſon, qui ſe trouve actuellement dans la mer Atlantique, giſſoit auparavant dans notre Continent; en 1594, elle paſſoit à Narva, en Finlande, elle étoit en même-tems bien plus avancée du côté de l'eſt dans les régions plus voiſines de l'équateur, &, par conſéquent, il y a près de 200 ans qu'elle étoit inclinée du côté de l'oueſt, relativement à l'équateur terreſtre, puiſqu'elle n'a paſſé qu'en 1600 à Conſtantinople, qui eſt à-peu-près ſous le même méridien que Narva. Cette bande ſans déclinaïſon eſt parvenue, en s'avançant vers l'oueſt, juſqu'au deux cens quatre-vingt-deuxième degré de longitude, & à la latitude de trente-cinq degrés, où elle ſe trouve actuellement.

En 1616, la déclinaiſon fut trouvée de cinquante-ſept degrés à ſoixante-dix-huit degrés de latitude boréale, & deux cens quatre-vingt de longitude. C'eſt la plus grande déclinaiſon qu'on ait obſervée; elle

étoit vers l'oueſt, ainſi que les deux fortes déclinaiſons dont nous devons la connoiſſance à M. le Chevalier de l'Angle, & au Capitaine Cook ; elle a eu également lieu ſous une très-haute latitude, & elle a été reconnue dans un endroit peu éloigné de celui où M. de l'Angle a trouvé la déclinaiſon de quarante-cinq degrés, la plus grande de toutes celles qui ont été obſervées dans les derniers tems. Néanmoins, dans la même année 1616, la bande ſans déclinaiſon, qui traverſoit l'Europe, & qui s'avançoit toujours vers l'Occident, n'étoit pas encore parvenue au vingt-unième degré de longitude, & dans des points ſitués à l'oueſt de cette bande, comme par exemple à Paris, à Rome, &c. l'aiguille déclinoit vers l'eſt. Et cela provient de ce que les régions ſeptentrionales de l'Amérique n'avoient pas encore éprouvé toutes les révolutions qui y ont établi le pole magnétique que l'on doit y ſuppoſer à préſent.

Quoi qu'il en ſoit, nous ne pouvons pas douter qu'il n'y ait actuellement un pole magnétique dans cette région du nord de l'Amérique, puiſque la déclinaiſon vers l'oueſt eſt plus grande en Angleterre qu'en France, plus grande en France qu'en Allemagne & toujours moindre à meſure qu'on s'éloigne de l'Amérique, en s'avançant vers l'Orient.

Dans l'hémiſphère auſtral, l'aiguille d'inclinaiſon, au rapport du voyageur Noël, ſe tenoit perpendicu-

laire au trente-cinquième ou trente-ſixième degré de latitude, & cette perpendicularité de l'aiguille ſe ſoutenoit dans une longue étendue, ſous différentes longitudes, depuis la mer de la nouvelle Hollande juſqu'à ſept ou huit cens milles du Cap de Bonne-eſpérance *(f)*. Cette obſervation s'accorde avec le fait rapporté par Abel Taſman, dans ſon voyage, en 1642; ce Voyageur dit avoir obſervé, que l'aiguille de ſes bouſſoles horizontales, ne ſe dirigeoit plus vers aucun point fixe, dans la partie de la mer voiſine, à l'occident, de la terre de Diémen; & cela doit arriver en effet lorſqu'on ſe trouve ſur un pole magnétique. En comptant donc ſur cette obſervation du voyageur Noël, on eſt en droit d'en conclure qu'un des poles magnétiques de l'hémiſphère auſtral étoit ſitué, dans ce tems, ſous la latitude de trente-cinq ou trente-ſix degrés, & que quoiqu'il y eût une aſſez grande étendue en longitude, où l'aiguille n'avoit point de direction conſ-

---

(f) Le capitaine Cook dit que l'inclinaiſon de l'aiguille fut de 64 deg. 36 min. les trois différentes fois qu'il relâcha à la nouvelle Zélande, dans une baie ſituée par 41 deg. 5 min. 56 ſec. de latitude, & 172 deg. 0 min. 7 ſec. de longitude. Il me paroît que l'on peut compter ſur cette obſervation de Cook, avec d'autant plus de raiſon qu'elle a été répétée, comme l'on voit par ſon récit, juſqu'à trois fois différentes dans le même lieu, en différentes années. *Voyez le ſecond voyage de Cook, tome 3, page 374.*

tante, on doit ſuppoſer, ſur cette ligne, un eſpace qui ſervoit de centre à ce pole, & dans lequel, comme ſur les parties polaires de la pierre d'Aimant, la force magnétique étoit la plus concentrée; & ce centre étoit probablement l'endroit où Taſman a vu que l'aiguille de ſes bouſſoles horizontales ne pouvoit ſe fixer.

Le pole magnétique, qui ſe trouve dans le nord de l'Amérique, n'eſt pas le ſeul qui ſoit dans notre hémiſphère; le ſavant & ingénieux Halley en comptoit quatre ſur le globe entier, & en plaçoit deux dans l'hémiſphère boréal, & deux dans l'hémiſphère auſtral. Nous croyons devoir en compter également deux dans chaque hémiſphère, ainſi que nous l'avons déjà dit, puiſqu'on y a reconnu trois lignes ou bandes, ſur leſquelles l'aiguille ſe dirige droit au pole terreſtre, ſans aucune déviation.

De la même manière que les poles d'un Aimant ne ſont pas des points mathématiques, & qu'ils occupent quelques lignes d'étendue ſuperficielle, les poles magnétiques du globe terreſtre occupent un aſſez grand eſpace; & en comptant ſur le globe quatre poles magnétiques, il doit ſe trouver un certain nombre de régions, dans leſquelles l'inclinaiſon de l'aiguille ſera très-grande, & de plus de quatre-vingt degrés.

Quoique le globe terreſtre ait en grand les mêmes propriétés que l'Aimant nous offre en petit, ces propriétés ne ſe préſentent pas auſſi évidemment, ni par des effets auſſi conſtans & auſſi réguliers ſur le globe

que ſur la pierre d'Aimant; cette différence entre les effets du magnétiſme général du globe, & du magnétiſme particulier de l'Aimant, peut provenir de plus d'une cauſe. Premièrement, de la figure ſphéroïde de la terre; on a éprouvé, en aimantant de petits globes de fer, qu'il eſt difficile de leur donner des poles bien déterminés; & c'eſt probablement en raiſon de ſa ſphéricité, que les poles magnétiques ne ſont pas auſſi diſtincts ſur le globe terreſtre, qu'ils le ſont ſur des Aimans non ſphériques. Secondement, la poſition de ces poles magnétiques, qui ſont plus ou moins voiſins des vrais poles de la terre, & plus ou moins éloignés de l'équateur, doit influer puiſſamment ſur la déclinaiſon dans chaque lieu particulier, ſuivant ſa ſituation plus ou moins diſtante de ces mêmes poles magnétiques, dont la poſition n'eſt point encore aſſez déterminée.

Le magnétiſme du globe, dont les effets viennent de nous paroître ſi variés, & même ſi ſinguliers, n'eſt donc pas le produit d'une force particulière, mais une modification d'une force plus générale, qui eſt celle de l'électricité, dont la cauſe doit être attribuée aux émanations de la chaleur propre du globe, leſquelles partant de l'équateur & des régions adjacentes, ſe portent, en ſe courbant & ſe plongeant ſur les régions polaires où elles tombent, dans des directions d'autant plus approchantes de la perpendiculaire, que la chaleur eſt

moindre, & que ces émanations ſe trouvent dans les régions froides plus complétement éteintes ou ſupprimées. Or cette augmentation d'inclinaiſon, à meſure que l'on s'avance vers les poles de la terre, repréſente parfaitement l'incidence de plus en plus approchante de la perpendiculaire des rayons ou faiſceaux d'un fluide animé par les émanations de la chaleur du globe, leſquelles, par les loix de l'équilibre, doivent ſe porter en convergeant & s'abaiſſant de l'équateur vers les deux poles.

La force particulière des poles magnétiques, dans l'action qu'ils exercent ſur l'inclinaiſon, eſt aſſez d'accord avec la force générale qui détermine cette inclinaiſon vers les poles terreſtres, puiſque l'une & l'autre de ces forces agiſſent preſqu'également, dans une direction qui tend plus ou moins à la perpendiculaire. Dans la déclinaiſon, au contraire, l'action des poles magnétiques ſe croiſe, & forme un angle avec la direction générale & commune de tout le ſyſtème du magnétiſme vers les poles de la terre. Les élémens de l'inclinaiſon ſont donc plus ſimples que ceux de la déclinaiſon, puiſque celle-ci réſulte de la combinaiſon de deux forces agiſſantes dans deux directions différentes, tandis que l'inclinaiſon dépend principalement d'une cauſe ſimple, dans une direction inclinée & relative à la courbure du globe. C'eſt par cette raiſon que l'inclinaiſon paroît être, & eſt en effet plus ré-

gulière, plus ſuivie & plus conſtante que la déclinaiſon dans toutes les parties de la terre.

On peut donc eſpérer, comme je l'ai dit, qu'en multipliant les obſervations ſur l'inclinaiſon, & déterminant par ce moyen la poſition des lieux, ſoit ſur terre, ſoit ſur mer, l'art de la navigation tirera du recueil de ces obſervations autant & plus d'utilité que de tous les moyens aſtronomiques ou mécaniques employés, juſqu'à ce jour, à la recherche des longitudes.

TABLE

TABLE DES MATIÈRES.

A.

Acides. Le fer dissous par les acides, cesse d'être attirable à l'Aimant, mais il reprend cette propriété lorsqu'on fait exhaler ces acides par le moyen du feu, *page 117.*

Acier. L'acier, qui est le fer le plus épuré, reçoit plus de force magnétique, & la conserve plus longtems que le fer ordinaire, *page 135.*

On peut faire avec l'acier des Aimans artificiels aussi puissans, aussi durables que les meilleurs Aimans naturels, *page 138.*

Un Aimant bien armé donne à l'acier plus de vertu magnétique qu'il n'en a lui même, *Idem.*

Aiguille. L'électricité des nuées a souvent troublé la direction de l'aiguille de la bousole, *page 41.*

Aiguille aimantée. Depuis 1580, la direction de l'aiguille aimantée s'est peu à-peu portée vers l'oueſt, *page 80.* Son mouvement pourroit devenir rétrograde s'il se découvroit de grandes masses ferrugineuses dans le nord de l'Europe & de l'Asie, *Idem.*

Si l'on soutient deux aiguilles aimantées, l'une au-dessus de l'autre, & si on leur communique le plus léger mouvement, elles ne se fixent point dans la direction du méridien magnétique; mais elles s'en éloignent également des deux côtés, l'une à droite & l'autre à gauche, *p. 123.*

Les aiguilles aimantées des bousoles, présentent tous les phénomènes magnétiques d'une manière plus précise, qu'on ne pourroit les reconnoître dans les Aimans mêmes, *page 132.*

L'aiguille aimantée déclinoit à Paris de onze degrés trente minutes vers l'est en 1580; en 1663, elle se dirigeoit droit aux poles, *page 153.* Depuis 1663 elle s'est de plus en plus éloignée de la direction au pole, en déclinant vers l'oueſt, *Idem.*

Aimant. L'Aimant quoiqu'aussi brut qu'aucun autre minéral, semble tenir à la nature active, & sensible des êtres organisés, *page 38.*

L'Aimant primordial n'est qu'une matière ferrugineuse, qui, ayant d'abord subi l'action du feu primitif, s'est ensuite aimantée par l'impression du magnétisme du globe, *page 40.*

Les Aimans s'attirent dans un sens & se repoussent dans le sens opposé; les corps électriques, par eux-mêmes,

s'attirent & ſe repouſſent auſſi dans certaines circonſtances, *page 40.*

On peut diriger ou accumuler ſur un ou pluſieurs points, la force magnétique; on peut de même diriger & condenſer la force électrique, *page 41.*

Aimant employé par M. l'Abbé le Noble, pour la guériſon de pluſieurs maladies, *pages 52 & ſuiv.*

L'Aimant peut être conſidéré comme un corps perpétuellement électrique, *page 64.*

Les mines de l'Aimant primordial, ſont moins fuſibles que les autres mines primitives de fer, *page 84.*

L'Aimant n'eſt qu'un minéral ferrugineux, qui a ſubi l'action du feu, & enſuite a reçu, par l'électricité générale du globe, ſon magnétiſme particulier, *page 84.* L'Aimant primordial eſt une mine de fer en roche vitreuſe, qui a ſubi une plus violente ou plus longue impreſſion du feu primitif que les autres mines de fer, & qui attire les matières ferrugineuſes qui ont ſubi l'action du feu, *page 84.*

Les Aimans de ſeconde formation, ne ſont que des minéraux ferrugineux, provenans des détrimens du fer, en état métallique, & qui ſont devenus magnétiques par la ſeule expoſition, à l'action de l'électricité générale, *page 85.*

Les meilleurs Aimans ſont les plus peſans, *page 86.*

L'Aimant primordial n'a pas acquis au même inſtant ſon attraction & ſa direction, *page 89.*

Il a fallu peut-être le concours de deux circonſtances, pour la production des Aimans primitifs; la première a été la ſituation & l'expoſition conſtante, & la ſeconde une qualité différente dans la matière ferrugineuſe, qui compoſe la ſubſtance de l'Aimant, *page 95.*

En ne jugeant les grandes propriétés de l'Aimant que par les apparences, leurs effets ſembleroient provenir de cauſes différentes, *page 97.*

L'Aimant étoit rare chez les Grecs, *Idem.* Du tems de Pline il étoit devenu plus commun, *Idem.* Les Aimans les plus puiſſans ne ſont pas toujours les plus généreux, *page 102.*

Un Aimant attire le fer de quelque côté qu'on le préſente, au lieu qu'il n'attire un autre Aimant que dans un ſens, & qu'il le repouſſe dans le ſens oppoſé, *page 103.*

Un Aimant exerce ſa force attractive dans tous les points de ſa ſurface, mais fort inégalement, *page 115.* Les corps interpoſés diminuent beaucoup l'intenſité de la force attractive de l'Aimant ſur le fer, lorſqu'ils empêchent leur contact, *page 116.*

Un Aimant agit de plus loin ſur un autre Aimant, ou ſur le fer aimanté, que ſur le fer qui ne l'eſt pas, *page 131.*

Les Aimans ne communiquent pas d'abord autant de force qu'ils en ont, *page 133.*

L'Aimant ou le fer aimanté ne perdent rien de leurs forces magnétiques, quoiqu'ils en communiquent à d'autres fers, *page 134.*

Les Aimans les plus forts communiquent ordinairement plus de vertu que les Aimans plus foibles, *page 135.*

Alpes maritimes (les) ont ſervi de barrière aux feux ſouterrains de la Provence, & les ont, pour ainſi dire, empêchés de ſe joindre à ceux de l'Italie, par la voie la plus courte, *page 19.*

Amérique ſeptentrionale. La marche vers l'oueſt, du mouvement de déclinaiſon de l'aiguille aimantée, ſemble correſpondre avec le défrichement & la dénudation de la terre dans l'Amérique ſeptentrionale, *page 171.*

Anguille de Surinam. On voit paroître des étincelles électriques dans les intervalles que laiſſent les conducteurs métalliques, avec leſquels on touche l'anguille de Surinam, *page 48.*

Archipel. De l'Archipel on peut ſuivre, par la Dalmatie, les volcans éteints juſqu'en Hongrie, *page 22.*

Armure. La poſition de l'armure & la figure de l'Aimant, doivent également influer ſur ſa force, *page 119.* Les pieds de l'armure doivent être placés ſur les poles de la pierre, pour réunir le plus de force, *page 119.*

Attraction. Cette force peut s'exercer en deux ſens oppoſés, en vertu du reſſort qui appartient à toute matière, & dont elle eſt la cauſe, *page 2.* Elle repouſſe autant qu'elle attire, *Idem.* On doit admettre deux effets généraux, l'attraction & l'impulſion qui n'eſt que la répulſion, *page 3.* L'attraction maintient la cohérence & la dureté des corps, *Idem.* Elle produit, comme cauſe générale, tous les phénomènes de l'impulſion, *page 4.*

On doit renoncer à mettre au nombre des ſubſtances matérielles, les forces générales de l'attraction & de l'impulſion primitive, *page 5.*

Les forces d'attraction & d'impulſion ne peuvent s'expliquer ni même ſe concevoir par cette mécanique matérielle, qui rejette ce qui n'eſt apperçu que par l'eſprit, *page 91.*

La plus forte attraction, entre deux Aimans, ſe fait lorſqu'on préſente directement les poles de différens noms; & de même la répulſion eſt la plus forte quand on préſente l'un à l'autre les poles de même nom, *page 101.*

Cette attraction & cette répulſion ne décroiſſent pas autant que la diſtance augmente, *page 101.*

La force attractive de l'Aimant décroît proportionnellement plus dans les grandes que dans les petites diſtances, *page 102.*

Aurores polaires. Les émanations électriques de la chaleur du globe, ſont la vraie cauſe des aurores polaires, *page 8.*

Les aurores polaires influent ſur les variations de l'aiguille aimantée, *page 45.*

B.

Bande ſans déclinaiſon (étendue de la), dans la mer Atlantique, *page 179.* Les bandes ſans déclinaiſon ſe trouvent plus près des côtes orientales des grands continens, que

que des côtes occidentales, *page 180.*

Barre (une) de fer longue & menue rougit au feu, & enſuite plongée perpendiculairement dans l'eau, acquiert en un moment la vertu magnétique, *page 137.*

Barres aimantées (deux) qui ſe touchent, n'attirent pas un morceau de fer avec autant de force que lorſqu'elles ſont à une certaine diſtance l'une de l'autre, *page 119.*

Barres de fer (des) ou d'acier placées dans la direction du grand courant électrique, qui va de l'équateur aux poles, acquièrent, avec le tems, une vertu magnétique, plus ou moins ſenſible, qu'elles n'obtiennent qu'avec peine lorſqu'elles ſont ſituées dans un plan trop éloigné de cette direction, *page 72.*

Baſaltes (les) & les laves contenant une très-grande quantité de matières ferrugineuſes, doivent être regardés comme autant de grands conducteurs de l'électricité, *page 24.*

Les baſaltes peuvent former de véritables maſſes d'Aimant, *page 81.*

Bouſſole. On n'eſt point parvenu à conſtruire des bouſſoles, dont une aiguille indiqueroit le pole terreſtre, *page 124.*

Les François ſont les premiers en Europe qui aient fait uſage de la bouſſole, pour ſe conduire dans leur navigation, *page 152.*

La bouſſole horizontale indique la direction avec ſes déclinaiſons; & la bouſſole verticale démontre l'inclinaiſon de l'aiguille, *page 175.*

C.

Causes locales qui peuvent influer ſur la déclinaiſon, *page 185.*

Centre de gravité. Les aiguilles des bouſſoles verticales, doivent être placées de manière que leur centre de gravité coincide avec leur centre de mouvement, au lieu que dans les bouſſoles horizontales, le centre de mouvement de l'aiguille eſt un peu plus élevé que le centre de gravité, *page 176.*

Chaleur. Les émanations de la chaleur intérieure du globe, s'élèvent perpendiculairement à chaque point de la ſurface de terre, *page 7.* Elles ſont plus abondantes à l'équateur que dans toutes les autres parties du globe, *Idem.* Elles doivent néceſſairement partir de l'équateur où elles abondent, & ſe porter vers les poles où elles manquent, *Idem.* La chaleur obſcure qui émane de la terre, & forme des courans électriques, peut devenir lumineuſe vers les poles, en s'y condenſant dans un moindre eſpace, *Idem.*

Choc (le) & toute violente attrition, entre les corps, produit du feu, *page 6.*

Commotion (la) produite par la torpille, l'anguille de Surinam & le trembleur du Niger, n'eſt point un effet mécanique, *page 49.*

Elle ne peut point être rapportée au ſimple magnétiſme, *Idem.* Elle ne doit pas non plus être regardée comme un phénomène purement électrique, *Idem.*

Conducteurs. Les amas d'eau, les matières métalliques, calcaires, végétales & humides, ſont les plus puiſſans conducteurs du fluide électrique, *page 9.*

Lorſqu'elles ſont iſolées par les matières vitreuſes, elles peuvent être chargées d'un excès plus ou moins conſidérable de ce fluide, *page 9.*

Conducteurs électriques. La foudre, lancée par les conducteurs électriques ſouterrains, eſt aſſez puiſſante pour bouleverſer & même projeter pluſieurs millions de toiſes cubes, *page 14.*

Contact (dans le point de), la force attractive dont l'action eſt très-inégale à toutes les diſtances dans les différens Aimans, produit alors un effet moins inégal dans l'Aimant foible & dans l'Aimant fort, *page 103.*

Cordillières (les montagnes volcaniques des), qui s'élèvent à plus de trois mille toiſes, ont dû être ſoulevées à cette énorme hauteur, par la force des feux ſouterrains, *page 26.*

Courans. Dans tout Aimant, comme dans le globe terreſtre, la force magnétique forme deux courans inégaux, & en ſens contraire, qui partent tous deux de l'équateur en ſe dirigeant aux deux poles, *page 121.*

Courans électriques. La force des courans électriques, qui produiſent les commotions ſouterraines & en ſuivent la direction, ſe manifeſte par la vertu magnétique, que reçoivent des barres de fer ou d'acier, placées dans le même ſens que ce courant paſſager & local, *page 73.* L'action de cette force particulière, eſt quelquefois ſupérieure à celle du courant général de l'électricité, *page 73.*

D.

Déclinaison. Il y a ſur la ſurface du globe, trois eſpaces plus ou moins étendus, dans leſquels l'aiguille aimantée ſe dirige vers le nord, ſans décliner d'aucun côté, *page 69.*

La déclinaiſon de l'Aimant eſt un effet purement accidentel, *page 83.*

La déclinaiſon s'eſt trouvée nulle à Londres, plutôt qu'à Paris, *page 155.* Le mouvement de la ligne ſans déclinaiſon, n'eſt pas relatif aux intervalles des méridiens terreſtres, *page 156.* La marche du mouvement de déclinaiſon, ne paroît pas pouvoir être déterminée, parce que ſa marche eſt plus qu'irrégulière, & n'eſt point du tout proportionnelle au tems, non plus qu'à l'eſpace, *Idem.* Ce mouvement n'eſt point l'effet d'une cauſe conſtante, ou d'une loi de la nature, mais dépend de circonſtances accidentelles, particulières à certains lieux & variables ſelon les tems, *page 157.*

Déclinaiſon de l'aiguille aimantée. L'augmentation de la déclinaiſon vers l'oueſt, n'a été que de deux degrés dix-huit minutes dix-neuf ſecondes, depuis 1775 juſqu'en 1785; ce qui n'excède pas de beaucoup la variation de l'aiguille dans un ſeul jour, qui quelquefois eſt de plus d'un degré & demi, *page 160.*

Il y a plusieurs points sur le globe, où la déclinaison est actuellement nulle ou moindre d'un degré, tant à l'est qu'à l'oueſt; & la suite de ces points, forme des bandes qui se prolongent dans les deux hémisphères, *page 170.*

Les endroits où la déclinaison est la plus grande, se trouvent beaucoup plus près des poles que de l'équateur. Endroits où les plus grandes déclinaisons ont été observées, *pages 181 & 186.*

La déclinaison de l'aiguille paroît varier beaucoup plus dans les hautes que dans les basses latitudes, *page 182.*

Il y a près de deux cens ans que la bande sans déclinaison étoit inclinée du côté de l'oueſt, relativement à l'équateur terrestre, *page 186.*

Déclinaison & inclinaison. Les changemens de la déclinaison & de l'inclinaison, ont toujours été irréguliers dans les divers points des deux hémisphères, *page 184.*

Dimensions. Il faut une certaine proportion dans les dimensions du fer, pour qu'il puisse s'aimanter promptement par la seule action du magnétisme général, *page 125.*

Il faut une certaine proportion dans les dimensions du fer, ou de l'acier que l'on veut aimanter, pour qu'ils reçoivent la plus grande force magnétique qu'ils peuvent comporter, *page 135.*

Direction (la) du magnétisme se combine avec le giſſement des Continens, & se détermine par la position particulière des matières ferrugineuses, *page 62.*

La force magnétique a autant de différentes directions qu'il y a de poles magnétiques sur le globe; au lieu que la direction de l'électricité se porte constamment de l'équateur aux deux poles terrestres, *page 63.*

Direction de l'aiguille. La proximité des terres influe beaucoup sur la direction de l'aiguille aimantée, *page 180.*

Certaines côtes paroissent la repousser, *Idem.* Lorsqu'à l'approche des terres, l'aiguille aimantée éprouve constamment des changemens très-marqués dans sa déclinaison, on peut en conclure l'existence ou le défaut de mines de fer, dans ces mêmes terres, suivant qu'elles attirent ou repoussent l'aiguille aimantée, *Idem.*

Direction de l'Aimant. Les tremblemens de terre, les foudres de l'électricité souterraine, & les grands incendies des forêts, peuvent produire de nouvelles mines attirables à l'Aimant, & qui influent sur sa direction, *page 82.*

Les grandes ou petites aiguilles fortement ou foiblement aimantées, se dirigent toujours vers les poles du globe, soit directement, soit obliquement, en déclinant à l'est ou à l'oueſt, selon les tems & les lieux, *page 151.*

Direction magnétique (la) reçoit des inflexions dépendantes de la position des matières ferrugineuses, *page 36.*

Double contact (méthode du) de MM. Micheli & Canton, *page 140.* De M. Epinus, *Idem.* Deux manières d'employer le double contact, imaginées par M. Epinus, *page 142.*

E.

Eaux. Lorſque les eaux de la mer parviennent dans les foyers des volcans, elles communiquent une grande quantité de fluide électrique aux matières enflammées & électriſées en moins, *pages 11 & 24.*

Effets (tous les) magnétiques ont leurs analogues dans les phénomènes de l'électricité; mais tous les phénomènes électriques n'ont pas de même tous leurs analogues dans les effets magnétiques, *page 64.*

Electricité. L'électricité tire ſon origine de la chaleur intérieure du globe, *page 7.*

L'électricité & le magnétiſme ont des propriétés communes avec celle de l'attraction univerſelle, *page 33.*

Les effets de l'électricité & du magnétiſme ſont produits par des forces impulſives particulières qu'on ne doit point aſſimiler à l'impulſion primitive, *page 34.*

L'action de l'électricité donne également la vertu magnétique aux corps ferrugineux, & la vertu électrique aux ſubſtances électriques par elles-mêmes, *page 42.*

Les chûtes réitérées produiſent également de l'électricité dans les matières électriques par elles-mêmes, & du magnétiſme dans les ſubſtances ferrugineuſes, *page 42.*

Electricité employée pour la guériſon de pluſieurs maux, *page 51.*

L'électricité & le magnétiſme, combinés enſemble dans les torpilles, paroiſſent être plus ou moins actifs, ſuivant l'état de l'atmoſphère, la diverſité des ſaiſons, & les différens états de l'animal, *page 50.*

On doit eſpérer de réunir par l'art l'électricité & le magnétiſme, & de les employer avec ſuccès dans certaines maladies, *page 59.*

Emanations (les) du globe qui produiſent l'électricité & le magnétiſme, s'élèvent à une très-grande hauteur dans les pays chauds, *page 176.*

Equateur. Les foudres ſouterraines ont exercé leur action avec plus de liberté & de puiſſance dans les contrées équatoriales que dans les autres régions, *page 28.*

Equateur magnétique, eſt le point de partage entre les deux directions & inclinaiſons en ſens contraire des particules de la limaille de fer au-deſſus d'un Aimant, *page 177.*

L'équateur magnétique eſt toujours plus près du pole le plus foible, dans les Aimans ainſi que dans le globe terreſtre, *Idem.*

Eruption des volcans, cauſe du changement de déclinaiſon de l'aiguille aimantée, *page 173.*

Etna. Il y a toute raiſon de croire que l'Etna ne s'eſt élevé que par la force des foudres ſouterraines, *p. 25.*

F.

Fer (le) ayant ſpécialement plus d'affinité que les autres matières avec l'électricité du globe & les forces dont elle eſt l'ame, en reſſent & en marque mieux tous les mouve-

mens, *page 35*. S'il n'y avoit point de fer ſur la terre, il n'y auroit ni Aimant, ni magnétiſme, *Idem.*

Une barre de fer peut préſenter une ſuite de poles magnétiques, alternativement oppoſés, de même qu'un tube de verre peut préſenter une ſuite de portions électriſées alternativement, en plus & en moins, *page 43.*

Le fer & l'Aimant ne ſont au fonds que la même ſubſtance, *page 85.*

Le fer, & mieux encore l'acier peuvent recevoir une force magnétique plus grande que celle de la pierre d'Aimant, *page 86.*

Les mines de fer, formées par l'intermède de l'eau, ne reprennent leur propriété magnétique qu'après avoir ſubi l'action du feu, *page 86.*

Dès les premiers tems de l'établiſſement des mines primordiales de fer, toutes les parties de ces maſſes qui étoient expoſées à l'air, & qui ſont demeurées dans la même ſituation, auront reçu la vertu magnétique, par la cauſe générale qui produit le magnétiſme du globe, tandis que toutes les parties de ces mêmes mines, qui n'étoient pas expoſées à l'action de l'atmoſphère, n'ont point acquis cette vertu magnétique, *page 87.*

Le fer reçoit d'abord la force attractive, & ne prend des poles qu'en plus ou moins de tems, ſuivant ſa poſition, & ſelon la proportion de ſes dimenſions, *page 89.*

Il ne prend aucune augmentation de poids, par l'imprégnation de la vertu magnétique, *page 104.*

Quand on paſſe ſur un Aimant foible du fer aimanté par un Aimant fort, ce fer perd la grande force magnétique qui lui avoit été communiquée par l'Aimant fort, & il acquiert en même tems la petite force que peut lui donner l'Aimant foible, *page 108.*

Le fer n'acquiert de lui-même la vertu magnétique, & l'Aimant ne la communique au fer que dans une ſeule & même direction, *page 112.* Un fil de fer aimanté ſelon ſa longueur, & plié enſuite de manière à former des angles & crochets, perd ſa force magnétique, *page 112.* Un fil de fer paſſé par la filière dans le même ſens qu'il a été aimanté, conſerve ſa vertu magnétique, *page 113.*

Un morceau de fer ou d'acier peut être conſidéré comme une maſſe de limaille, dont les parties ſont réunies de plus près, *page 113.* Une lame de fer ou d'acier, paſſée ſur un Aimant pluſieurs fois & dans le même ſens, acquiert toute la vertu magnétique qu'elle peut comporter; mais paſſée enſuite ſur l'Aimant dans le ſens oppoſé, elle perd la vertu qu'elle avoit acquiſe, *page 114.*

Le fer ou l'acier poſés ſur un Aimant acquièrent la vertu magnétique, *page 114.* Le fer ſublimé par le moyen du feu, acquiert du magnétiſme & des poles, *page 119.*

Plus le fer eſt pur, & plus il peut s'aimanter fortement, *page 135.*

Le fer dur, qui comporte plus de vertu

de vertu magnétique que le fer doux, peut en recevoir davantage; mais il la reçoit avec moins de facilité, & peut ſouvent, dans le même tems, avoir acquis moins de force que le fer doux, *page 136.*

Feu (le) ſeul eſt actif, & ſert de baſe & de miniſtre à toute force impulſive, *page 6.* Il ſe manifeſte dans toutes les parties de l'univers, ſoit par la lumière, ſoit par la chaleur, *Idem.*

Le feu violent diminue ou ſuſpend la force magnétique, *page 104.*

Il concourt quelquefois à augmenter la vertu magnétique, *page 106.*

La percuſſion & la flexion ſuſpendent ou détruiſent également la vertu magnétique, parce que ces trois cauſes changent également la poſition reſpective des parties compoſantes de l'Aimant ou du fer, *page 115.* Le feu rend le fer d'autant plus attirable à l'Aimant, que ce dernier a été plus violemment chauffé, *page 118.*

Flamme. La vertu magnétique ſe communique de l'aimant au fer, à travers la flamme, ſans diminution ni changement de direction, *p. 115.*

Fluide électrique (le) agit avec beaucoup de force à l'intérieur du globe; il y fait jaillir dans tous les eſpaces libres des foudres plus ou moins puiſſantes, *page 9.*

Le cours du fluide électrique ſe fait en deux ſens oppoſés, c'eſt-à-dire de l'équateur aux deux poles terreſtres, *page 36.*

Force. Il n'y a dans la Nature qu'une ſeule force primitive; c'eſt l'attraction, *page 1.* Elle a ſuffi pour produire toutes les autres forces qui animent l'univers, *page 2.*

Toute force qui ne tend pas directement du centre à la circonférence, ne peut pas être regardée comme une force intérieure, proportionnelle à la maſſe, *page 119.*

Forces. On ne connoît les forces qui animent l'univers, que par le mouvement & par ſes effets, *p. 4.* Ce mot de *forces* ne ſignifie rien de matériel, & n'indique rien de ce qui peut affecter nos organes, *Idem.* L'origine & l'eſſence de la force primitive, nous ſeront à jamais inconnues, parce que cette force n'eſt pas une ſubſtance, mais une puiſſance qui anime la matière, *page 5.*

Nous ne connoiſſons les forces de la Nature que par leurs effets, *p. 33.*

Force attractive. Rien ne peut intercepter l'action de la force attractive des Aimans, *page 101.* On peut expliquer par-là des effets merveilleux en apparence, *Idem.*

La force attractive de l'Aimant eſt prodigieuſement augmentée, lorſqu'on la réunit avec la force directive, au moyen d'une armure de fer ou d'acier, *page 119.*

Cette plus forte attraction, produite par la réunion des forces attractives & directives de l'Aimant, paroît s'exercer en raiſon des ſurfaces, *page 120.*

Force des Aimans. Pour comparer la force des Aimans, il faut que le fer qu'ils attirent ſoit de même qualité, & que les dimenſions & la figure de chaque morceau de fer ſoient ſemblables & égales, *p. 129.*

Force directive (la) ſe marque

avec plus d'énergie ſur les Aimans nuds, que ſur ceux qui ſont armés, *page 100.*

Force magnétique (la) peut agir ſur le fer ſans être aidée d'aucune force motrice, *page 38.*

Elle n'agit que ſur le fer ; de même la force électrique ne ſe produit que dans certaines matières ; *page 40.*

La force magnétique a différens points de tendance, que l'on peut regarder comme autant de poles magnétiques, *page 67.*

L'effet de la force magnétique eſt un mouvement compoſé, *p. 72.*

La force magnétique eſt extérieure, & pour ainſi dire infinie, relativement aux petites maſſes de l'Aimant & du fer ; elle exiſteroit, quand il n'y auroit point de fer ni d'Aimant dans le monde, *page 134.*

Foudre (la) mettant le feu aux matières combuſtibles renfermées dans le ſein de la terre, peut produire des volcans & d'autres incendies durables, *page 10.* La terre bouleverſée par la foudre ſouterraine, s'eſt ſouvent affaiſſée au-deſſous ou élevée au-deſſus de ſon niveau, *page 15.*

Les foudres & les fortes étincelles électriques rendent aux chaux de fer la propriété d'être attirées par l'Aimant, *page 44.*

Foudres ſouterraines, cauſes du changement de la déclinaiſon de l'aiguille aimantée, *page 173.*

Froid. Lorſqu'on aimante une barre de fer, le degré de force qu'elle acquiert, dépend en grande partie du degré de froid auquel elle eſt expoſée, *page 147.* Le grand froid & la grande chaleur diminuent la vertu magnétique des Aimans, *page 148.*

Frottement. Les quartz, les jaſpes, les feldſpaths, les granits & autres matières vitreuſes ſont électriſables par frottement, *page 9.*

G.

GLOBE TERRESTRE (le) poſsède en grand toutes les propriétés dont les Aimans ne jouiſſent qu'en petit, *p. 36.* La ſurface entière de la terre eſt mêlée d'une grande quantité de fer magnétique qui a produit le magnétiſme général du globe, *Idem.*

Groſſeur des Aimans. Les gros Aimans, même les plus foibles, répandent en proportion leur force à de plus grandes diſtances que les petits Aimans les plus forts, *p. 130.*

H.

HÉMISPHÈRE. L'hémiſphère auſtral étant plus refroidi que le boréal, les émanations de la chaleur qui forment les courans électriques & magnétiques doivent s'y porter en plus grande quantité que dans l'hémiſphère boréal, *page 77.*

Horizon. Tous les fers poſés dans une ſituation perpendiculaire à l'horizon, prennent dans nos climats quelque portion de vertu magnétique, *page 125.*

I.

IMPULSION. Elle tend à défunir & à ſéparer les corps, *page 3.*

L'impulsion est contemporaine de l'attraction, *page 6.*

Incandescence. Des Aimans naturels portés à l'état d'incandescence, refroidis ensuite, & placés entre deux grandes barres d'acier fortement aimantées, acquièrent un magnétisme plus fort; & plus un Aimant est vigoureux, mieux il reçoit & conserve ce surcroît de force, *page 105.*

Des barres de fer en incandescence tenues dans la direction du méridien magnétique, s'aimantent bien plutôt & bien plus fortement que si elles étoient froides, *page 124.*

Incendie des forêts, cause du changement de déclinaison de l'aiguille aimantée, *page 173.*

Inclinaison. L'inclinaison de l'aiguille aimantée démontre que la force magnétique prend à mesure que l'on approche des poles une tendance de plus en plus approchante de la perpendiculaire à la surface du globe, *page 67.* Elle est moins irrégulière que la déclinaison, *page 68.* Elle seroit de quatre-vingt-dix degrés dans les parties polaires, si elle n'étoit pas dérangée par l'action des poles magnétiques, *Idem.*

Les élémens de l'inclinaison sont plus simples que ceux de la déclinaison, *page 191.*

Inclinaison de l'Aimant. Si l'on pose un Aimant sur du mercure dans une situation horizontale, & sous le méridien magnétique, il s'inclinera de manière que le pole austral de cet aimant s'élèvera au-dessus, & que le pole boréal s'abaissera au-dessous de la ligne horizontale dans notre hémisphère boréal, & le contraire arrive dans l'hémisphère austral, *page 175.* L'inclinaison change souvent plus que la déclinaison suivant les lieux, mais elle est plus constante pour les tems, *Id.*

Irritations nerveuses L'Aimant peut calmer les irritations nerveuses, *page 46.*

Italie, est un des plus vastes domaines du feu, *page 20.*

Islande. L'Islande n'est qu'un amas de volcans éteints, ou actuellement agissans, *page 16.*

L.

Laves. Les matières fondues & rejetées par les volcans, soit qu'elles coulent à la surface de la terre, ou qu'elles s'élèvent en colonnes ardentes au-dessus des cratères, attirent le fluide électrique des divers corps qu'elles rencontrent, *page 11.*

Limaille de fer (la) est attirée plus puissamment par l'Aimant, que la poudre même de la pierre d'Aimant, *page 103.*

La limaille de fer comprimée, peut acquérir la vertu magnétique qu'elle perd lorsqu'elle est réduite à l'état pulvérulent, *page 108.*

Chacune des particules de limaille doit être considérée comme une petite aiguille aimantée qui a ses poles, *Idem.* La limaille de fer agitée sur un carton au-dessous d'une pierre d'Aimant, s'arrange de manière à laisser deux vides aux endroits qui correspondent aux deux poles de la pierre... Mais lorsqu'on présente l'Aimant sur la limaille de fer, sans

la ſecouer, ce ſont au contraire les poles de la pierre qui s'en chargent le plus, *page 109.*

Les particules de limaille de fer ſe dreſſent perpendiculairement ſur les deux poles de l'Aimant, & s'inclinent vers ces poles, à meſure qu'elles ſont plus voiſines de l'équateur de ce même Aimant, où elles s'attachent horizontalement, *p. 177.*

M.

Magnétisme. La force de l'électricité ſe modifie pour donner naiſſance à une nouvelle force à laquelle on a donné le nom de magnétiſme, *page 32.* Le magnétiſme, bien moins général que l'électricité, n'agit que ſur les matières ferrugineuſes, & ne ſe montre que par les effets de l'Aimant & du fer, *page 30.*

Le magnétiſme n'eſt qu'une ſimple qualité accidentelle, que le fer acquiert ou qu'il perd ſans aucun changement, & ſans augmentation ni déperdition de ſa ſubſtance, *page 37.*

L'action du magnétiſme & celle de l'électricité, ſont également variables, tantôt en plus, tantôt en moins, & leurs variations dépendent de l'état de l'atmoſphère, *page 39.*

Les effets du magnétiſme ſe manifeſtent, ou du moins peuvent ſe reconnoître dans toutes les parties du globe, *page 71.*

Le mouvement du magnétiſme ſemble être compoſé de deux forces, l'une attractive, & l'autre directive, *page 100.*

Marinette, Nom donné à la bouſſole, *page 152.*

Matière (la) n'a jamais exiſté ſans mouvement, *page 5.*

Matière ferrugineuſe (la) fut frappée la première, & avec le plus de force & de durée par les flammes du feu primitif, *page 35.* Elle dut contracter la plus grande affinité avec l'élément du feu, *Idem.*

Les matières ferrugineuſes réduites en rouille, en ochre, & toutes les diſſolutions du fer par les acides, ne peuvent recevoir la vertu magnétique, ni la vertu électrique, *p. 43.*

Mines d'Aimant (on trouve des) dans preſque toutes les parties du monde, & ſur-tout dans les pays du Nord, *page 97.*

Montagnes (les) volcaniques du Mexique & des autres parties du monde, où l'on trouve des volcans encore agiſſans, ne doivent point être regardées comme des bourſoufflures primitives du globe, *p. 27.*

Montagnes primitives. Les montagnes, dans leſquelles on ne voit aucun indice de volcans, ſont en effet des montagnes primitives, *page 29.*

Monticolli. On nomme ainſi en Italie les collines volcaniques qui entourent le Véſuve, l'Etna, & les autres volcans, tant agiſſans qu'éteints, *page 26.*

Monts Neptuniens (les) en Sicile, comme les Alpes en Provence, ont forcé les feux ſouterrains à ſuivre leurs contours, *page 21.*

Mouvement (le) eſt auſſi ancien que la matière, *page 6.*

Mouvement en déclinaiſon (le) vers l'oueſt paroît s'être ralenti depuis près de vingt ans, *page 161.* Il pourra dans quelque tems devenir

rétrograde, *Idem.* La ſuppoſition que le mouvement de déclinaiſon ſuit la même marche de l'eſt au nord, que du nord à l'oueſt, n'eſt nullement appuyée par les faits, *page 163.* Ce mouvement ne doit pas être regardé comme un grand balancement, qui ſe feroit par des oſcillations régulières, mais comme un mouvement qui s'opère par ſecouſſes plus ou moins ſenſibles, *page 165.*

N.

NOYAU MAGNÉTIQUE, hypothèſe de Halley, *page 184.* Hypothèſe de M. Epinus, *Idem.*

O.

OBSERVATIONS. Utilité des obſervations ſur la déclinaiſon & l'inclinaiſon de l'aiguille aimantée, *page 192.*

Obſervations magnétiques (les) ont été faites en bien plus grand nombre ſur les mers que ſur les Continens, *page 70.*

P.

PERCUSSION (la) ſemble détruire la vertu magnétique dans une barre de fer aimantée, & la produit au contraire dans une barre qui ne poſsède point de magnétiſme, *page 107.*

Pierre d'Aimant. Plus les pierres d'Aimant ſont groſſes, moins elles ont de force attractive, relativement à leur volume : Elles en ont d'autant plus qu'elles ſont plus peſantes, & toutes ont beaucoup moins de puiſſance d'attraction quand elles ſont nues, que quand elles ſont armées de fer ou d'acier, *page 100.*

Poids. Si on enlève à un Aimant des poids qu'on étoit parvenu à lui faire porter, en le chargeant graduellement, il refuſe de les ſoutenir lorſqu'on le lui rend tous à-la-fois, *page 147.*

Poiſſons électriques. L'Aimant leur ôte la faculté d'engourdir, qu'on leur rend en les touchant avec du fer, *page 48.* Ils font varier l'aiguille de la bouſſole, *Idem.*

Poles (les) magnétiques ne ſont pas les mêmes que les poles du globe, *page 88.*

Lorſqu'on préſente un Aimant vigoureux à un Aimant foible, il peut arriver que les poles de même nom s'attirent au lieu de ſe repouſſer ; mais ils ont ceſſé d'être ſemblables lorſqu'ils tendent l'un vers l'autre, *page 110.*

Explication d'un phénomène obſervé par M. Epinus, *Idem.*

Les poles ne ſont pas des points mathématiques, *page 120.*

Les meilleurs Aimans ſont ceux dont les poles ſont les plus décidés, *Idem.* Le pole boréal eſt le plus fort dans les Aimans, tandis que c'eſt au contraire le plus foible ſur le globe terreſtre, *page 122.*

Lorſqu'on diviſe un gros Aimant en pluſieurs parties, chaque fragment a toujours des poles, *page 129.* Ces fragmens, pris ſéparément, porteront beaucoup plus de poids que quand ils étoient réunis en un ſeul bloc, *page 130.*

Pluſieurs poles, ſemblables ou

contraires, imprimés à une barre de fer ou d'acier, *page 144.*

Phénomènes qui prouvent l'attraction mutuelle des poles oppoſés & la répulſion des poles ſemblables, *pages 145 & ſuivantes.*

Expérience du Docteur Knight, rapportée par M. le Comte de Treſſan, *page 148.*

Poles magnétiques. Il doit y avoir deux poles magnétiques dans chaque hémiſphère, *page 69.* Les poles magnétiques boréaux du globe ſont moins puiſſans que les poles magnétiques auſtraux, *p. 77.* Dans les Aimans, au contraire, tant naturels qu'artificiels, le pole boréal eſt le plus fort, *Idem.* Voilà pourquoi le pole nord aimantée ſe dirige toujours vers le pole boréal du globe dans les deux hémiſphères, tandis que l'aiguille qui marque l'inclinaiſon de l'Aimant s'incline vers le nord dans l'hémiſphère boréal, & vers le ſud dans l'hémiſphère auſtral, *page 78.*

La ſituation des poles magnétiques change, tant par les travaux de l'homme que par les grands mouvemens de la Nature dans les tremblemens de terre & dans la production des laves qui ſont toutes magnétiques, *page 79.*

L'exiſtence d'un pole magnétique dans le nord de l'Amérique eſt prouvée par les obſervations, *p. 81.*

Il doit ſe former, par pluſieurs cauſes accidentelles, de nouveaux poles magnétiques, plus foibles ou plus puiſſans que les anciens, dont on peut ſuppoſer l'anéantiſſement par les mêmes cauſes, *page 164.*

Les lieux où l'inclinaiſon de l'aiguille ſera de quatre-vingt-dix degrés, ſeront les vrais poles magnétiques ſur la terre, *page 178.*

Le pole magnétique eſt éloigné vers l'eſt du pole de la terre, relativement aux mers des Indes & Pacifique, *Idem.*

Vers 1642, un des poles magnétiques de l'hémiſphère auſtral pouvoit être ſitué ſous la latitude de trente-cinq ou trente-ſix degrés, *page 188.*

Les poles magnétiques du globe terreſtre, occupent un aſſez grand eſpace, *page 189.*

Progreſſion de l'aiguille aimantée. On ne peut pas conclure affirmativement que la progreſſion actuelle de l'aiguille vers l'oueſt, ſoit très-conſidérable; il ſe pourroit, au contraire, que l'aiguille fût preſque ſtationnaire depuis quelques années, *page 160.*

R.

RÉPULSION (la) dans l'Aimant, n'eſt que l'effet d'une attraction en ſens contraire, *page 121.*

Révolution du mouvement de déclinaiſon. On ne peut pas la ſuppoſer entière, c'eſt-à-dire de 360 degrés, *page 161.*

S.

SANTORIN (les Iſles de) ſe ſont abîmées dans la mer, & élevées au-deſſus de la terre à pluſieurs repriſes, *page 25.*

Suſpenſion (nouvelle) des aiguilles aimantées, imaginées par M. Coulomb, *page 166.*

T.

Terrains volcanisés. Les Isles de Portland, de Stromo, de Féroé, de Schetland, & les Isles Orcades sont toutes volcaniques, *p. 16.*

On voit des Indices de terrains volcanisés jusque dans la Bourgogne, *page 18.*

Torpille, (la) l'anguille électrique de Surinam, & le trembleur du Niger, semblent réunir & concentrer dans une même faculté la force de l'électricité, & celle du magnétisme, *page 47.*

S'il existoit des corps aussi électriques que la torpille, & en assez grande quantité pour former de grandes masses aussi considérables que celles des mines de fer en différens endroits du globe, il est plus que probable que le cours de l'électricité général se fléchiroit vers ces masses électriques, *page 79.*

Tourbillons, imaginés par plusieurs Physiciens pour expliquer les phénomènes de l'Aimant, *page 89.* Hypothèse de Descartes à ce sujet, *page 90.*

La force magnétique ne se meut pas en tourbillon autour du globe terrestre, non plus qu'autour de l'Aimant, *page 93.*

Tourmaline. La plupart des schorls, & particulièrement la tourmaline, présentent des phénomènes électriques, qui ont la plus grande analogie avec ceux de l'Aimant, *page 44.*

Tras. C'est auprès d'Andernach que les Hollandois font leur approvisionnement de *tras*, qui n'est qu'un basalte facile à broyer, *p. 22.*

Tremblement de terre. C'est au fluide électrique, qui peut parcourir en un instant l'espace le plus étendu, que l'on doit rapporter les tremblemens de terre qui se font sentir presque dans le même moment, à de très-grandes distances, *page 13.*

On a vu souvent l'aiguille aimantée soumise à de grandes irrégularités dans ses variations, après les tremblemens de terre, *page 173.*

Trépidations. L'inclinaison & la déclinaison sont sujettes à des trépidations presque continuelles, *p. 176.*

V.

Variations dans la direction de l'aimant. Les unes s'opèrent par des oscillations momentanées & passagères, produites par les différens états de l'air, &c. Les autres dépendent de causes plus constantes, quoiqu'également accidentelles *page 66.* Les grandes variations du magnétisme ont une marche progressive du nord à l'est, ou à l'oueſt dans certaines périodes de tems, *page 67.*

Vents (les) souterrains peuvent électriser les substances conductrices, *page 10.*

Vertu magnétique. Il suffit de changer la situation respective des parties constituantes d'une masse ferrugineuse, pour faire évanouir la vertu magnétique, *page 108.*

On peut sans aimant ni fer aimanté exciter dans le fer la vertu magnétique à un très-haut degré, *page 139.*

Vibrations. L'aiguille aimantée eſt preſque toujours agitée par de petites vibrations, dont l'étendue eſt au moins auſſi variable que la durée, *page 165.* Imperfection des obſervations faites juſqu'à préſent relativement à ces vibrations, ainſi qu'à la déclinaiſon de l'aiguille, *pages 165 & ſuivantes.*

Volcan (les) éteints ou actuellement agiſſans forment de larges bandes, qui s'étendent autour du globe dans pluſieurs directions, *page 14.*

Auprès d'Edimbourg, les volcans ſemblent avoir trouvé des bornes qui les ont empêchés d'entrer dans l'Angleterre proprement dite, *p. 17.*

Les volcans des environs de Naples, & de la terre de Labour, comme tous les autres volcans, ſemblent éviter les montagnes primitives, quartzeuſes & granitiques, qui ſont, par leur nature vitreuſe, imperméables au fluide électrique, *pages 21 & 23.*

Les volcans, & ſur-tout ceux qui ſont actuellement agiſſans, portent ſur des cavités dont la capacité eſt au moins égale au volume de leurs projections, *page 24.*

Les premiers & plus anciens volcans n'ont été, pour ainſi dire, que des exploſions momentanées, *page 29.* On doit diſtinguer deux ſortes de volcans; les premiers produits par l'électricité ſouterraine, & les ſeconds alimentés par les ſubſtances combuſtibles, *page 30.* Les premiers volcans ont laiſſé des cratères, autour deſquels ſe trouvent des matières fondues par les foudres, *page 31.*

Parmi les cauſes accidentelles, les plus puiſſantes pour changer la direction de l'Aimant, ſont l'éruption des volcans, & les torrens de laves & de baſaltes qui occupent ſouvent de très-grandes étendues à la ſurface de la terre, *page 81.*

Volcans éteints. On peut reconnoître des volcans éteints en Bretagne, & les ſuivre dans une partie du Limouſin, & en Auvergne, où ſe ſont faites de fortes éruptions, *p. 17.* La plupart des volcans éteints n'ont pu être produits que par les foudres de l'électricité ſouterraine, *page 23.* Tous les volcans produits par les tonnerres ſouterrains, n'ont exercé leur action que ſur les ſchiſtes, les argiles, les ſubſtances calcaires & métalliques, & les autres matières de ſeconde formation, & conductrices de l'électricité, *page 23.*

Divers degrés de conſervation de leurs cratères, *page 27.*

La plupart des volcans éteints doivent être rapportés aux premières époques des révolutions du globe après ſa conſolidation, pendant leſquelles ils n'ont agi que par momens, *page 31.*

Z.

Zone (la) incendiée par les feux ſouterrains, a pris une double direction en partant d'Antibes, *page 19.*

Zone torride. Le fer tenu verticalement acquiert plus promptement & en plus grande meſure la vertu magnétique dans les zones tempérées & froides, que dans la zone torride, *page 126.*

Fin de la Table.

TABLES

TABLES

Contenant les Observations qui ont été faites, dans ces derniers tems, sur la Déclinaiſon de l'Aiguille aimantée.

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER ATLANTIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Nota. Les Longitudes ſont indiquées, dans ces Tables, d'après le Méridien de Paris, depuis 0 juſqu'à 360 degrés.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
28 Avril 1769.....	0	0	0	14	45	0	309	55	0
Gérard de Brahm.									
.....	0	0	0	35	30	0	282	35	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	0	15	0	27	37	0	295	47	0
.....	0	45	0	14	31	0	307	9	0
Gérard de Brahm.									
27 Juillet 1771.....	0	45	0	34	38	0	283	38	0
26 Juillet.....	1	30	0	33	25	0	282	11	13
.....	1	30	0	33	30	0	280	5	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	1	30	0	27	16	0	295	36	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Gérard de Brahm.									
26 Juillet 1771.....	1	35	0	30	30	0	274	55	40
.....	2	0	0	28	40	0	275	55	0
.....	2	0	0	27	40	0	276	35	0
De Fleurieu.									
24 Juin 1769.....	2	0	0	32	15	0	286	43	0
2 Mai.....	2	23	0	14	51	0	299	38	0
19 Avril.....	2	24	0	14	22	0	306	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	2	30	0	14	27	0	303	44	0
Gérard de Brahm.									
.....	2	42	0	32	40	0	276	52	17
25 Juillet 1771.....	2	50	0	32	30	0	281	3	9
De Fleurieu.									
23 Juin 1769.....	2	52	0	30	48	0	286	5	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	3	0	0	14	22	0	299	18	0
.....	3	15	0	21	54	0	295	16	0
De Fleurieu.									
22 Juin 1769.....	3	27	0	27	47	0	286	29	0
3 Mai.....	3	29	0	14	39	0	297	28	0
A bord de l'Ecureuil...	3	30	0	20	16	0	295	19	0
De Fleurieu.									
20 Juin.....	3	54	0	23	53	0	287	13	0
Gérard de Brahm....	4	0	0	27	20	0	276	35	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	4	45	0	18	54	0	295	11	0
De Fleurieu.									
22 Mai.....	5	10	0	20	0	0	285	42	0
Gérard de Brahm.									
.....	5	24	52	26	50	0	276	35	0
.....	5	59	0	29	40	0	275	15	0
Au Cap Florida.....	6	0	0	25	42	42	276	34	0
.....	6	25	0	24	25	0	274	41	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Chappe.									
(A Véra-Crux).....	6	28	0	19	10	0	276	22	0
15 Mars 1769.									
Gérard de Brahm.									
.....	6	47	0	30	10	0	275	5	0
De Fleurieu.	Déclinaison Ouest.								
28 Avril 1769.....	0	0	0	14	45	0	309	55	0
Gérard de Brahm.									
28 Juillet 1771.....	0	0	0	35	38	0	284	51	24
De Fleurieu.									
28 Avril 1769.....	0	21	0	14	44	0	309	25	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	0	30	0	29	9	0	297	24	0
De Fleurieu.									
27 Avril 1769.....	0	42	0	14	42	0	310	40	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	0	50	0	14	40	0	309	15	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	1	15	0	30	32	0	298	57	0
Chappe.									
23 Janvier 1769.....	1	15	0	18	4	0	315	17	0
De Fleurieu.									
26 Avril 1769.....	1	15	0	14	45	0	313	49	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	1	30	0	15	11	0	311	38	0
De Fleurieu.									
25 Avril 1769.....	1	58	0	14	47	0	316	3	0
27 Juin.....	2	0	0	34	6	0	289	54	0
18 Avril.....	2	15	0	14	48	0	317	20	0
Chappe.									
1 Février 1769.....	2	31	0	15	12	0	302	22	0
Gérard de Brahm.									
29 Juillet 1771.....	3	0	0	37	6	0	286	39	11

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
30 Juillet.....	3	0	0	37	44	0	287	27	28
.....	3	0	0	37	7	0	284	35	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	3	0	0	18	7	0	322	50	0
Cook et Bayli.									
30 Août 1776.....	3	17	10	1	14	0	331	33	0
.....	3	19	40	1	14	0	331	33	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	3	30	0	13	25	0	223	56	0
.....	3	30	0	1	58	0	331	59	0
De Fleurieu.									
29 Juin 1769.....	3	37	0	36	34	0	293	55	0
Cook.									
30 Août 1776.....	3	53	0	0	51	0	330	25	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	4	0	0	31	58	0	302	3	0
Chappe.									
8 Février 1769.....	4	7	0	14	53	0	295	10	0
2 Février.....	4	20	0	15	12	0	300	35	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	4	25	0	0	7	0	330	35	0
Wallis.									
11 Avril 1768.....	4	30	0	21	28	0	320	58	0
Carteret.									
15 Février 1769.....	4	35	0	6	28	0	324	55	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	4	42	0	0	57	0	330	35	0
.....	4	45	0	0	7	0	330	35	0
Chevalier de l'Angle.									
En Août 1782.....	4	45	0	57	30	0	285	20	0
Wallis.									
8 Avril 1768.....	4	48	0	15	4	0	323	5	0
Cook.									
31 Août 1776.....	4	49	0	0	7	0	330	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	4	50	0	14	54	0	331	20	0
Cook.									
31 Août 1776.....	4	52	0	0	51	0	330	25	0
De Fleurieu.									
30 Juin 1769.....	4	53	0	37	27	0	293	46	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	4	53	0	0	7	0	330	35	0
30 Août.....	4	56	40	1	14	0	331	33	0
31 Août.....	4	59	0	0	51	0	330	25	0
Gérard de Brahm.									
.. ..	5	0	0	38	30	0	286	5	0
31 Juillet 1771.....	5	0	0	38	36	0	288	32	9
1 Août.....	5	0	0	38	34	0	289	36	1
2 Août.....	5	0	0	38	34	0	291	15	44
4 Août.....	5	0	0	38	48	0	294	46	31
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	5	0	0	4	23	0	333	6	0
.....	5	0	0	2	10	0	331	30	0
.....	5	0	0	22	41	0	321	38	0
Cook.									
30 Août 1776.....	5	0	31	1	14	0	331	33	0
3 Août.....	5	5	0	0	51	0	330	25	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	5	15	0	34	33	0	305	9	0
Cook.									
31 Août 1776.....	5	15	30	0	51	0	330	25	0
Cook et Bayli.									
30 Août.....	5	21	20	1	14	0	331	33	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	5	30	0	26	5	0	320	56	0
Cook.									
31 Août 1776.....	5	34	40	1	14	0	331	33	0
.....	5	35	0	0	7	0	330	35	0
30 Août.....	5	35	10	1	14	0	331	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
10 Octobre 1766.....	5	36	0	6	34	0	335	54	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	5	45	0	18	52	0	317	2	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	45	0	19	16	0	329	37	0
Cook et Bayli.									
30 Août 1776.....	5	46	50	1	14	0	331	33	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	50	0	17	8	0	330	18	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	5	54	0	0	51	0	330	25	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	55	0	13	10	0	332	2	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	5	56	0	0	51	0	330	25	0
Carteret.									
26 Février 1769.....	6	0	0	23	54	0	329	20	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	0	0	24	13	0	329	19	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	6	0	0	36	15	0	307	18	0
Bayli.									
30 Juin 1780.....	6	8	0	19	44	0	329	55	0
Carteret.									
16 Février 1769.....	6	9	0	8	3	0	333	17	0
Cook.									
30 Août 1776.....	6	10	0	2	5	0	332	5	0
Carteret.									
21 Février 1769.....	6	12	0	14	39	0	331	20	0
Cook.									
30 Août 1776.....	6	12	40	1	14	0	331	33	0
Bayli.									
1 Juillet 1780.....	6	19	0	21	4	0	319	20	0
12 Juin.....	6	21	0	3	31	0	331	19	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
30 Août 1776.....	6	24	0	2	5	0	332	5	0
Cook.									
30 Août 1776.....	6	33	45	2	5	0	332	5	0
Carteret.									
11 Octobre 1766.....	6	40	0	6	41	0	336	0	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	6	41	0	0	51	0	330	25	0
30 Août.....	6	45	0	2	5	0	332	5	0
Carteret.									
19 Février 1769.....	6	48	0	12	6	0	333	1	0
Cook et Bayli.									
29 Août 1776.....	6	49	0	2	17	0	332	45	0
30 Août.....	6	56	0	2	5	0	332	5	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	7	0	0	28	10	0	330	30	0
Carteret.									
10 Février 1769.....	7	2	0	2	39	0	328	37	0
Bayli.									
27 Juin 1780.....	7	8	0	15	11	0	323	35	0
20 Juin.....	7	10	0	9	4	0	330	5	0
13 Juin.....	7	18	0	4	12	0	331	35	0
8 Juillet.....	7	18	0	29	24	0	315	55	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	7	30	0	26	5	0	320	56	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	7	30	0	21	46	0	317	48	0
Cook.									
29 Août 1776.....	7	38	0	2	28	30	332	59	0
.....	7	42	0	2	40	0	333	25	0
Bayli.									
4 Juillet 1780.....	7	55	0	25	18	0	317	21	0
19 Août 1776.....	7	56	30	2	40	0	333	25	0
Cook.									
5 Juin 1780	7	58	30	5	10	0	331	55	0
27 Août.....	7	58	30	3	30	0	334	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
25 Juin 1780.....	7	9	0	12	41	0	325	49	0
Carteret.									
En Septembre 1766....	8	0	0	15	0	0	334	35	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	0	0	3	0	0	338	58	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	8	0	0	9	22	0	334	51	0
.....	8	0	0	11	6	0	334	57	0
Cook et Bayli.									
26 Août 1776.....	8	2	0	3	59	0	335	9	0
Bayli.									
22 Juin 1780.....	8	5	0	9	37	0	328	49	0
6 Juillet.....	8	5	0	27	48	0	316	33	0
Cook et Bayli.									
26 Août 1776.....	8	5	0	3	45	0	335	1	0
29 Août.....	8	7	0	2	40	0	334	25	0
Cook.									
15 Août 1776.....	8	9	27	11	51	0	333	30	0
26 Août	8	13	0	3	37	0	334	15	0
.....	8	15	0	3	45	0	335	1	0
Bayli.									
15 Juin 1780.....	8	15	0	5	11	0	331	9	0
25 Août 1776.....	8	15	0	4	23	0	336	33	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	15	0	1	45	0	339	0	0
Carteret.									
22 Septembre 1766....	8	20	0	16	34	0	335	6	0
Wallis.									
24 Septembre 1766....	8	20	0	14	53	0	333	45	0
Cook.									
25 Août 1776.....	8	20	28	4	23	0	336	33	0
Carteret.									
8 Novembre 1769.....	8	25	0	1	56	0	337	19	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
26 Août 1776.....	8	27	0	3	45	0	335	1	0
Chappe.									
13 Janvier 1769.....	8	27	0	23	12	0	330	0	0
Cook et Bayli.									
27 Août 1776.....	8	28	20	3	37	0	334	15	0
Gérard de Brahm.									
3 Août 1771.....	8	30	0	39	8	0	293	9	34
5 Août.....	8	30	0	39	36	0	296	13	51
6 Août.....	8	30	0	39	37	0	297	22	35
7 Août.....	8	30	0	40	14	0	298	59	32
.....	8	30	0	39	0	0	290	53	0
Cook et Bayli.									
26 Août.....	8	30	0	3	59	0	332	9	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	8	30	0	23	24	0	324	11	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	8	30	0	13	31	0	334	55	0
Cook.									
27 Août 1776.....	8	30	0	3	59	0	335	9	0
.....	8	30	15	3	37	0	334	15	0
.....	8	31	0	3	59	0	335	9	0
.....	8	34	0	3	37	0	334	15	0
26 Août 1776.....	8	35	0	3	59	0	335	9	0
.....	8	36	0	3	45	0	335	1	0
Carteret.									
8 Novembre 1769.....	8	37	0	3	45	0	338	11	0
Cook et Bayli.									
8 Octobre 1768.....	8	39	0	7	58	0	335	22	0
27 Août 1776.....	8	40	40	3	37	0	334	15	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	45	0	27	18	0	327	12	0
Cook et Bayli.									
18 Juin 1780.....	8	51	0	7	19	0	329	45	0
26 Août 1776.....	8	52	0	3	45	0	335	1	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Gérard de Brahm.									
8 Août 1771.....	8	52	0	40	43	0	300	46	52
Cook et Bayli.									
26 Août 1776.....	8	58	0	3	45	0	335	1	0
Gérard de Brahm.									
9 Août 1771.....	9	0	0	41	13	0	302	29	35
10 Août.....	9	0	0	41	27	0	304	30	13
11 Août.....	9	0	0	41	27	0	305	20	53
.....	9	0	0	41	0	0	300	35	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	9	0	0	15	33	0	334	39	0
Rosnevet.									
En 1773.....	9	0	0	0	13	0	338	59	0
Cook et Bayli.									
25 Août 1776.....	9	1	45	4	23	0	336	33	0
26 Août.....	9	2	0	3	45	0	335	1	0
25 Août.....	9	2	17	4	23	0	336	33	0
Cook.									
25 Août 1776.....	9	5	8	4	23	0	336	33	0
26 Août.....	9	10	0	3	59	0	335	9	0
Bayli.									
10 Juillet 1780.....	9	11	0	30	28	0	315	39	0
27 Août 1776.....	9	13	15	3	37	0	334	15	0
11 Août.....	9	15	0	15	25	0	333	59	0
25 Août.....	9	15	30	4	23	0	336	33	0
13 Août.....	9	16	0	12	21	0	333	41	0
.....	9	16	20	12	22	0	333	50	0
Cook.									
18 Août 1776.....	9	17	33	8	55	0	334	45	0
.....	9	25	40	8	55	0	334	45	0
Bayli.									
29 Août.....	9	26	0	12	8	0	333	45	0
Cook.									
13 Août 1776.....	9	28	0	13	32	0	333	50	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	9	30	0	13	31	0	334	55	0
Cook.									
13 Août 1776.....	9	31	0	13	32	0	333	50	0
21 Août.....	9	31	15	6	33	0	338	33	0
Phipps.									
29 Juin 1773.....	9	34	0	78	2	0	5	25	0
Cook.									
4 Août 1776.....	9	35	23	12	21	30	333	45	30
Cook et Bayli.									
14 Août 1776.....	9	39	0	8	55	0	334	45	0
18 Août.....	9	43	0	12	22	0	333	50	0
14 Août.....	9	44	0	6	29	0	337	30	0
22 Août.....	9	48	0	12	21	0	333	41	0
14 Août.....	9	50	0	15	25	0	333	59	0
11 Août.....	9	51	40	6	9	0	338	25	0
22 Août.....	9	52	0	15	25	0	333	59	0
21 Août.....	9	52	5	8	55	0	334	45	0
14 Août.....	9	52	40	12	22	0	333	50	0
21 Août.....	9	53	20	8	55	0	334	45	0
11 Août.....	9	54	0	15	25	0	333	59	0
21 Août.....	9	55	10	8	55	0	334	45	0
18 Août.....	9	56	0	8	55	0	334	45	0
Gérard de Brahm.									
15 Août 1771.....	10	0	0	41	37	0	311	0	53
.....	10	0	0	42	0	0	304	5	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	10	0	0	24	25	0	325	33	0
.....	10	0	0	37	58	0	317	8	0
Chevalier de l'Angle.									
7 Août 1782.....	10	0	0	59	48	0	A la vue du Cap Churchil.		
Bayli.									
14 Juillet 1780.....	10	1	0	35	25	0	315	59	0
Cook.									
6 Juillet 1780.....	10	5	6	27	48	0	316	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Phipps.									
29 Juin 1773.....	10	10	0	78	2	0	5	25	0
Cook et Bayli.									
11 Août 1776.....	10	11	0	15	25	0	333	59	0
10 Août.....	10	12	0	19	35	0	336	56	0
Bayli.									
12 Juillet 1780.....	10	16	0	36	15	0	315	35	0
Cook.									
22 Août 1776.....	10	19	6	6	9	0	338	25	0
21 Août.....	10	19	19	6	33	0	338	33	0
Rosnevet.									
En 1773.....	10	25	0	5	27	0	339	59	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	10	30	0	23	45	0	336	45	0
Chevalier de l'Angle.									
8 Août 1782.....	10	30	0	59	13	0	A la vue du Cap Churchil.		
Cook.									
10 Août 1776.....	10	33	0	16	37	0	334	45	0
1 Octobre 1768.....	10	37	0	14	6	0	335	25	0
11 Août 1776.....	10	38	22	15	25	0	333	59	0
10 Août.....	10	47	20	16	37	0	334	45	0
De Fleurieu.									
3 Avril 1769.....	10	55	0	17	33	0	339	45	0
Gérard de Brahm.									
16 Août 1771.....	11	0	0	42	22	0	313	23	54
.....	11	0	0	42	20	0	311	5	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	11	0	0	30	14	0	337	3	0
Rosnevet.									
En 1773.....	11	0	0	4	30	0	340	36	0
.....	11	0	0	10	13	0	336	47	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	11	0	0	25	48	0	327	33	0
Cook et Bayli.									
11 Août 1776.....	11	1	0	15	42	0	334	13	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
16 Juillet 1780.....	11	10	0	36	5	0	316	35	0
Cook.									
22 Août 1776.....	11	13	7	6	29	0	337	30	0
Carteret.									
21 Septembre 1766....	11	14	0	17	19	0	335	16	0
Rosnevet.									
En 1773.....	11	15	0	3	45	0	340	35	0
Chappe.									
29 Décembre 1768....	11	20	0	31	56	0	344	0	0
Cook et Bayli.									
21 Août 1776.....	11	24	40	8	55	0	334	45	0
Bougainville.									
En 1766.....	11	30	0	33	46	0	333	10	0
Wallis.									
21 Avril 1768.....	11	34	0	33	55	0	325	35	0
Cook et Bayli.									
10 Août 1776.....	11	37	0	16	37	0	334	45	0
Bayli.									
25 Août 1776.....	11	40	0	17	48	0	333	29	0
22 Août.....	11	42	0	6	29	0	337	30	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	11	45	0	31	13	0	336	30	0
Phipps.									
28 Juin 1773.....	11	56	0	80	30	0	12	49	0
Cook.									
22 Août 1776.....	11	57	0	6	29	0	337	30	0
Gérard de Brahm.									
17 Août 1771.....	12	0	0	43	45	0	316	2	47
.....	12	0	0	43	40	0	314	25	0
De Fleurieu.									
10 Avril 1769.....	12	0	0	14	26	0	337	35	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	12	0	0	32	24	0	335	31	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
22 Août 1776.....	12	12	0	6	29	0	337	30	0
De Fleurieu.									
A l'Isle de Gorée, 4 Avril 1769.....	12	15	0	14	40	0	340	11	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	12	15	0	31	12	0	335	48	0
Phipps.									
29 Juin 1773.....	12	16	0	78	2	0	5	25	0
31 Juillet.....	12	24	0	79	44	0	7	26	0
Cook et Bayli.									
18 Août 1776.....	12	24	20	8	55	0	334	45	0
11 Août.....	12	25	0	15	42	0	334	13	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	12	30	0	31	10	0	335	9	0
Bougainville.									
En 1766.....	12	30	0	35	46	0	335	22	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	12	30	0	27	30	0	329	38	0
Cook et Bayli.									
22 Août 1776.....	12	33	0	6	29	0	337	30	0
Phipps.									
29 Juin 1773.....	12	36	0	78	2	0	5	25	0
Cook.									
11 Août 1776.....	12	39	0	15	42	0	334	13	0
Phipps.									
26 Juillet 1773.....	12	47	0	80	18	0	9	47	0
Gérard de Brahm.									
18 Août 1771.....	13	0	0	44	30	0	319	30	38
19 Août.....	13	0	0	44	52	0	321	47	46
,,,

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Chappe.									
31 Décembre 1768....	13	0	0	30	12	0	344	14	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	13	0	0	26	12	0	337	25	0
.....	13	0	0	24	25	0	337	34	0
Cook.									
8 Août 1776.....	13	11	0	19	45	0	326	56	0
.....	13	14	0	19	46	0	337	32	0
Bougainville.									
En 1766.....	13	15	0	36	7	0	338	14	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	13	15	0	39	18	0	318	29	0
De Fleurieu.									
21 Juillet 1769.....	13	19	0	38	20	0	329	22	0
Bayli.									
16 Septembre 1776....	13	19	0	0	22	0	343	15	0
Cook.									
8 Août 1776.....	13	20	20	19	42	0	336	56	0
Bayli.									
8 Septembre 1776.....	13	21	0	4	17	0	343	45	0
Carteret.									
3 Mars 1769.....	13	26	0	32	33	0	334	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	13	30	0	28	50	0	331	55	0
Cook.									
8 Août 1776.....	13	36	0	19	35	0	336	56	0
Carteret.									
Entre les Isles de Tercere & Saint - Michel. 4 Mars 1769.....	13	43	0	34	2	0	335	3	0
Cook et Bayli.									
8 Août 1776.....	13	52	0	20	30	0	337	32	0
3 Août.....	14	0	0	28	30	0	340	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Gérard de Brahm.									
22 Août 1771.....	14	0	0	45	34	0	326	51	0
.....	14	0	0	45	30	0	327	35	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	14	0	0	30	37	0	334	11	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	14	0	0	33	56	0	336	34	0
Chappe.									
5 Janvier 1769.....	14	7	0	27	46	0	342	54	0
Wallis.									
8 Septembre 1776.....	14	10	0	32	35	0	340	55	0
Chappe.									
7 Janvier 1766.....	14	13	0	27	27	0	342	13	0
Cook.									
8 Août 1776.....	14	19	0	20	30	0	337	32	0
Wallis.									
3 Août 1766.....	14	23	0	28	30	0	340	35	0
De Fleurieu.									
28 Août 1769.....	14	23	0	31	41	0	340	21	0
Chappe.									
1 Janvier 1769.....	14	25	0	29	29	0	343	22	0
Cook.									
8 Août 1776.....	14	30	0	20	30	0	337	32	0
Wallis.									
23 Avril 1768.....	14	30	0	36	15	0	329	4	0
Cook.									
8 Août 1776.....	14	35	0	20	30	0	337	32	0
De Fleurieu.									
8 Août 1769.....	14	38	0	34	55	0	337	43	0
Cook.									
3 Août 1776.....	14	41	20	28	30	0	340	35	0
Carteret.									
5 Mars 1769.....	14	53	0	35	30	0	335	39	0
Phipps.									
2 Juillet 1773.....	14	55	0	78	22	0	6	43	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
6 Mars 1769.....	14	58	0	36	46	0	336	12	0
De Fleurieu.									
12 Août 1769.....	15	0	0	32	33	0	340	24	0
Gérard de Brahm.									
23 Août 1771.....	15	0	0	46	28	0	328	10	51
.....	15	0	0	46	28	0	324	45	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	15	0	0	32	38	0	336	15	0
.....	15	0	0	35	42	0	341	2	0
.....	15	0	0	40	27	0	314	26	0
Cook et Bayli.									
6 Août 1776.....	15	4	0	23	54	0	339	15	0
Carteret									
6 Mars 1769.....	15	6	30	36	46	0	336	12	0
Bayli.									
23 Juillet 1780.....	15	7	0	38	41	0	320	19	0
21 Juillet.....	15	9	0	38	10	0	320	15	0
22 Juillet.....	15	11	0	38	25	0	320	16	0
Cook.									
6 Août 1776.....	15	12	0	23	54	0	339	15	0
Carteret.									
6 Mars 1769.....	15	15	0	36	46	0	336	22	0
Cook.									
6 Août 1776.....	15	20	0	23	54	0	339	15	0
De Fleurieu.									
1 Septembre 1768.....	15	28	0	31	7	0	344	53	0
Cook.									
En Septembre 1768....	15	30	0	32	33	0	340	46	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	16	30	0	28	50	0	331	55	0
De Fleurieu.									
18 Juillet 1769.....	15	36	0	39	25	0	326	11	0
7 Septembre.....	15	36	0	33	40	0	345	50	0
12 Juillet.....	15	43	0	28	33	0	341	29	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
4 Septembre.....	15	56	0	32	43	0	340	52	0
Chappe.									
8 Janvier 1769.....	15	57	0	26	26	0	339	0	0
Gérard de Brahm.									
24 Août 1771.....	16	0	0	47	29	0	330	16	1
.....	16	0	0	47	29	0	327	55	0
Carteret.									
4 Septembre 1766.....	16	0	0	32	34	0	340	0	0
De Fleurieu.									
8 Septembre 1769.....	16	0	0	34	21	0	345	48	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	16	0	0	39	47	0	344	21	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	16	0	0	47	43	0	346	3	0
De Fleurieu.									
2 Août.....	16	5	0	37	40	0	331	27	0
5 Août.....	16	20	0	35	26	0	335	15	0
Phipps.									
6 Juin 1773.....	16	22	0	52	20	0	356	35	0
De Fleurieu.									
11 Septembre 1769....	16	22	0	35	30	0	349	33	0
Cook.									
En Septembre 1768....	16	30	0	32	33	0	340	46	0
De Fleurieu.									
9 Juillet 1769.....	16	30	0	42	17	0	314	35	0
Phipps.									
6 Juin 1773.....	16	38	30	52	20	0	356	35	0
Bayli.									
27 Juillet 1780.....	16	43	0	44	24	0	323	45	0
Carteret.									
28 Mars 1769.....	16	46	0	39	9	0	318	33	0
De Fleurieu.									
29 Mars 1769.....	16	49	0	37	42	0	341	35	0
Phipps.									
27 Juin 1773.....	16	50	0	74	20	0	7	18	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
19 Août 1776.....	16	52	0	27	43	0	336	35	0
Phipps.									
6 Juin 1773.....	16	55	0	52	20	0	356	35	0
De Fleurieu.									
28 Octobre 1769.....	16	58	0	47	11	0	338	44	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	17	0	0	41	7	0	344	44	0
De Fleurieu.									
3 Août.....	17	2	0	37	14	0	331	52	0
Gérard de Brahm.									
26 Août 1771.....	17	6	0	48	0	0	328	55	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	17	8	0	41	30	0	317	11	0
Gérard de Brahm.									
26 Août 1771.....	17	10	0	48	49	0	333	52	17
Bayli.									
19 Août 1776.....	17	11	0	26	26	0	336	33	0
Phipps.									
25 Juin 1773.....	17	11	0	73	55	0	4	50	0
2 Juin.....	17	15	0	74	20	0	7	18	0
De Fleurieu.									
En Mars 1769 (à Cadix).....	17	15	0	36	31	0	350	17	0
Rosnevet.									
1773.....	17	15	0	29	0	0	341	20	0
.....	17	18	0	25	0	0	338	37	0
Cook.									
En vue du Pic de Ténériffe, 23 Septembre 1768.....	17	22	0						
Phipps.									
27 Juin 1773.....	17	22	0	74	20	0	7	18	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Courtanvaux.									
20 Juillet 1767 (Amsterdam).....	17	30	0	52	22	0	0	10	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	17	30	0	43	39	0	323	38	0
Chappe.									
En Février 1769.....	17	30	0	16	45	0	288	51	0
De Fleurieu.									
17 Octobre 1769.....	17	38	0	46	43	0	350	33	0
Cook et Bayli.									
30 Juillet 1776.....	17	43	0	31	8	0	342	5	0
.....	17	47	0	31	8	0	342	5	0
20 Septembre 1768 (près les Salvages)...	17	50	0	31	11	0			
Bayli.									
29 Juillet 1780.....	17	55	0	42	33	0	328	35	0
Gérard de Brahm.									
28 Août 1771.....	18	0	0	49	28	0	340	56	33
.....	18	0	0	49	36	0	345	3	36
29 Août.....	18	0	0	49	22	0	337	56	0
Chappe.									
En Février 1769.....	18	0	0	17	22	0	285	24	10
A bord de l'Écureuil, en 1774.....	18	0	0	44	53	0	325	38	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	18	0	0	37	35	0	339	2	0
.....	18	0	0	41	25	0	341	48	0
.....	18	0	0	48	54	0	353	37	0
Cook et Bayli.									
28 Juillet 1776.....	18	7	0	33	45	0	342	45	0
29 Juillet.....	18	11	0	32	4	0	342	45	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	18	15	0	43	46	0	345	15	0
Cook.									
30 Juillet 1776.....	18	17	0	31	8	0	342	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
12 Septembre 1769....	18	26	0	35	49	0	351	5	0
Bayli.									
30 Juillet 1780.....	18	28	0	43	20	0	330	15	0
Gérard de Brahm.									
5 Septembre 1771.....	18	30	0	49	14	0	355	1	45
.....	18	30	0	49	52	0	356	5	20
.....	18	30	0	49	40	0	345	5	0
.....	18	30	0	49	36	0	344	50	57
.....	18	30	0	49	0	0	349	44	47
.....	18	30	0	49	0	0	351	3	14
.....	18	30	0	46	36	0	348	17	6
Gérard de Brahm.									
.....	18	30	0	49	15	0	350	36	14
.....	18	30	0	49	5	0	352	34	0
Kerguelen.									
En 1767.....	18	30	0	60	3	0	354	54	0
Cook.									
28 Juillet 1776.....	18	33	0	33	45	0	342	45	0
Courtanvaux.									
9 Juin 1767 (à Dunkerque).....	18	33	0	51	2	0	0	2	0
Cook.									
29 Juillet 1776.....	18	35	0	33	45	0	342	45	0
.....	18	38	0	32	4	0	342	45	0
.....	18	39	48	32	4	0	342	45	0
De Fleurieu.									
12 Octobre 1769.....	18	40	0	36	34	0	350	50	0
Kerguelen.									
En 1767.....	18	42	0	60	44	0	354	24	0
Cook.									
21 Juillet 1776.....	18	44	32	38	10	0	330	33	0
Cook et Bayli.									
28 Juillet 1776.....	18	55	0	33	45	0	342	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Phipps.									
31 Juillet 1773.....	18	57	0	79	44	0	7	26	0
27 Juillet.....	19	0	0	74	20	0	7	18	0
Courtanvaux.									
28 Juin 1767 (à Rotterdam).....	19	0	0	51	55	0	0	8	0
Kerguelen.									
En 1767.....	19	0	0	59	30	0	355	55	0
.....	19	0	0	54	39	0	352	24	0
Duclos-Guyot.									
En 1763..... ..	19	0	8	42	50	0	339	59	0
.....	19	0	0	48	54	0	351	20	0
.....	19	0	0	49	3	0	352	6	0
Carteret.									
3 Septembre 1766.....	19	4	0	38	36	0	343	55	0
Phipps.									
19 Juin 1773.....	19	11	0	62	30	0	357	31	0
Chappe.									
28 Octobre 1766 (à Cadix).....	19	12	0	36	31	0	351	17	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	19	13	0	45	23	0	347	7	0
Courtanvaux.									
(Au Havre-de-Grace) 15 Mai 1767.....	19	15	0	49	29	0	359	0	0
Cook.									
30 Juillet 1776.....	19	21	0	31	8	0	342	5	0
Phipps.									
17 Juin 1773.....	19	22	0	60	30	0	357	31	0
Cook.									
29 Juillet 1769.....	19	29	0	33	4	0	342	45	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	19	30	0	48	29	0	349	43	0
Phipps.									
31 Août 1773.....	19	33	0	68	46	0	0	59	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Courtanvaux.									
5 Juin 1767 (à Calais)	19	36	0	50	57	0	359	31	0
Chappe.									
26 Septembre 1768 (au Havre-de-Grace)..	19	42	0	49	29	0	359	0	0
Kerguelen.									
En 1767.....	19	42	0	60	44	0	354	24	0
.....	19	45	0	49	30	0	353	24	0
Cook.									
13 Juillet 1776.....	19	49	0	50	8	0	352	55	0
Kerguelen.									
En 1767.....	20	0	0	48	46	0	349	21	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	20	0	0	47	7	0	350	6	0
Wallis.									
13 Mai 1768.....	20	0	0	49	58	0	350	27	0
De Fleurieu.									
20 Janvier 1769.....	20	0	0	41	56	0	348	17	0
Cook.									
6 Août 1774	20	14	0	43	17	0	347	14	0
Carteret.									
4 Septembre 1766.....	20	17	0	37	27	0	343	23	0
Cook.									
13 Juillet 1776.....	20	18	25	50	8	0	352	55	0
De Fleurieu.									
18 Février 1769.....	20	22	0	44	15	0	349	15	0
Bayli.									
2 Août 1780	20	23	0	44	45	0	344	20	0
Carteret.									
30 Août 1766.....	20	25	0	42	22	0	354	18	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	20	30	0	46	21	0	332	50	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	20	36	0	48	33	0	349	28	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
13 Juillet 1776.....	20	36	30	50	8	0	352	55	0
Bayli.									
13 Août 1776.....	20	38	0	33	19	0	341	33	0
Phipps.									
2 Juillet 1773.....	20	38	0	79	50	0	7	37	0
20 Septembre.....	20	47	0	52	57	0	359	5	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	20	49	0	48	31	0	350	5	0
Bayli.									
6 Août 1776.....	20	59	30	43	36	30	347	19	30
Wallis.									
22 Août 1766.....	21	0	0	50	0	0	348	49	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	21	0	0	48	27	0	346	43	0
.....	21	0	0	47	47	0	338	9	0
Kerguelen.									
En 1767.....	21	0	0	60	10	0	2	24	0
Cook.									
5 Septembre 1768....	21	4	0	42	50	0	348	49	0
Phipps.									
27 Juin 1773.....	21	11	0	74	20	0	7	18	0
Bayli.									
5 Août 1780.....	21	17	0	45	59	0	338	15	0
.....	21	18	0	46	25	0	338	35	0
17 Juillet 1776.....	21	36	20	48	44	0	347	25	0
11 Août 1776.....	21	42	0	35	51	0	343	35	0
Cook.									
2 Août 1780.....	21	43	26	44	50	0	334	5	0
6 Août.....	21	45	0	43	56	0	347	25	0
Phipps.									
14 Juin 1773.....	21	53	0	60	20	0	356	28	0
Bayli.									
6 Août 1780.....	22	9	0	48	18	0	339	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Phipps.									
4 Septembre 1773....	22	14	0	65	4	0	359	56	0
Cook.									
25 Juillet 1776.....	22	27	0	40	41	0	346	25	0
Carteret.									
En Août 1766.....	22	30	0	48	18	0	339	5	0
Wallis.									
10 Mai 1768.....	22	30	0	49	33	0	349	43	0
Kerguelen.									
En 1767.....	22	30	0	50	0	0	347	24	0
Cook et Bayli.									
17 Juillet 1776.....	22	38	20	48	44	0	352	35	0
Cook.									
25 Juillet 1776.....	22	56	0	40	41	0	346	25	0
8 Août,.....	22	56	0	40	45	0	346	15	0
Phipps.									
14 Juin 1773.....	22	58	0	60	20	0	356	56	0
27 Juin.....	23	8	0	74	20	0	7	18	0
Bayli.									
20 Août 1780.....	23	10	0	58	44	0	352	55	0
Phipps.									
21 Juin 1773.....	23	18	0	68	12	0	356	58	0
Cook.									
17 Juillet 1776.....	23	25	0	40	41	0	346	25	0
Kerguelen.									
En 1767.....	23	30	0	60	58	0	339	54	0
Phipps.									
15 Juin 1773.....	24	2	0	60	20	0	357	16	0
Bayli.									
18 Août 1780.....	24	12	0	56	8	0	345	45	0
Phipps.									
31 Août 1773.....	24	17	0	68	47	0	0	59	0
Bayli.									
15 Août 1780.....	24	30	0	55	3	0	342	25	0
25 Août...,.....	24	31	0	58	57	0	354	4	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
17 Août 1780.....	24	45	0	56	6	0	344	9	0
17 Juillet 1776.....	24	50	0	48	35	0	352	18	0
11 Août 1780.....	25	14	0	52	41	0	341	25	0
17 Juillet 1776.....	25	18	0	48	35	0	352	18	0
13 Août 1780.....	25	26	0	52	51	0	341	56	0
Phipps.									
5 Septembre 1773....	25	46	0	63	45	0	359	51	0
Bayli.									
12 Août 1780.....	25	50	0	52	48	0	341	41	0
Phipps.									
15 Juin 1773.....	26	16	0	60	20	0	356	56	0
3 Septembre	26	55	0	65	47	0	0	2	0
Kerguelen.									
En 1767..... ..	31	0	0	64	30	0	333	14	0
.....	32	0	0	65	11	0	330	54	0
Chevalier de l'Angle.									
24 Septembre 1782....	33	0	0	58	0	0	305	0	0
3 Août 1782.....	35	0	0	61	46	0	273	52	0
La Pérouse.									
3 Août 1782.....	37	0	0	61	46	0	273	52	0
Chevalier de l'Angle.									
30 Juillet 1782.....	41	0	0	62	41	0	275	57	10
14 Juillet, matin.....	41	53	0	59	41	51	296	44	6
23 Juillet.....	42	15	0	62	43	6	près d'une petite île voisine de celle de Nord-Bluffe.		
14 Juillet, soir.....	42	40	0	59	41	51	296	44	6
12 Juillet, matin.....	42	40	0	59	42	57	297	16	16
12 Juillet, soir.....	42	45	0	59	42	57	297	16	16
21 Juillet.....	44	0	0	62	14	0	à environ 3 lieues de l'île de Sadlebach, à peu de degrés près en avançant vers l'oueſt.		
24 Juillet.....	45	0	0	à-peu-près dans les mêmes parages.					

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER ATLANTIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
11 Septembre 1776....	0	0	0	14	11	0	322	46	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	0	0	0	9	20	0	328	9	0
Cook et Bayli.									
9 Septembre 1776....	0	0	20	9	35	0	322	43	0
7 Septembre.....	0	1	20	7	50	0	323	15	0
.....	0	5	0	8	43	0	323	15	0
8 Septembre.....	0	5	0	9	35	0	322	43	0
5 Septembre.....	0	6	0	6	45	0	324	5	0
10 Septembre.....	0	6	0	12	40	0	322	46	0
6 Septembre.....	0	7	0	7	18	0	323	28	0
7 Septembre.....	0	8	0	8	43	0	323	15	0
8 Septembre.....	0	8	0	9	35	0	322	43	0
7 Septembre.....	0	8	45	8	43	0	323	15	0
11 Septembre.....	0	12	0	14	11	0	322	46	0
7 Septembre.....	0	13	0	8	43	0	323	15	0
.....	0	15	20	9	1	0	322	45	0
10 Septembre.....	0	15	20	9	1	0	322	46	0
11 Septembre.....	0	16	0	13	23	0	322	46	0
.....	0	18	40	13	23	0	322	46	0
8 Septembre	0	20	4	9	35	0	325	43	0
11 Septembre ..'.....	0	22	20	14	11	0	322	46	0
9 Septembre.....	0	24	45	11	1	0	322	46	0
10 Septembre.....	0	27	20	12	40	0	322	46	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
8 Septembre 1776....	0	29	0	9	35	0	322	43	0
11 Septembre.....	0	29	11	14	11	0	322	46	0
8 Septembre.....	0	30	44	9	1	0	322	45	0
6 Septembre.....	0	32	15	7	18	0	323	28	0
10 Septembre.....	0	33	30	12	40	0	322	46	0
8 Septembre.....	0	34	0	9	1	0	322	45	0
2 Novembre.....	0	34	0	10	38	0	325	22	0
5 Septembre.....	0	36	20	6	45	0	324	5	0
11 Septembre.....	0	38	0	13	23	0	322	46	0
.....	0	40	0	14	11	0	322	46	0
13 Septembre.....	0	40	30	16	12	0	322	15	0
23 Septembre.....	0	40	40	29	29	0	328	23	0
10 Septembre.....	0	44	10	12	40	0	322	46	0
8 Septembre.....	0	44	40	9	1	0	322	45	0
11 Septembre.....	0	45	5	13	23	0	322	46	0
8 Septembre.....	0	45	40	9	1	0	322	45	0
11 Septembre.....	0	48	20	13	23	0	322	46	0
13 Septembre.....	0	48	30	16	12	0	322	15	0
12 Septembre.....	0	50	0	15	33	0	322	55	0
6 Septembre.....	0	51	0	7	18	0	323	15	0
12 Septembre.....	0	55	0	15	33	0	322	55	0
22 Septembre.....	0	56	0	29	19	0	327	4	0
12 Septembre.....	0	57	30	15	33	0	322	55	0
8 Septembre.....	0	58	0	9	35	0	322	43	0
22 Septembre.....	0	58	5	29	12	0	327	4	0
10 Septembre.....	0	59	0	12	40	0	322	46	0
.....	0	59	40	12	40	0	322	46	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	1	0	0	9	20	0	328	9	0
Cook et Bayli.									
5 Septembre 1776....	1	0	3	6	45	0	324	5	0
12 Septembre.....	1	0	30	15	33	0	322	55	0
23 Septembre.....	1	0	40	29	29	0	328	23	0
22 Septembre.....	1	1	5	29	12	0	327	4	0
11 Septembre.....	1	1	20	13	23	0	322	46	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
22 Septembre.....	1	2	35	29	12	0	327	4	0
9 Septembre.....	1	3	40	10	4	0	322	46	0
24 Septembre.....	1	3	40	30	25	0	331	7	0
23 Septembre.....	1	5	20	29	29	0	328	23	0
5 Septembre.....	1	7	0	6	45	0	324	5	0
11 Septembre.....	1	9	1	14	11	0	322	46	0
10 Septembre.....	1	12	0	12	40	0	322	46	0
5 Septembre.....	1	14	40	6	45	0	324	5	0
13 Septembre.....	1	15	0	16	12	0	322	15	0
Cook.									
22 Septembre.....	1	15	1	29	12	0	327	4	0
Cook et Bayli.									
5 Septembre.....	1	16	0	6	47	0	324	5	0
Cook.									
24 Septembre 1776....	1	17	0	30	25	0	332	7	0
14 Septembre.....	1	18	10	18	30	0	321	45	0
10 Septembre.....	1	19	40	12	40	0	322	46	0
12 Septembre.....	1	20	1	15	33	0	322	55	0
22 Septembre.....	1	20	45	29	12	0	327	4	0
13 Septembre.....	1	21	0	16	12	0	322	15	0
Cook et Bayli.									
27 Septembre.....	1	22	15	29	12	0	327	4	0
Cook.									
23 Septembre.....	1	22	55	29	29	0	328	23	0
22 Septembre.....	1	23	20	29	12	0	327	4	0
Carteret.									
31 Octobre 1766.....	1	24	0	12	56	0	326	49	0
Furneau.									
22 Février 1773.....	1	26	0	53	12	0	344	35	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	1	30	0	7	29	0	328	42	0
Cook et Bayli.									
14 Septembre 1776....	1	30	0	17	40	0	321	47	0
23 Septembre.....	1	31	0	29	29	0	328	23	0
21 Septembre.....	1	31	14	28	19	0	325	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
21 Septembre.....	1	32	45	28	19	0	325	15	0
23 Septembre.....	1	33	5	29	29	0	328	23	0
14 Septembre.....	1	34	5	18	30	0	321	45	0
Cook.									
24 Septembre.....	1	38	10	18	30	0	321	45	0
.....	1	39	21	30	25	0	331	7	0
Carteret.									
2 Novembre 1766....	1	40	0	17	22	0	325	26	0
Cook et Bayli.									
5 Septembre 1776....	1	40	0	6	45	0	324	5	0
20 Septembre.....	1	40	45	27	44	0	324	28	0
12 Septembre.....	1	42	45	15	33	0	322	55	0
22 Septembre.....	1	43	10	28	36	0	326	35	0
11 Septembre.....	1	43	20	13	23	0	322	46	0
13 Septembre.....	1	43	30	16	12	0	322	15	0
14 Septembre.....	1	43	55	18	30	0	321	45	0
13 Septembre.....	1	44	33	16	12	0	322	15	0
Cook et Bayli.									
16 Septembre.....	1	44	40	20	46	0	321	28	0
.....	1	47	20	20	46	0	321	28	0
13 Septembre.....	1	48	0	16	12	0	322	15	0
23 Septembre.....	1	48	40	29	29	0	328	23	0
12 Septembre.....	1	50	0	15	33	0	322	55	0
.....	1	51	30	15	33	0	322	55	0
22 Septembre.....	1	53	0	29	12	0	327	4	0
.....	1	55	0	28	36	0	326	35	0
20 Septembre.....	1	56	13	27	44	0	324	28	0
21 Septembre.....	1	58	45	27	44	0	324	28	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	2	0	0	11	7	0	327	4	0
.....	2	0	0	13	15	0	326	3	0
Cook et Bayli.									
23 Septembre 1776....	2	1	0	29	29	0	328	23	0
21 Septembre.....	2	1	47	28	19	0	324	39	0
13 Septembre.....	2	4	0	16	12	0	322	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
22 Septembre 1776....	2	4	30	28	36	0	326	35	0
13 Septembre.....	2	4	45	16	12	0	322	15	0
17 Septembre.....	2	7	0	24	17	0	321	27	0
16 Septembre.....	2	7	30	21	37	0	321	26	0
14 Septembre.....	2	9	15	17	40	0	321	47	0
Cook.									
14 Septembre.....	2	11	6	17	40	0	321	47	0
21 Septembre.....	2	11	45	28	19	0	325	15	0
22 Septembre.....	2	12	55	28	36	0	326	35	0
21 Septembre.....	2	13	30	28	19	0	325	15	0
20 Septembre.....	2	15	45	27	44	0	324	28	0
13 Septembre.....	2	15	55	16	12	0	322	15	0
Cook.									
14 Septembre.....	2	16	15	18	30	0	321	45	0
.....	2	16	52	18	30	0	321	45	0
16 Septembre.....	2	20	0	20	46	0	321	28	0
Cook et Bayli.									
22 Septembre.....	2	22	20	28	36	0	326	35	0
13 Septembre.....	2	23	20	16	12	0	322	15	0
16 Septembre.....	2	23	45	21	37	0	321	26	0
17 Septembre.....	2	24	0	24	17	0	321	27	0
20 Septembre.....	2	25	15	27	44	0	324	28	0
16 Septembre.....	2	26	30	21	37	0	321	26	0
21 Septembre.....	2	27	15	28	19	0	325	15	0
17 Septembre.....	2	28	0	24	17	0	321	27	0
Cook.									
21 Septembre.....	2	28	15	28	19	0	325	15	0
22 Septembre.....	2	31	43	28	36	0	326	35	0
24 Septembre.....	2	37	15	30	25	0	331	7	0
14 Septembre.....	2	38	20	17	40	0	321	47	0
19 Septembre.....	2	39	30	26	47	0	323	8	0
17 Septembre.....	2	43	30	24	17	0	321	27	0
16 Septembre.....	2	43	52	20	46	0	321	28	0
20 Septembre.....	2	44	0	27	14	0	324	21	0
.....	2	44	30	27	44	0	324	28	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
16 Septembre.....	2	44	49	21	37	0	321	26	0
13 Septembre.....	2	45	20	16	13	0	322	15	0
20 Septembre.....	2	46	20	27	14	0	324	21	0
16 Novembre.....	2	49	0	20	46	0	321	28	0
.....	2	49	15	21	37	0	321	26	0
19 Septembre.....	2	49	45	26	47	0	323	8	0
17 Septembre.....	2	50	0	24	17	0	321	27	0
20 Septembre.....	2	50	2	27	29	0	323	45	30
16 Septembre.....	2	52	40	20	46	0	321	28	0
Cook et Bayli.									
14 Septembre 1776....	2	52	55	18	30	0	321	45	0
.....	2	53	10	17	40	0	321	47	0
20 Septembre.....	2	53	15	27	44	0	324	28	0
17 Septembre.....	2	55	0	24	17	0	321	27	0
14 Septembre.....	2	55	50	17	40	0	321	45	0
20 Septembre.....	2	57	15	27	14	0	324	21	0
19 Septembre.....	2	59	25	26	47	0	323	8	0
20 Septembre.....	3	0	15	27	14	0	324	21	0
14 Septembre.....	3	2	25	18	30	0	321	45	0
16 Septembre.....	3	6	0	21	27	0	321	26	0
22 Septembre.....	3	12	15	28	36	0	327	35	0
20 Septembre.....	3	13	45	27	14	0	324	21	0
19 Septembre.....	3	14	0	26	47	0	323	8	0
16 Septembre.....	3	14	15	21	37	0	321	26	0
.....	3	15	20	20	46	0	321	28	0
22 Septembre.....	3	15	45	28	36	0	326	35	0
17 Septembre.....	3	16	0	24	17	0	321	27	0
Cook.									
19 Septembre.....	3	16	32	26	47	0	323	8	0
.....	3	17	15	27	14	0	324	21	0
.....	3	19	10	26	47	0	323	8	0
.....	3	19	45	25	54	0	522	35	0
.....	3	23	45	26	47	0	323	8	0
17 Septembre.....	3	24	0	24	17	0	321	27	0
16 Septembre.....	3	24	15	21	37	0	321	26	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
20 Septembre	3	25	15	27	14	0	324	20	0
.....	3	26	10	27	14	0	324	21	0
Cook et Bayli.									
22 Septembre 1776....	3	27	50	28	36	0	326	35	0
15 Septembre.....	3	32	0	20	8	0	321	34	0
Cook.									
19 Septembre.....	3	32	31	25	54	0	322	35	0
.....	3	34	20	20	8	0	321	34	0
.....	3	26	35	25	54	0	322	35	0
15 Septembre.....	3	27	20	20	8	0	321	34	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	4	0	0	16	57	0	324	12	0
.....	4	0	0	22	28	0	326	4	0
Cook.									
19 Septembre.....	4	2	20	26	47	0	323	8	0
15 Septembre.....	4	2	30	20	8	0	321	34	0
16 Septembre.....	4	19	20	20	46	0	321	28	0
Carteret.									
7 Novembre 1766....	4	56	0	23	54	0	329	25	0
Furneau.									
24 Février 1773.....	5	0	0	52	48	0	352	42	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	5	0	0	18	44	0	323	12	0
Cook.									
5 Février 1775.....	5	18	0	57	8	0	334	1	0
15 Septembre 1776....	5	26	10	20	8	0	321	34	0
26 Février 1774.....	5	53	0	36	37	0	351	42	0
Carteret.									
7 Novembre 1766....	5	56	0	23	54	0	319	25	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	6	0	0	25	12	0	323	17	0
.....	6	30	0	26	37	0	322	13	0
Furneau.									
25 Février 1773.....	6	30	0	53	14	0	355	37	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
25 Février 1774.....	6	38	0	37	52	0	350	57	0
Carteret.									
8 Novembre 1766....	6	45	0	25	49	0	318	14	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	7	0	0	28	57	0	320	30	0
.....	7	0	0	23	41	0	315	10	0
.....	8	0	0	31	11	0	319	7	0
Cook.									
24 Février 1774.....	8	10	0	37	25	0	349	25	0
Carteret.									
11 Novembre 1766....	8	50	0	29	57	0	315	8	0
Furneau.									
26 Février 1773.....	9	20	0	53	29	0	357	54	0
Cook.									
26 Janvier 1775.....	9	26	0	53	33	0	326	25	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	10	0	0	25	56	0	311	53	0
Cook.									
1 Février.....	10	11	0	58	25	0	330	17	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	10	12	0	26	22	0	309	41	0
.....	11	0	0	26	32	0	309	17	0
.....	11	0	0	27	22	0	309	41	0
Furneau.									
27 Février 1773.....	11	0	0	53	29	0	0	46	0
Cook.									
En Novembre 1769....	11	9	0	36	48	0	1	39	0
25 Décembre.....	11	35	0	35	10	0	5	55	0
Byron.									
11 Novembre 1764....	11	45	0	42	34	0	299	18	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	12	0	0	34	39	0	316	43	0
.....	12	0	0	32	10	0	309	9	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
15 Novembre 1766....	12	0	0	34	12	0	310	54	0
16 Novembre.....	12	36	0	34	38	0	309	37	0
Cook.									
7 Décembre 1769....	12	40	0	34	44	0	3	5	0
Byron.									
4 Novembre 1764....	13	0	0	38	53	0	306	35	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	13	0	0	33	40	0	307	42	0
Carteret.									
17 Novembre 1766.....	13	3	0	34	46	0	309	7	0
Cook.									
En Février 1770.....	13	5	0	41	0	0	2	20	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	13	30	0	27	39	0	310	58	0
.....	14	0	0	36	30	0	314	58	0
Cook.									
En Mars 1770.....	14	0	0	44	47	0	10	35	0
14 Décembre 1773.....	14	12	0	64	55	0	294	15	0
9 Janvier 1770.....	14	15	0	38	4	0	2	17	0
Carteret.									
17 Novembre 1766.....	14	20	0	34	46	0	309	7	0
18 Novembre.....	14	30	0	35	37	0	307	46	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	15	0	0	34	58	0	305	32	0
.....	15	0	0	37	13	0	304	33	0
Cook.									
13 Février 1770.....	15	4	0	42	2	0	3	35	0
6 Mars.....	15	10	0	47	6	0	6	35	0
17 Février.....	15	30	0	45	16	0	4	5	0
Carteret.									
20 Novembre 1766.....	15	33	0	36	57	0	305	47	0
18 Novembre.....	15	45	0	35	37	0	306	46	0
21 Novembre.....	15	52	0	37	40	0	306	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	16	0	0	40	34	0	302	30	0
Cook.									
4 Mars 1770.....	16	16	0	46	31	0	5	45	0
7 Mars.....	16	29	0	47	6	0	9	35	0
Furneau.									
7 Mars 1773.....	16	32	0	48	30	0	12	1	0
Cook.									
27 Février 1770.....	16	34	0	47	43	0	6	35	0
Furneau.									
3 Mars 1773.....	16	45	0	53	17	0	9	28	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	17	0	0	41	39	0	303	59	0
.....	17	30	0	38	22	0	313	21	0
Byron.									
10 Novembre 1764.....	18	20	0	41	16	0	302	18	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	19	0	0	42	28	0	304	13	0
.....	19	0	0	42	39	0	308	33	0
Carteret.									
28 Novembre 1766.....	19	0	0	41	14	0	300	47	0
Byron.									
11 Janvier 1765.....	19	0	0	51	24	0	293	25	0
Carteret.									
29 Novembre 1766.....	19	2	0	42	8	0	298	54	0
Cook.									
11 Janvier 1775.....	19	25	0	54	35	0	312	25	0
Byron.									
12 Novembre 1764.....	19	30	0	43	46	0	297	30	0
Carteret									
7 Décembre 1766.....	19	40	0	47	14	0	293	58	0
Byron.									
15 Novembre 1764.....	19	41	0	45	21	0	294	33	0
Carteret.									
29 Novembre 1766.....	19	45	0	42	8	0	298	54	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	20	0	0	46	33	0	305	4	0
Carteret.									
4 Décembre 1766.....	20	20	0	47	0	0	296	44	0
8 Décembre.....	20	30	0	48	54	0	293	31	0
6 Décembre.....	20	34	0	47	35	0	294	45	0
9 Décembre.....	20	35	0	49	12	0	292	4	0
5 Décembre.....	20	40	0	48	1	0	296	7	0
Furneau.									
17 Mars 1773.....	21	0	0	34	13	0	15	40	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	21	0	0	47	5	0	300	1	0
.....	21	0	0	48	33	0	303	17	0
Cook.									
4 Janvier 1775.....	21	28	0	57	9	0	298	49	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	22	0	0	49	47	0	296	35	0
Wallis.									
8 Décembre 1766....	23	15	0	47	56	0	291	11	0
Byron.									
12 Janvier 1765.....	23	30	0	51	27	0	293	41	0
	Déclinaison Ouest.								
Carteret.									
31 Octobre 1766.....	0	0	0	12	30	0	327	5	0
Cook et Bayli.									
8 Septembre 1776....	0	2	20	9	1	0	322	45	0
.....	0	3	0	9	35	0	322	43	0
6 Septembre.....	0	3	0	7	18	0	323	28	0
24 Septembre.....	0	4	5	30	25	0	331	7	0
5 Septembre.....	0	6	0	6	0	0	324	45	0
6 Septembre.....	0	6	40	7	50	0	323	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
.....	0	7	0	7	50	0	323	15	0
9 Septembre.....	0	9	20	11	1	0	322	46	0
8 Septembre.....	0	9	52	9	35	0	322	43	0
.....	0	10	0	9	35	0	322	43	0
Bougainville.									
14 Janvier 1767.....	0	10	0	10	30	0	326	35	0
Cook et Bayli.									
8 Septembre 1776.....	0	11	0	9	35	0	322	43	0
9 Septembre.....	0	11	20	11	1	0	322	46	0
5 Septembre.....	0	14	20	6	45	0	324	5	0
6 Septembre.....	0	15	0	8	43	0	323	15	0
Cook.									
8 Septembre.....	0	16	22	9	35	0	322	43	0
11 Septembre.....	0	17	0	14	11	0	322	46	0
13 Septembre.....	0	18	0	10	38	0	325	22	0
11 Septembre.....	0	19	40	14	11	0	322	46	0
7 Septembre.....	0	21	0	8	43	0	322	46	0
Cook et Bayli.									
6 Septembre 1776.....	0	21	20	7	50	0	323	15	0
7 Septembre.....	0	21	22	8	43	0	323	15	0
Cook.									
5 Septembre 1776.....	0	21	30	6	0	0	324	45	0
.....	0	22	57	7	50	0	323	15	0
8 Septembre.....	0	23	0	9	35	0	322	43	0
24 Septembre.....	0	23	20	30	25	0	331	17	0
9 Septembre.....	0	26	0	10	42	0	322	46	0
8 Septembre.....	0	26	0	9	1	0	322	47	0
6 Septembre.....	0	26	50	7	50	0	323	15	0
11 Septembre.....	0	28	0	14	11	0	322	46	0
24 Septembre.....	0	28	15	30	25	0	331	17	0
Carteret.									
30 Octobre 1766.....	0	30	0	10	57	0	327	26	0
Cook et Bayli.									
14 Septembre 1776.....	0	30	0	13	23	0	322	46	0
9 Septembre.....	0	31	0	10	4	0	322	46	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
7 Septembre.....	0	32	0	8	43	0	323	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	0	33	0	23	0	0	334	25	0
Cook.									
9 Septembre 1776....	0	34	0	8	43	0	323	15	0
11 Septembre.....	0	37	40	13	23	0	322	46	0
9 Septembre.....	0	38	40	10	4	0	322	46	0
6 Septembre.....	0	42	15	7	18	0	323	28	0
.....	0	42	15	7	50	0	323	15	0
24 Septembre.....	0	42	58	30	25	0	331	7	0
5 Septembre.....	0	44	0	6	0	0	324	45	0
10 Septembre.....	0	44	10	12	40	0	322	46	0
Cook.									
11 Septembre.....	0	44	10	13	23	0	322	46	0
9 Septembre.....	0	44	47	10	32	30	322	46	0
.....	0	46	0	10	4	0	322	46	0
5 Septembre.....	0	46	30	6	45	0	324	5	0
9 Septembre.....	0	50	33	10	4	0	322	46	0
6 Septembre.....	0	52	15	7	18	0	323	28	0
.....	0	54	0	7	18	0	323	28	0
24 Septembre.....	0	57	5	30	25	0	331	7	0
Rosnevet.									
En 1773.....	1	0	0	20	20	0	333	17	0
.....	1	6	0	24	30	0	335	42	0
Furneau.									
10 Février 1775.....	1	7	0	58	15	0	347	1	0
Cook.									
7 Septembre 1776....	1	8	0	8	43	0	323	15	0
9 Septembre.....	1	8	40	10	4	0	322	46	0
Rosnevet.									
En 1773.....	1	9	0	19	41	0	333	13	0
Cook.									
4 Septembre 1776....	1	12	0	5	34	0	325	28	0
5 Septembre.....	1	18	40	6	45	0	324	5	0
6 Septembre.....	1	20	0	7	50	0	323	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
12 Septembre.....	1	20	1	15	33	0	322	55	0
4 Septembre.....	1	22	0	5	34	0	325	28	0
3 Septembre.....	1	24	0	5	34	0	325	28	0
Rosnevet.									
En 1773.....	1	31	0	21	46	0	333	58	0
Bayli.									
9 Septembre 1776....	1	33	0	10	4	0	322	46	0
Rosnevet.									
En 1773.....	1	39	0	25	30	0	337	9	0
Bayli.									
24 Septembre 1776....	1	42	5	30	25	0	330	57	0
4 Septembre.....	1	42	56	5	17	0	325	41	30
Cook.									
13 Septembre 1776.....	1	44	33	16	12	0	322	15	0
3 Septembre.....	1	48	0	4	22	0	327	6	0
Carteret.									
28 Octobre 1766.....	1	50	0	8	46	0	328	21	0
Cook.									
6 Septembre 1776.....	1	52	0	7	18	0	323	28	0
Rosnevet.									
En 1773.....	1	57	0	26	32	0	337	46	0
.....	2	0	0	18	10	0	332	47	0
Furneau.									
20 Février 1773.....	2	0	0	53	15	0	338	28	0
Cook.									
3 Septembre 1776.....	2	2	0	4	22	0	327	6	0
.....	2	3	0	4	22	0	327	6	0
4 Septembre.....	2	3	0	5	0	0	325	55	0
3 Septembre.....	2	7	0	3	37	0	327	21	0
4 Septembre.....	2	11	0	5	0	0	325	55	0
14 Septembre.....	2	11	6	17	40	0	321	47	0
3 Septembre.....	2	14	0	3	37	0	327	21	0
Bayli.									
4 Octobre 1776.....	2	16	0	22	17	0	333	10	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
14 Septembre.....	2	16	52	18	30	0	321	45	0
2 Septembre.....	2	20	0	2	48	0	327	58	0
25 Octobre.....	2	24	0	Sous l'Équateur.			328	5	0
3 Septembre 1776....	2	27	0	4	22	0	327	6	0
.....	2	29	0	3	37	0	327	21	0
Bayli.									
9 Octobre.....	2	30	0	28	58	0	336	28	0
4 Septembre.....	2	31	0	5	0	0	325	55	0
3 Septembre.....	2	36	52	4	22	0	327	6	0
.....	2	40	0	4	22	0	327	6	0
28 Septembre.....	2	46	25	33	43	0	341	8	0
2 Septembre.....	2	49	0	2	48	0	327	58	0
.....	2	50	0	2	48	0	327	58	0
Cook.									
2 Septembre 1776....	2	52	0	2	48	0	327	58	0
3 Septembre.....	2	54	0	4	22	0	327	6	0
Bayli.									
6 Octobre.....	2	54	0	24	58	0	333	27	0
Rosnevet.									
En 1773.....	2	55	0	28	31	0	341	21	0
Cook.									
3 Septembre 1776....	2	55	7	3	37	0	327	21	0
Bayli.									
1 Septembre.....	2	56	0	1	13	0	328	37	0
Cook.									
3 Septembre.....	2	58	0	4	22	0	327	6	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	3	0	0	11	39	0	330	25	0
.....	3	0	0	8	10	0	330	53	0
Rosnevet.									
En 1773.....	3	1	0	27	32	0	339	9	0
Cook.									
1 Septembre 1776....	3	1	0	1	13	0	328	57	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
1 Octobre.....	3	1	0	20	17	0	322	18	0
9 Octobre.....	3	2	0	29	5	0	326	35	0
1 Septembre.....	3	4	0	1	13	0	328	57	0
Rosnevet.									
En 1773.....	3	5	0	16	10	0	333	42	0
Bayli.									
29 Septembre 1776....	3	5	45	33	48	0	341	5	0
.....	3	5	45	33	56	0	341	21	0
11 Octobre.....	3	6	0	28	40	0	337	34	0
2 Septembre.....	3	9	0	1	50	0	327	25	0
9 Septembre.....	3	9	0	3	37	0	327	21	0
1 Septembre.....	3	12	0	1	13	0	329	7	0
Cook.									
2 Septembre 1776.....	3	12	22	2	48	0	327	58	0
.....	3	14	0	1	50	0	327	25	0
3 Septembre.....	3	15	0	3	37	0	327	21	0
Bougainville.									
11 Janvier 1767.....	3	17	0	5	0	0	328	10	0
Cook.									
28 Septembre 1776....	3	20	50	33	43	0	341	8	0
Rosnevet.									
En 1773.....	3	23	0	30	50	0	345	7	0
Cook.									
12 Février 1775.....	3	23	0	58	19	0	350	52	0
2 Septembre.....	3	23	0	1	50	0	327	25	0
3 Septembre.....	3	23	0	3	37	0	327	21	0
Bayli.									
29 Septembre.....	3	25	0	17	20	0	332	35	0
28 Septembre.....	3	26	0	33	43	0	341	8	0
Cook.									
2 Septembre.....	3	26	40	1	50	0	327	25	0
1 Septembre 1776.....	3	26	52	1	13	0	328	37	0
Bayli.									
2 Septembre 1776.....	3	27	55	1	50	0	327	25	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
30 Septembre.....	3	30	0	20	0	0	332	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	3	33	0	14	7	0	334	17	0
Bayli.									
30 Septembre 1776....	3	34	0	18	33	0	332	33	0
1 Septembre.....	3	36	0	1	13	0	328	57	0
2 Septembre.....	3	36	0	1	50	0	327	25	0
1 Septembre.....	3	39	0	1	13	0	328	57	0
Rosnevet.									
En 1773.....	3	39	0	29	21	0	342	27	0
Bayli.									
29 Septembre.....	3	40	45	33	48	0	340	5	0
Bayli.									
2 Septembre 1776....	3	43	0	1	50	0	327	25	0
1 Septembre.....	3	45	0	1	13	0	328	57	0
2 Septembre.....	3	47	0	1	50	0	327	25	0
3 Septembre.....	3	48	0	3	37	0	327	21	0
Carteret.									
27 Octobre 1766.....	3	52	0	7	3	0	328	46	0
Cook.									
28 Septembre 1776....	3	54	5	33	43	0	341	8	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	4	0	0	3	30	0	331	42	0
Cook.									
3 Septembre 1776....	4	3	0	4	22	0	327	6	0
Rosnevet.									
En 1773.....	4	5	0	32	26	0	351	22	0
.....	4	8	0	12	15	0	334	45	0
Cook.									
1 Septembre 1776....	4	22	0	1	13	0	328	37	0
29 Septembre.....	4	24	0	33	48	0	341	5	0
.....	4	24	0	33	56	0	341	21	0
2 Septembre.....	4	26	0	2	48	0	327	58	0
28 Septembre.....	4	26	40	33	43	0	341	8	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
25 Octobre 1766.....	4	30	0	4	14	0	330	12	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	4	30	0	2	15	0	331	32	0
Cook.									
28 Septembre 1776....	4	42	0	33	43	0	341	8	0
.....	4	43	40	33	43	0	341	8	0
29 Septembre.....	4	44	15	33	56	0	341	21	0
.....	4	44	15	33	56	0	341	21	0
Bayli.									
13 Octobre.....	4	45	0	30	26	0	341	25	0
Cook.									
29 Septembre 1776....	4	45	28	32	52	0	341	13	0
Rosnevet.									
En 1773.....	4	53	0	31	39	0	347	53	0
Bayli.									
5 Septembre 1776....	5	6	0	13	34	0	333	41	0
29 Septembre.....	5	7	0	33	48	0	341	5	0
.....	5	7	0	33	56	0	341	21	0
3 Octobre.....	5	26	30	35	27	0	348	5	0
29 Septembre.....	5	34	30	33	48	0	341	5	0
.....	5	39	45	33	56	0	341	21	0
3 Octobre.....	5	42	55	35	37	0	348	5	0
.....	5	44	30	35	37	0	348	5	0
4 Octobre.....	5	46	15	35	45	0	348	15	0
29 Septembre.....	5	47	45	33	48	0	341	5	0
.....	5	47	45	33	56	0	341	21	0
3 Octobre.....	5	51	10	35	37	0	348	5	0
.....	5	53	0	34	43	0	347	55	0
1 Octobre.....	6	0	10	34	12	0	346	5	0
16 Octobre.....	6	2	0	31	42	0	347	21	0
25 Septembre.....	6	5	0	11	4	0	334	45	0
1 Octobre.....	6	13	0	34	16	0	345	19	0
Rosnevet.									
En 1773.....	6	20	0	9	52	0	335	18	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
16 Octobre 1776.....	6	20	0	31	47	0	346	45	0
3 Octobre.....	6	27	15	35	37	0	348	5	0
13 Octobre.....	6	27	50	34	12	0	346	5	0
3 Octobre.....	6	28	0	35	37	0	348	5	0
Cook.									
3 & 4 Octobre 1776...	6	29	23	35	41	15	348	10	0
4 Octobre.....	6	29	40	35	45	0	348	15	0
Furneau.									
16 Janvier 1773.....	6	32	0	54	4	0	333	21	0
Cook.									
3 Octobre 1776.....	6	32	0	34	43	0	347	55	0
4 Octobre.....	6	34	5	35	45	0	348	15	0
Cook et Bayli.									
1 Octobre 1776.....	6	36	55	34	12	0	346	5	0
.....	6	37	55	34	12	0	346	5	0
3 Octobre.....	6	38	30	35	37	0	348	5	0
4 Octobre.....	6	40	0	35	45	0	348	15	0
3 Octobre.....	6	46	10	35	37	0	348	5	0
4 Octobre.....	6	49	5	35	45	0	348	15	0
1 Octobre.....	6	49	30	34	16	0	345	19	0
.....	7	0	58	34	16	0	345	19	0
.....	7	2	50	34	16	0	345	19	0
4 Octobre.....	7	5	50	35	45	0	348	15	0
1 Octobre.....	7	10	36	34	12	0	346	5	0
8 Octobre.....	7	9	0	35	32	0	350	10	0
3 Octobre.....	7	11	0	34	43	0	347	55	0
4 Octobre.....	7	12	40	35	49	0	348	21	0
.....	7	16	0	35	49	0	348	21	0
Bayli.									
9 Juin 1780.....	7	17	0	1	30	0	331	35	0
4 Octobre 1776.....	7	19	50	35	49	0	348	21	0
1 Octobre.....	7	21	30	34	16	0	345	19	0
.....	7	21	35	34	16	0	345	19	0
4 Octobre.....	7	23	45	35	45	0	348	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
7 Octobre.....	7	24	15	35	19	0	349	35	0
Le Gentil.									
22 Avril 1760.....	7	28	0	4	44	0	339	24	0
Cook.									
4 Octobre 1776.....	7	34	5	35	49	0	348	21	0
.....	7	35	15	35	49	0	348	21	0
7 Octobre.....	7	38	30	34	12	0	346	5	0
4 Octobre.....	7	40	20	35	49	0	348	21	0
Cook et Bayli.									
1 Octobre 1776.....	7	41	0	34	16	0	345	19	0
Bayli.									
23 Septembre 1780....	7	43	0	7	5	0	337	12	0
1 Octobre 1776.....	7	45	30	34	12	0	346	5	0
4 Octobre.....	7	49	0	35	49	0	348	21	0
1 Octobre.....	7	50	15	34	12	0	346	5	0
4 Octobre.....	7	55	55	35	49	0	348	21	0
1 Octobre.....	7	57	35	34	12	0	346	5	0
Rosnevet.									
En 1773.....	8	0	0	5	17	0	336	40	0
Bayli.									
8 Octobre 1776.....	8	16	0	35	32	0	350	10	0
Rosnevet.									
En 1773.....	8	20	0	1	10	0	338	32	0
Cook.									
7 Octobre 1776.....	8	20	29	35	19	0	349	35	0
Bayli.									
7 Juin 1780.....	8	26	0	5	12	0	333	47	0
Carteret.									
6 Février 1768.....	8	32	0	0	20	0	339	8	0
Cook et Bayli.									
28 Mai 1780.....	8	32	10	12	0	0	341	43	0
7 Octobre 1786.....	8	33	30	35	19	0	349	35	0
.....	8	34	25	35	30	0	349	40	0
.....	8	35	0	35	19	0	349	35	0
.....	8	42	30	35	19	0	349	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
.....	8	43	15	35	30	0	349	40	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	45	0	1	8	0	340	0	0
Cook et Bayli.									
7 Octobre 1776.....	8	47	5	35	19	0	349	35	0
8 Octobre.....	8	49	0	35	32	0	350	10	0
Carteret.									
5 Février 1768.....	8	58	0	2	1	0	340	1	0
Cook et Bayli.									
3 Octobre 1776.....	9	0	0	35	32	0	350	10	0
Bougainville.									
En 1776.....	9	0	0	3	51	0	341	10	0
Cook.									
7 & 8 Octobre 1776...	9	0	32	35	31	0	349	55	0
.....	9	1	0	35	32	0	350	10	0
7 Octobre.....	9	1	40	35	30	0	350	10	0
Carteret.									
3 Février 1769.....	9	4	0	5	4	0	341	50	0
Bayli.									
4 Juin 1780.....	9	8	0	9	0	0	337	6	0
Carteret.									
4 Février 1769.....	9	10	0	3	26	0	340	46	0
Rosnevet.									
En 1763.....	9	10	0	3	9	0	337	51	0
Cook et Bayli.									
7 Octobre 1776.....	9	14	35	35	30	0	349	40	0
.....	9	18	10	35	30	0	349	40	0
.....	9	19	0	35	30	0	349	40	0
.....	9	19	30	35	19	0	349	35	0
8 Octobre.....	9	23	0	35	32	0	350	10	0
7 Octobre.....	9	23	35	35	30	0	349	40	0
8 Octobre.....	9	27	0	35	32	0	350	10	0
Carteret.									
2 Février 1769.....	9	34	0	6	45	0	342	53	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
9 Octobre 1776.....	9	41	0	35	32	0	350	10	0
Bougainville.									
En 1766.....	9	45	0	7	22	0	342	48	0
Rosnevet.									
En 1773.....	9	52	0	31	54	0	355	1	0
Wallis.									
23 Mars 1768.....	9	53	0	7	58	8	343	31	0
Cook.									
31 Mai 1780.....	9	56	10	12	0	0	341	43	0
Bayli.									
21 Septembre 1776.....	9	58	0	3	57	0	339	7	0
Wallis.									
24 Mars 1768.....	10	0	0	7	28	0	343	5	0
Bougainville.									
11 Janvier 1767.....	10	0	0	10	30	0	327	0	0
Cook et Bayli.									
7 Octobre 1776.....	10	0	50	35	30	0	349	40	0
9 Octobre.....	10	2	0	35	25	0	354	11	0
Rosnevet.									
En 1773.....	10	10	0	33	26	0	358	4	0
.....	10	10	0	34	5	0	2	6	0
Cook et Bayli.									
30 Mai 1780.....	10	13	30	12	0	0	341	43	0
.....	10	15	20	12	0	0	341	43	0
9 Octobre 1776.....	10	18	30	35	26	0	354	11	0
Bougainville.									
En 1766.....	10	25	0	7	37	0	344	17	0
Furneau.									
12 Février 1773.....	10	30	0	55	46	0	320	55	0
Cook et Bayli.									
7 Octobre 1776.....	10	31	30	35	19	0	349	35	0
Bayli.									
30 Mai 1780.....	10	33	0	13	34	0	342	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
9 Octobre 1776.....	10	25	41	25	26	0	354	11	0
.....	10	40	0	25	26	0	354	11	0
Bayli.									
31 Mai 1780.....	10	40	0	12	4	0	341	17	0
.....	10	43	50	12	0	0	341	43	0
9 Octobre 1776.....	10	45	0	35	26	0	354	11	0
2 Juin 1780.....	10	50	0	10	45	0	339	47	0
9 Octobre 1776.....	10	50	0	25	26	0	354	11	0
30 Mai 1780.....	10	57	0	12	54	0	341	55	0
Bougainville.									
En 1766.....	11	0	0	8	20	0	346	5	0
Bayli.									
27 Mars 1780.....	11	3	0	15	45	0	344	35	0
9 Octobre 1776.....	11	5	0	35	26	0	354	11	0
28 Mai 1780.....	11	8	20	14	24	0	343	31	0
27 Mai	11	10	0	15	5	0	344	17	0
28 Mai	11	22	0	14	24	0	343	31	0
Carteret.									
27 Janvier 1769.....	11	40	0	11	36	0	348	10	0
Bayli.									
24 Mai 1780.....	11	41	0	18	27	0	348	5	0
Carteret.									
25 Janvier 1769.....	11	47	0	12	54	0	349	30	0
Bougainville.									
En 1766.....	11	50	0	11	11	0	349	7	0
Cook.									
28 Mai 1780.....	11	52	8	14	24	0	343	31	0
Cook et Bayli.									
28 Mai 1780.....	11	57	20	14	24	0	343	31	0
Bougainville.									
En 1766.....	12	0	0	14	21	0	351	29	0
Cook et Bayli.									
28 Mai 1780.....	12	1	0	14	24	0	343	21	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
2 Décembre 1772.....	12	8	0	59	12	0	7	20	0
16 Février 1775.....	12	15	0	55	26	0	3	27	0
Bayli.									
23 Mai 1780.....	12	29	0	19	46	0	351	35	0
Carteret.									
19 Janvier 1769.....	12	30	0	14	22	0	350	31	0
Wallis.									
19 Mars 1768.....	12	47	0	15	57	0	351	46	0
15 Mars.....	12	50	0	16	26	0	355	30	0
Cook.									
28 Mai 1780.....	12	52	0	14	24	0	343	31	0
Wallis.									
15 Mars 1768.....	13	0	0	16	44	0	355	35	0
Cook.									
18 Février 1775.....	13	10	0	54	25	0	6	21	0
Rosnevet.									
En 1773.....	13	11	0	33	52	0	5	3	0
Carteret.									
19 Janvier 1769.....	13	46	0	16	6	0	355	57	0
Cook et Bayli.									
19 Mai 1780.....	13	49	0	24	40	0	357	11	0
Bougainville.									
En 1766.....	13	50	0	17	26	0	4	46	0
Bayli.									
22 Septembre 1776.....	13	56	0	33	46	0	0	5	0
19 Mai 1780.....	14	12	20	24	40	0	357	11	0
21 Mai.....	14	18	0	22	26	0	353	37	0
Rosnevet.									
En 1773.....	14	28	0	34	16	0	11	52	0
Bayli.									
21 Mai 1780.....	14	30	0	24	40	0	357	11	0
.....	14	35	0	24	40	0	357	11	0
Carteret.									
18 Janvier 1769.....	14	38	0	17	5	0	357	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
19 Mai 1780.....	14	47	33	24	40	0	357	11	0
24 Octobre 1776.....	15	8	0	33	55	0	1	29	0
5 Décembre 1772.....	15	15	30	47	10	0	15	19	0
Furneau.									
9 Février 1774.....	15	36	0	57	20	0	314	51	0
Bayli.									
19 Mai 1780.....	15	43	0	24	37	0	357	17	0
Carteret.									
14 Janvier 1769.....	16	19	0	22	16	0	2	27	0
Cook.									
9 Décembre 1769.....	16	30	0	49	46	0	17	33	0
Bougainville.									
En 1776.....	16	30	0	25	51	0	4	13	0
Carteret.									
15 Janvier 1769.....	16	31	0	21	4	0	1	29	0
Cook.									
19 Mai 1780.....	17	13	0	24	40	0	357	11	0
Furneau.									
En 1773.....	17	15	0	41	48	0	15	40	0
Bayli.									
28 Octobre 1776.....	17	16	0	33	57	0	8	53	0
17 Mai 1780.....	17	16	0	26	40	0	2	54	0
Rosnevet.									
En 1773.....	17	37	0	34	8	0	15	7	0
Bayli.									
4 Décembre 1772.....	17	51	0	45	46	0	15	39	0
6 Décembre.....	18	11	0	48	41	0	13	59	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	15	0	44	30	0	302	51	0
Bayli.									
3 Décembre 1772.....	18	16	0	44	28	0	15	50	0
27 Novembre.....	18	30	0	40	4	0	14	27	0
21 Juillet 1780.....	18	33	0	38	10	0	320	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
14 Octobre 1776.....	18	37	0	34	57	0	349	4	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	50	0	28	49	0	11	22	0
Cook.									
14 Octobre 1776.....	18	51	0	34	57	0	349	4	0
.....	18	55	0	34	57	0	349	4	0
Bayli.									
21 Juillet 1780.....	18	55	0	38	10	0	320	33	0
14 Octobre 1776.....	19	14	0	34	59	0	349	4	0
Rosnevet.									
En 1773	19	15	0	34	4	0	16	39	0
Bayli									
21 Juillet.....	19	16	34	38	10	0	320	33	0
.....	19	17	45	38	10	0	320	33	0
Furneau.									
7 Février 1774.....	19	20	0	59	16	0	310	17	0
Carteret.									
9 Janvier 1769.....	19	20	0	30	37	0	10	43	0
Cook.									
14 Octobre 1776.....	19	28	30	34	57	0	6	6	0
Furneau.									
4 Février 1774.....	19	30	0	60	20	0	304	15	0
Carteret.									
En Novembre 1768....	19	30	0	34	24	0	16	5	0
Bougainville.									
En 1766.....	19	45	0	45	4	0	301	18	0
.....	19	50	0	28	49	0	11	22	0
.....	19	56	0	45	33	0	300	13	0
Bayli.									
14 Mai 1780.....	19	58	0	30	8	0	8	17	0
Rosnevet.									
En 1773.....	20	15	0	34	16	0	17	58	0
Bayli.									
21 Juillet 1780.....	20	20	30	38	10	0	320	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	20	25	0	34	47	0	17	56	0
.....	20	40	0	32	47	0	14	27	0
Rosnevet.									
En 1773.....	20	45	0	34	20	0	19	23	0
Bayli.									
12 Mai 1780.....	20	56	0	32	43	0	14	5	0
7 Novembre 1776.....	21	15	0	34	13	0	14	25	0
2 Août 1780.....	21	26	30	44	50	0	334	5	0
.....	21	30	0	44	50	0	334	5	0
.....	21	36	45	44	50	0	334	5	0
14 Octobre 1776.....	21	47	0	34	57	0	6	6	0
Byron.									
10 Février 1765.....	22	0	0	34	15	0	335	50	0
Rosnevet.									
En 1773.....	22	0	0	35	27	0	15	31	0
.....	22	10	0	36	2	0	17	34	0
Cook.									
2 Août 1780.....	22	20	30	44	50	0	334	5	0
23 Décembre 1772.....	23	56	0	55	26	0	336	2	0
Furneau.									
3 Février 1773.....	24	30	0	60	4	0	299	52	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER DES INDES.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
14 Janvier 1780.....	0	2	0	19	25	0	111	25	0
20 Novembre 1769....	0	6	0	21	56	0	128	39	0
Carteret.									
14 Novembre 1767....	0	6	0	1	57	0	119	39	0
Cook et Bayli.									
19 Novembre 1769.....	0	24	40	22	14	0	128	41	0
1 Février 1780.....	0	25	40	1	4	0	103	8	0
Bayli.									
21 Novembre 1779.....	0	31	0	21	19	0	126	17	0
30 Janvier 1780.....	0	31	0	4	43	0	102	28	0
1 Février.....	0	32	40	1	4	0	103	8	0
Cook.									
1 Février 1780.....	0	34	25	1	4	0	103	8	0
Bayli.									
30 Janvier.....	0	36	0	3	37	0	102	30	0
19 Novembre 1779.....	0	39	0	22	14	0	128	41	0
Carteret.									
7 Novembre 1767.....	0	39	0	5	37	0	122	58	0
Cook.									
19 Novembre 1779.....	0	41	27	22	14	0	128	41	0
1 Février 1780.....	0	42	20	1	4	0	103	8	0
.....	0	46	53	1	4	0	103	8	0
Carteret.									
6 Novembre 1767.....	0	48	0	5	34	0	123	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
1 Février 1780.....	0	49	0	5	34	0	123	15	0
8 Novembre.....	0	50	0	5	30	0	122	16	0
Marion et Crozet.									
29 Novembre 1772....	1	0	0	12	44	0	121	3	0
Bayli.									
28 Novembre 1779.....	1	0	0	20	49	0	114	11	0
18 Novembre.....	1	0	40	22	14	0	128	41	0
.....	1	7	0	22	55	0	133	15	0
31 Janvier 1780.....	1	19	0	3	3	0	102	56	0
Carteret.									
27 Octobre 1767.....	1	20	0	5	34	0	124	0	0
30 Septembre.....	1	41	0	4	25	0	132	12	0
27 Octobre.....	1	45	0	6	15	0	124	55	0
27 Septembre.....	2	0	0	2	50	0	133	52	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	6	0	0	12	0	134	10	0
Carteret.									
27 Novembre 1767.....	2	9	0	2	13	0	134	16	0
27 Octobre.....	2	10	0	6	15	0	124	55	0
Cook.									
16 Novembre 1779....	2	17	0	25	3	0	136	31	0
Carteret.									
12 Octobre 1767.....	2	19	0	4	49	0	131	17	0
12 Octobre.....	2	20	0	5	12	0	131	2	0
Bayli.									
16 Novembre 1779....	2	29	30	24	57	30	136	18	0
16 Octobre.....	2	24	0	5	54	0	130	45	0
Cook.									
16 Novembre 1779.....	2	42	0	24	52	0	136	5	0
Carteret.									
24 Septembre 1767....	3	8	0	0	5	0	136	16	0
3 Octobre.....	3	9	0	4	41	0	130	26	0
9 Octobre.....	3	11	0	4	3	0	121	29	0
24 Septembre.....	3	14	0	4	41	0	130	26	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
6 Octobre.....	3	33	0	4	21	0	130	20	0
8 Octobre.....	3	28	0	3	53	0	131	48	0
	Déclinaison Ouest.								
Cook et Bayli.									
16 Janvier 1780.....	0	0	0	15	1	0	111	20	0
Bayli.									
31 Janvier.....	0	3	0	1	36	0	102	54	0
30 Janvier.....	0	4	20	3	21	0	102	38	0
16 Janvier.....	0	10	0	15	3	0	110	46	0
30 Janvier.....	0	11	40	3	21	0	102	28	0
Cook.									
21 Novembre 1779.....	0	14	40	21	18	0	126	21	0
1 Février 1780.....	0	16	40	1	4	0	103	8	0
Carteret.									
26 Novembre 1767.....	0	19	0	0	4	0	115	50	0
Bayli.									
1 Décembre 1779.....	0	21	0	22	7	0	111	12	0
19 Janvier 1780.....	0	28	0	8	58	0	104	28	0
Cook.									
16 Janvier 1780.....	0	28	53	15	1	0	111	20	0
Bayli.									
21 Novembre 1779.....	0	29	0	21	18	0	126	21	0
Cook.									
30 Janvier 1780.....	0	29	55	3	21	0	102	28	0
16 Janvier.....	0	32	40	21	18	0	126	21	0
20 Janvier 1780.....	0	33	20	21	18	0	126	21	0
16 Janvier.....	0	34	40	15	1	0	111	20	0
Byron.									
7 Novembre 1765.....	0	38	0	3	54	0	100	55	0
Cook.									
21 Novembre 1779.....	0	42	51	21	18	0	126	21	0
1 Février 1780.....	0	46	53	1	4	0	103	8	0
Cook et Bayli.									
30 Janvier 1780.....	0	50	40	3	21	0	102	38	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
16 Janvier 1780.....	0	52	0	15	1	0	111	20	0
30 Janvier 1780.....	0	53	0	3	21	0	102	38	0
21 Novembre 1779....	0	59	50	21	18	0	126	21	0
Bayli.									
28 Janvier 1780.....	1	0	0	7	11	0	103	33	0
21 Novembre 1779....	1	15	0	21	18	0	126	21	0
Cook.									
19 Novembre 1779....	2	43	40	22	14	0	128	41	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER DES INDES.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	0	22	0	4	29	0	124	53	0
.....	0	33	0	2	54	0	127	44	0
.....	0	40	0	1	52	0	129	53	0
Bayli.									
20 Février 1780.....	0	43	0	9	15	0	102	29	0
Furneau.									
6 Mars 1773.....	0	55	0	43	56	0	136	17	0
Bayli.									
23 Février 1780.....	1	3	0	12	46	0	101	11	0
Bougainville.									
En 1766.....	1	55	0	0	17	0	131	58	0
Cook.									
27 Août 1770.....	2	30	0	9	56	0	136	35	0
Bougainville.									
En 1766.....	3	5	0	1	16	0	137	22	0
Cook.									
21 Août 1770.....	3	6	0	10	36	0	35	59	0
Bayli.									
18 Janvier 1777.....	4	8	0	44	12	0	129	30	0
Bayli.									
17 Août 1769.....	4	9	0	12	38	0	34	20	0
23 Septembre 1776....	4	17	0	0	5	0	136	31	0
Bougainville.									
En 1766.....	4	28	0	2	10	0	138	39	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
27 Septembre 1776....	4	30	0	0	52	0	137	31	0
5 Juin 1770.....	5	35	0	19	12	0	30	5	0
24 Avril.....	7	54	0	35	19	0	27	17	0
7 Mai.....	7	56	0	33	22	0	25	35	0
6 Mai.....	8	0	0	33	50	0	22	35	0
10 Mai.....	8	0	0	33	2	0	25	5	0
18 Avril.....	8	36	0	25	34	0	24	20	0
25 Avril.....	8	48	0	34	29	0	25	39	0
5 Juin.....	9	0	0	19	12	0	30	5	0
11 Mai.....	9	10	0	32	2	0	25	5	0
20 Avril.....	10	42	0	36	18	0	27	30	0
30 Avril.....	11	3	0	34	0	0	26	2	0
10 Avril.....	11	25	0	38	51	0	20	18	0
14 Avril.....	11	30	0	39	30	0	21	37	0
13 Avril.....	12	27	0	29	23	0	21	35	0
11 Avril.....	13	48	0	38	30	0	20	35	0
29 Janvier 1774.....	23	35	0	70	0	0	105	2	0
4 Février.....	25	42	0	65	42	0	97	19	0
	Déclinaison Ouest.								
Wallis.									
26 Novembre 1767.....	0	0	0	4	10	0	172	49	0
Bayli.									
2 Février 1780.....	0	5	0	0	46	0	103	5	0
.....	0	7	0	1	40	0	103	7	0
Carteret.									
27 Novembre 1767.....	0	12	0	0	14	0	115	20	0
Bayli.									
25 Février 1780.....	0	18	0	13	40	0	98	56	0
1 Février.....	0	19	0	1	0	0	103	0	0
Cook.									
16 Février 1780.....	0	31	0	6	36	0	102	46	0
Bayli.									
18 Février.....	0	35	0	7	22	0	102	46	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	0	45	0	5	48	0	121	50	0
Baily.									
16 Mars 1773.....	0	47	30	44	1	0	132	50	0
Carteret.									
30 Septembre 1768....	0	51	0	7	41	0	99	11	0
Bayli.									
26 Février 1780.....	0	52	0	13	46	0	97	25	0
16 Février.....	0	54	0	6	36	0	102	46	0
Carteret.									
29 Mai 1768.....	0	56	0	5	29	0	107	58	0
En 1768.....	1	0	0	5	31	0	114	52	0
Wallis.									
16 Décembre 1767.....	1	0	0	6	41	0	101	5	0
Bougainville.									
En 1766.....	1	10	0	6	8	0	120	36	0
Cook.									
13 Septembre 1770.....	1	10	0	9	45	0	123	18	0
5 Février 1780.....	1	11	0	3	27	0	104	0	0
16 Février.....	1	14	15	6	36	0	102	46	0
Carteret.									
En Décembre 1767.....	1	16	0	5	30	0	115	28	0
Bougainville.									
En 1766.....	1	17	0	6	26	0	111	58	0
Wallis.									
1 Décembre 1767.....	1	25	0	6	8	0	103	5	0
Bougainville.									
En 1766.....	1	28	0	6	25	0	114	52	0
Furneau.									
1 Mars 1773.....	1	30	0	44	1	0	132	50	0
Cook.									
16 Février 1780.....	1	31	20	6	36	0	102	46	0
Bayli.									
2 Mars 1780.....	1	34	0	17	53	0	87	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
28 Février.....	1	51	0	15	45	0	95	8	0
16 Février.....	1	52	40	6	36	0	102	46	0
3 Mars.....	2	3	0	18	19	0	84	58	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	3	0	8	35	0	98	9	0
Carteret.									
2 Octobre 1768.....	2	6	0	10	37	0	94	54	0
Cook.									
29 Février 1780.....	2	37	10	15	58	0	92	35	0
22 Septembre 1770.....	2	44	0	11	10	0	107	57	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	50	0	14	40	0	91	59	0
Cook.									
En Mars 1771.....	3	0	0	6	49	0	70	47	0
26 Septembre 1770.....	3	10	0	10	47	0	107	43	0
3 Mars 1780.....	3	11	0	18	25	0	81	49	0
Carteret.									
4 Octobre 1768.....	3	12	0	12	13	0	91	31	0
Cook.									
3 Mars 1780.....	3	15	40	18	25	0	81	49	0
.....	3	16	0	18	25	0	81	49	0
.....	3	22	0	18	25	0	81	49	0
29 Février.....	3	26	0	15	58	0	92	35	0
Carteret.									
12 Octobre 1768.....	3	30	0	19	50	0	74	15	0
Cook et Bayli.									
29 Février 1780.....	3	36	40	15	58	0	92	35	0
Furneau.									
4 Mars 1773.....	3	50	0	44	50	0	129	55	0
3 Mars.....	3	51	0	18	25	0	81	49	0
Bougainville.									
En 1766.....	3	55	0	18	34	0	79	2	0
Bayli.									
6 Mars 1773.....	4	3	0	19	33	0	76	15	0
18 Janvier 1777.....	4	7	40	44	18	0	129	55	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	4	45	0	19	48	0	67	48	0
Bayli.									
8 Septembre 1770....	5	0	0	9	46	0	119	42	0
18 Janvier 1777.....	5	24	10	44	18	0	129	55	0
Cook.									
18 Janvier 1777.....	5	36	3	44	18	0	129	55	0
Bayli.									
9 Mars 1780.....	5	45	0	20	36	0	70	5	0
Cook.									
18 Janvier 1777.....	6	20	30	44	18	0	129	55	0
14 Octobre 1768.....	6	26	0	21	47	0	70	22	0
Cook et Bayli.									
17 Janvier 1777.....	6	32	0	44	14	0	126	14	0
Furneau.									
3 Mars 1773.....	6	35	0	46	22	0	127	56	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	43	0	19	48	0	67	48	0
Furneau.									
17 Janvier 1777.....	6	51	15	44	18	0	125	23	0
Bougainville.									
En 1766.....	7	10	0	19	54	0	65	55	0
Furneau.									
18 Janvier 1777.....	7	21	0	44	18	0	129	55	0
12 Mars 1780.....	7	38	0	21	10	0	65	55	0
Bayli.									
17 Janvier 1766.....	7	41	36	44	18	0	125	23	0
11 Mars 1780.....	7	52	0	21	4	0	66	55	0
12 Mars.....	8	26	20	21	10	0	65	55	0
Cook.									
17 Janvier 1777.....	8	41	36	44	18	0	125	23	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	55	0	19	46	0	64	7	0
Cook.									
12 Mars 1779.....	8	57	13	21	10	0	65	55	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
12 Mars 1780.....	9	5	0	21	10	0	65	55	0
.....	9	19	0	21	10	0	65	55	0
17 Janvier 1777.....	9	23	50	44	18	0	125	23	0
12 Mars 1780.....	9	26	0	21	10	0	65	55	0
17 Janvier 1777.....	9	26	45	44	18	0	125	23	0
Bougainville.									
En 1766.....	9	40	0	19	45	0	59	59	0
Cook.									
12 Mars 1773.....	9	49	0	58	56	0	129	16	0
12 Mars 1780.....	9	49	0	21	0	0	65	55	0
17 Janvier 1777.....	10	2	20	44	18	0	125	23	0
Bayli.									
13 Mars 1780.....	10	11	0	21	31	0	62	35	0
Furneau.									
1 Mars 1773.....	10	20	0	49	4	0	122	35	0
Cook.									
En 1771.....	10	20	0	23	0	0	62	35	0
En Mars 1771.....	10	20	0	23	0	0	112	35	0
Carteret.									
17 Octobre 1768.....	11	20	0	24	23	0	65	37	0
20 Octobre.....	11	48	0	24	59	0	64	10	0
Bougainville.									
En 1766.....	11	48	0	20	4	0	57	8	0
Carteret.									
18 Octobre 1768.....	11	50	0	25	8	0	64	56	0
Cook.									
11 Mars 1773.....	11	57	0	58	7	0	127	55	0
En Mars 1771.....	12	20	0	24	0	0	119	35	0
Carteret.									
25 Octobre 1768.....	12	39	0	23	23	0	61	10	0
Bayli.									
15 Mars 1780.....	12	45	0	23	9	0	58	55	0
Carteret.									
19 Octobre 1768.....	12	49	0	25	8	0	64	43	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
20 Octobre.....	12	54	0	24	59	0	64	10	0
24 Octobre.....	12	54	0	23	21	0	62	6	0
Bougainville.									
En 1766.....	13	22	0	19	52	0	54	38	0
Rosnevet.									
En 1773 & 1774.....	13	40	0	20	25	0	54	9	0
Carteret.									
26 Octobre 1768.....	13	42	0	23	32	0	60	18	0
Cook.									
17 Mars 1780.....	14	43	0	25	0	0	56	20	0
14 Janvier 1777.....	14	48	30	46	15	0	112	25	0
Rosnevet.									
En 1773.....	15	30	0	20	21	0	53	41	0
Furneau.									
28 Février 1773.....	15	47	0	50	20	0	119	24	0
Cook.									
14 Janvier 1777.....	15	51	30	46	15	0	112	25	0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	15	54	20	46	15	0	112	25	0
Carteret.									
28 Octobre 1768.....	16	10	0	24	52	0	57	49	0
Rosnevet.									
En 1773.....	16	20	0	26	0	0	59	38	0
Cook.									
10 Décembre 1772.....	16	29	0	51	4	0	17	58	0
14 Janvier 1771.....	16	50	18	46	15	0	112	26	0
Bougainville.									
En 1766.....	17	0	0	23	10	0	51	58	0
Rosnevet.									
En 1773.....	17	0	0	21	35	0	53	54	0
Cook.									
En Mars 1771.....	17	0	0	24	0	0	119	35	0
11 Décembre 1772.....	17	9	0	51	51	0	18	38	0
14 Janvier 1777.....	17	12	10	46	15	0	112	25	0
Rosnevet.									
En 1773.....	17	16	0	28	30	0	59	55	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
13 Janvier 1777.....	17	21	0	47	25	0	110	40	0
19 Mars 1780.....	17	35	0	26	29	0	52	23	0
13 Janvier 1777.....	17	40	0	25	9	0	56	15	0
18 Mars 1780.....	18	8	20	25	9	0	56	15	0
13 Janvier 1777.....	18	16	30	47	29	0	107	55	0
18 Mars 1780.....	18	17	40	25	9	0	56	15	0
Carteret.									
30 Octobre 1768.....	18	18	0	25	40	0	54	25	0
Cook.									
13 Janvier 1777.....	18	18	21	47	29	0	107	55	0
31 Octobre.....	18	24	0	26	31	0	52	24	0
13 Janvier 1777.....	18	30	20	47	29	0	107	55	0
Rosnevet.									
En 1773.....	18	31	0	17	28	0	47	36	0
Bougaingille.									
En 1766.....	18	40	0	24	12	0	51	0	0
Rosnevet.									
En 1773.....	18	43	0	25	9	0	53	28	0
.....	18	45	0	19	8	0	49	24	0
Cook.									
13 Janvier 1777.....	18	46	35	47	29	0	107	55	0
14 Janvier 1771.....	18	55	0	46	15	0	112	25	0
18 Mars 1780.....	18	59	40	25	9	0	56	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	19	3	0	18	48	0	47	53	0
Cook.									
18 Mars 1780.....	19	4	0	25	9	0	56	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	19	5	0	21	58	0	47	12	0
.....	19	8	0	22	58	0	52	2	0
Cook.									
18 Mars 1780.....	18	22	20	25	9	0	56	15	0
.....	19	29	20	25	9	0	56	15	0
28 Décembre 1772.....	19	30	0	58	44	0	19	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	19	20	0	23	1	0	49	44	0
Cook.									
18 Mars 1780.....	19	36	20	25	9	0	56	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	19	40	0	20	21	0	48	23	0
Carteret.									
1 Novembre 1768....	20	12	0	27	5	0	50	27	0
.....	20	20	0	27	5	0	50	27	0
Cook, à la Baye de la Table, au Cap de Bonne-espérance, en Mars 1771.....	20	30	0						
Rosnevet.									
En 1773.....	20	40	0	30	44	0	61	40	0
Cook.									
11 Mars 1775.....	20	48	0	40	56	0	21	22	0
17 Décembre.. 1772...	20	50	0	55	16	0	20	49	0
Rosnevet.									
En 1773.....	20	53	0	24	25	0	47	37	0
Carteret.									
3 Novembre 1768.....	20	58	0	27	40	0	48	30	0
Bayli.									
10 Janvier 1771.....	20	59	0	48	17	0	103	54	0
Carteret.									
5 Novembre 1768....	21	9	0	27	44	0	46	36	0
Bougainville.									
En 1766.....	21	10	0	35	27	0	19	55	0
Carteret.									
4 Novembre 1768....	21	15	0	27	42	0	47	45	0
3 Novembre.....	21	23	0	27	40	0	48	30	0
Cook.									
19 Décembre 1772.....	21	26	0	54	17	0	22	54	0
Bayli.									
21 Mars 1780.....	21	28	0	27	51	0	48	24	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	21	30	0	34	32	0	22	18	0
Furneau.									
26 Février 1773.....	21	30	0	51	22	0	113	7	0
Cook.									
10 Mars 1775.....	21	33	0	42	6	0	22	15	0
Carteret.									
23 Novembre 1768....	21	39	0	34	57	0	23	21	0
Bougainville.									
En 1766.....	21	40	0	27	16	0	44	30	0
Cook.									
5 Décembre 1776....	21	42	0	38	52	0	20	55	0
Carteret.									
24 Novembre 1768.....	21	44	0	34	52	0	22	35	0
Cook.									
21 Décembre 1772.....	21	47	0	53	50	0	26	59	0
5 Décembre 1776.....	22	12	45	38	52	0	20	55	0
Rosnevet.									
En 1773.....	22	15	0	27	28	0	44	39	0
Carteret.									
21 Novembre 1768....	22	18	0	35	46	0	24	35	0
Bougainville.									
En 1766.....	22	20	0	35	31	0	24	38	0
Cook.									
3 Mars 1775.....	22	26	0	45	8	0	28	25	0
12 Décembre 1776.....	22	30	0	46	37	0	35	25	0
Carteret.									
19 Novembre 1768....	22	32	0	35	17	0	26	13	0
6 Novembre.....	22	38	0	28	58	0	43	58	0
20 Novembre.....	22	46	0	35	42	0	24	57	0
22 Novembre.....	22	50	0	35	4	0	24	4	0
Rosnevet.									
En 1773.....	23	0	0	35	19	0	22	15	0
Bayli.									
5 Décembre 1776.....	23	14	0	39	10	0	21	4	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	23	15	0	34	28	0	37	7	0
Cook.									
10 Janvier 1777.....	23	26	25	48	26	0	104	35	0
Rosnevet.									
En 1773.....	23	30	0	36	4	0	21	10	0
.....	23	30	0	25	56	0	46	18	0
Cook.									
5 Décembre 1776.....	23	32	30	38	52	0	20	55	0
10 Décembre.....	23	35	0	44	8	0	30	15	0
1 Mars 1775.....	23	36	0	46	44	0	29	55	0
5 Décembre 1776.....	23	36	0	38	52	0	20	55	0
10 Janvier 1777.....	23	38	40	48	26	0	104	35	0
Bougainville.									
En 1766.....	23	41	0	32	41	0	29	14	0
Cook.									
10 Décembre 1776.....	23	56	0	44	8	0	30	15	0
Bayli.									
5 Avril 1780.....	23	58	0	35	56	0	19	21	0
Rosnevet.									
En 1773.....	24	0	0	36	8	0	62	1	0
Cook.									
En 1771.....	24	0	0	35	30	0	20	35	0
9 Janvier 1777.....	24	7	20	48	13	0	100	48	0
5 Décembre 1776.....	24	9	15	38	52	0	20	55	0
1 Janvier 1773.....	24	14	0	38	14	0	61	47	0
En Mars 1771.....	24	20	0	28	0	0	133	35	0
Bayli.									
3 Avril 1780.....	24	21	0	35	19	0	21	46	0
Rosnevet.									
En 1773.....	24	22	0	40	40	0	66	12	0
.....	24	30	0	40	28	0	64	36	0
.....	24	30	0	36	25	0	21	44	0
Bayli.									
10 Décembre 1776.....	24	30	30	44	8	0	30	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
7 Novembre 1768....	24	40	0	29	59	0	41	30	0
Cook.									
10 Décembre 1776.....	24	44	47	44	8	0	30	15	0
.....	24	46	0	44	8	0	30	15	0
Bayli.									
2 Avril 1780.....	24	50	0	33	41	0	26	1	0
20 Mars.....	24	53	0	31	18	0	29	54	0
10 Décembre 1776.....	24	54	0	44	8	0	30	15	0
Carteret.									
7 Novembre 1768.....	24	55	0	29	59	0	41	30	0
Rosnevet.									
En 1773.....	24	56	0	26	25	0	45	16	0
.....	25	0	0	39	24	0	62	40	0
Furneau.									
23 Février 1773.....	25	2	0	52	18	0	101	49	0
Carteret.									
12 Novembre 1768....	25	2	0	32	39	0	34	52	0
13 Novembre.....	25	5	0	33	21	0	33	2	0
.....	25	8	0	32	2	0	36	22	0
Cook et Bayli.									
8 Janvier 1777.....	25	10	0	47	18	0	97	51	0
24 Mars 1780.....	25	17	0	29	40	0	41	5	0
12 Décembre 1776.....	25	24	30	46	37	0	35	25	0
10 Décembre.....	25	29	0	47	18	0	97	51	0
Cook.									
8 Janvier 1777.....	25	30	0	47	18	0	97	51	0
Cook et Bayli.									
10 Décembre 1776.....	25	30	0	44	8	0	30	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	25	30	0	29	42	0	40	45	0
Carteret.									
10 Novembre 1768....	25	32	0	30	37	0	38	23	0
Cook.									
30 Mars 1780.....	25	34	20	31	12	0	29	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
24 Mars 1780.....	25	35	0	29	33	0	38	29	0
Cook.									
24 Mars 1780.....	25	35	40	29	40	0	41	5	0
Bayli.									
24 Mars 1780.....	25	39	0	30	12	0	40	26	0
Carteret.									
10 Novembre 1768....	25	39	0	30	12	0	40	26	0
Cook et Bayli.									
30 Mars 1780.....	25	40	0	31	12	0	29	35	0
12 Décembre 1776.....	25	43	0	46	37	0	35	25	0
Bayli.									
1 Avril 1780.....	25	44	0	33	18	0	26	29	0
8 Janvier 1777.....	25	45	0	47	18	0	97	51	0
Bougainville.									
En 1766.....	25	45	0	30	41	0	35	30	0
Carteret.									
9 Novembre 1768.....	25	50	0	30	19	0	39	12	0
Cook et Bayli.									
10 Décembre 1776.....	25	56	0	44	8	0	30	15	0
Rosnevet.									
En 1773.....	25	57	0	32	8	0	38	30	0
Cook.									
En 1771.....	26	0	0	29	0	0	40	35	0
12 Décembre 1776.....	26	0	29	46	37	0	35	25	0
Bayli.									
23 Mars 1780.....	26	2	0	29	3	0	41	21	0
Cook et Bayli.									
5 Décembre 1776.....	26	2	30	38	52	0	20	45	0
1 Janvier 1777.....	26	9	0	48	30	0	76	44	0
12 Décembre 1776.....	26	9	30	46	37	0	35	25	0
En Mars 1771.....	26	10	0	29	0	0	134	35	0
Rosnevet.									
En 1773.....	26	10	0	30	31	0	40	14	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
12 Septembre 1776.....	26	12	0	46	37	0	35	25	0
30 Mars 1780.....	26	14	0	31	12	0	29	35	0
Rosnevet.									
En 1773	26	15	0	37	58	0	39	18	0
Cook.									
30 Mars 1780.....	26	15	50	31	12	0	29	35	0
28 Mars.....	26	16	0	29	40	0	41	5	0
12 Décembre 1776.....	26	18	0	46	37	0	35	25	0
Bayli.									
28 Mars 1780.....	26	18	0	31	34	0	31	55	0
26 Mars	26	28	0	30	56	0	34	55	0
Rosnevet.									
En 1773.....	26	28	0	28	15	0	47	10	0
.....	26	30	0	40	25	0	38	36	0
.....	26	30	0	43	58	0	38	11	0
Bayli.									
24 Mars 1780.....	26	34	0	29	40	0	41	5	0
10 Décembre 1776.....	26	35	0	44	23	0	29	57	0
Rosnevet.									
En 1773.....	27	5	0	34	46	0	39	53	0
.....	27	7	0	35	0	0	33	11	0
Bayli.									
30 Mars 1780.....	27	8	0	31	12	0	29	35	0
.....	27	12	40	31	12	0	29	35	0
27 Octobre 1776.....	27	15	0	48	41	0	66	45	0
11 Janvier 1773.....	27	15	0	63	12	0	35	4	0
30 Mars 1780.....	27	16	0	31	12	0	29	35	0
Rosnevet.									
En 1773.....	27	18	0	25	4	0	35	3	0
Cook.									
12 Octobre 1776.....	27	19	0	46	37	0	35	25	0
24 Mars 1780.....	27	21	42	29	40	0	41	5	0
Rosnevet.									
En 1773.....	27	30	0	43	43	0	66	4	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
.....	27	30	0	34	6	0	41	42	0
Cook.									
24 Mars 1780.....	27	38	40	29	40	0	41	5	0
27 Octobre 1776.....	27	39	0	48	41	0	66	45	0
....	27	40	0	48	41	0	66	45	0
Rosnevet.									
En 1773.....	27	40	0	35	6	0	36	43	0
Cook.									
9 Janvier 1773.....	27	42	0	61	36	0	32	38	0
27 Décembre 1776.....	27	43	50	48	41	0	66	45	0
2 Février.....	27	50	0	48	36	0	57	10	0
Bayli.									
4 Janvier 1777.....	28	2	0	48	30	0	81	55	0
Cook et Bayli.									
28 Octobre 1776.....	28	4	0	48	41	0	66	45	0
.....	28	5	0	48	41	0	66	45	0
Cook.									
En 1771.....	28	15	0	34	0	0	24	35	0
12 Octobre.....	28	27	0	46	37	0	35	25	0
14 Janvier 1773.....	28	27	0	63	57	0	37	13	0
8 Mars 1773.....	28	35	0	59	44	0	118	42	0
1 Janvier 1777.....	28	49	0	48	31	0	76	44	0
4 Février.....	28	50	0	49	16	0	56	29	0
Bayli.									
1 Janvier 1777.....	28	52	0	48	20	0	77	35	0
Rosnevet.									
En 1773.....	29	0	0	33	54	0	39	59	0
Bayli.									
1 Février 1773.....	29	3	0	48	30	0	55	42	0
10 Février.....	29	4	0	50	7	0	62	28	0
Furneau.									
21 Février 1773.....	29	5	0	52	20	0	107	37	0
Rosnevet.									
En 1773.....	29	5	0	46	12	0	41	39	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
14 Décembre 1776....	29	11	0	48	0	0	42	19	0
1 Janvier 1777.....	29	26	0	48	31	0	76	44	0
17 Janvier 1773.....	29	30	0	67	15	0	37	10	0
27 Décembre 1776....	29	32	0	48	41	0	66	28	0
3 Janvier 1777.....	29	37	0	48	16	0	83	5	0
31 Octobre 1776.....	29	45	0	48	41	0	74	34	0
3 Janvier 1777.....	29	59	0	48	16	0	83	5	0
Rosnevet.									
En 1773.....	30	0	0	49	11	0	40	35	0
Bayli.									
22 Janvier 1773.....	30	0	0	54	28	0	49	21	0
3 Janvier 1777.....	30	8	15	48	16	0	83	5	0
14 Octobre 1776.....	30	23	0	47	56	0	42	2	0
5 Février 1773.....	30	26	0	49	8	0	55	53	0
24 Mars 1780.....	30	28	0	29	40	0	41	5	0
27 Octobre 1776.....	30	28	0	48	41	0	66	28	0
Cook.									
3 Janvier 1777.....	30	33	49	48	16	0	83	5	0
Bayli.									
27 Décembre 1776.....	30	34	30	48	41	0	66	28	0
Cook.									
14 Octobre 1777.....	30	36	45	47	56	0	42	2	0
31 Décembre 1776.....	30	39	0	48	41	0	74	34	0
Cook et Bayli.									
27 Octobre 1776.....	30	43	0	48	41	0	66	28	0
14 Octobre.....	30	45	0	47	56	0	42	4	0
Furneau.									
20 Février 1773.....	30	46	0	52	22	0	94	43	0
14 Octobre 1776.....	30	48	15	47	56	0	42	2	0
31 Janvier 1773.....	30	49	0	50	50	0	54	23	0
1 Janvier 1777.....	30	53	0	48	31	0	76	44	0
Rosnevet.									
En 1773.....	30	53	0	47	58	0	64	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Furneau.									
14 Octobre 1776.....	30	59	45	47	56	0	42	2	0
Rosnevet.									
En 1773.....	31	0	0	49	36	0	55	4	0
.....	31	0	0	48	6	0	64	57	0
.....	31	0	0	47	21	0	65	11	0
Cook.									
14 Décembre 1776.....	31	7	45	47	56	0	42	2	0
21 Janvier 1773.....	31	16	0	62	48	0	39	0	0
24 Mars 1780.....	31	24	40	29	40	0	41	5	0
7 Février 1773.....	31	28	0	48	51	0	59	23	0
6 Mars.....	31	30	0	60	4	0	115	35	0
Rosnevet.									
En 1773.....	31	30	0	48	18	0	65	5	0
.....	31	30	0	48	29	0	65	9	0
Cook.									
14 Décembre 1776.....	31	31	0	47	56	0	42	2	0
31 Décembre.....	31	33	0	48	41	0	74	34	0
14 Décembre.....	31	40	0	47	56	0	42	2	0
3 Janvier 1777.....	31	44	0	48	16	0	83	5	0
Bayli.									
24 Décembre 1776.....	31	51	0	48	37	0	66	27	0
Rosnevet.									
En 1773.....	32	0	0	48	53	0	59	43	0
Bayli.									
12 Février 1773.....	32	5	0	52	48	0	68	10	0
31 Décembre 1776.....	32	17	30	48	16	0	83	5	0
14 Décembre.....	32	18	15	47	56	0	42	2	0
27 Janvier 1773.....	32	23	0	56	28	0	48	22	0
6 Février.....	32	24	0	48	6	0	56	18	0
Furneau.									
13 Février 1773.....	32	30	0	51	5	0	68	58	0
Cook.									
13 Février 1773.....	33	8	0	53	54	0	69	59	0
23 Janvier.....	33	28	0	60	4	0	44	20	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
24 Janvier..... Furneau.	33	52	0	58	24	0	46	40	0
13 Février 1773..... Cook.	34	14	0	51	40	0	72	27	0
14 Février 1774..... Furneau.	34	18	0	55	23	0	72	23	0
16 Février 1773..... Cook.	35	0	7	52	12	0	76	11	0
15 Février 1773.....	38	19	0	56	52	0	76	23	0
18 Février.....	38	21	0	57	57	0	81	19	0
3 Mars.....	39	4	0	60	17	0	107	34	0
20 Février.....	40	11	30	58	47	0	89	19	0
22 Février.....	40	51	0	59	35	0	91	11	0
25 Février.....	43	6	0	60	49	0	92	50	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER PACIFIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
25 Octobre 1779.....	0	23	0	40	2	0	140	35	0
Cook.									
19 Novembre 1779.....	0	41	27	22	14	0	128	41	0
Bayli.									
31 Octobre 1779.....	0	48	0	35	24	0	139	35	0
Cook.									
19 Novembre 1779....	1	7	0	35	24	0	139	35	0
Bayli.									
25 Octobre 1779.....	1	8	0	40	9	0	141	29	0
26 Octobre.....	1	21	0	39	28	0	140	23	0
31 Octobre.....	1	21	0	35	24	0	139	35	0
27 Octobre.....	1	23	0	38	17	0	140	34	0
31 Octobre.....	1	29	0	35	24	0	139	35	0
22 Octobre.....	1	30	0	40	29	0	145	44	0
Cook.									
31 Octobre 1779.....	1	31	43	35	24	0	139	35	0
Bayli									
31 Octobre.....	1	36	0	35	24	0	139	35	0
Cook.									
22 Octobre.....	1	38	0	40	29	0	145	35	0
Bayli.									
29 Octobre.....	1	42	0	37	42	0	139	0	0
Cook.									
26 Octobre 1779.....	1	48	0	39	28	0	140	23	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
31 Octobre.....	2	3	0	35	34	0	139	35	0
22 Octobre.....	2	11	0	40	29	0	145	44	0
16 Octobre.....	2	15	0	39	28	0	146	23	0
Bayli.									
22 Octobre.....	2	16	0	40	29	3	145	44	0
31 Octobre.....	2	17	0	35	34	0	139	35	0
Cook et Bayli.									
30 Octobre 1779.....	2	18	0	36	32	0	139	25	0
.....	2	23	30	36	32	0	139	25	0
Cook.									
13 Novembre.....	2	26	0	24	42	0	140	42	0
Bayli.									
31 Octobre.....	2	28	0	35	40	0	139	39	0
13 Novembre.....	2	29	0	24	42	0	140	42	0
30 Octobre.....	2	29	0	36	32	0	139	25	0
16 Novembre.....	2	29	30	24	57	30	136	18	0
13 Novembre.....	2	31	0	24	42	0	140	42	0
Cook.									
22 Octobre 1779.....	2	34	10	40	29	0	145	44	0
Bayli.									
15 Novembre.....	2	35	0	25	6	0	138	41	0
13 Novembre.....	2	36	0	24	42	0	140	43	0
Cook.									
13 Novembre.....	2	51	33	24	42	0	140	42	0
Bayli.									
5 Novembre.....	2	55	0	35	3	0	141	25	0
Cook.									
21 Octobre.....	3	4	0	41	11	0	146	25	0
.....	3	6	0	41	11	0	146	25	0
13 Novembre.....	3	9	50	24	42	0	140	42	0
.....	3	12	0	24	42	0	140	42	0
Bayli.									
14 Novembre.....	3	14	0	24	34	0	139	37	0
12 Novembre.....	3	16	20	26	17	0	141	46	0
4 Novembre.....	3	18	0	35	42	0	144	31	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
21 Octobre 1779.....	3	21	30	41	11	0	146	25	0
5 Novembre.....	3	23	0	35	3	0	141	25	0
Bayli.									
13 Novembre.....	3	25	0	24	43	0	140	5	0
5 Novembre.....	3	29	0	35	3	0	141	25	0
22 Octobre.....	3	35	0	40	29	0	145	44	0
5 Novembre.....	3	35	0	35	3	0	141	25	0
13 Novembre.....	3	36	20	24	42	0	140	42	0
5 Novembre.....	3	38	0	35	3	0	141	25	0
Cook.									
5 Novembre 1779.....	3	40	0	26	17	0	141	46	0
.....	3	40	43	35	3	0	141	25	0
12 Novembre.....	3	44	10	26	17	0	141	45	0
Bayli.									
5 Novembre 1779.....	3	48	0	35	3	0	144	39	0
14 Novembre.....	3	49	0	24	51	0	139	13	0
17 Octobre.....	3	53	0	44	29	0	150	55	0
21 Octobre.....	4	0	0	42	20	0	147	16	0
13 Octobre.....	4	10	0	49	37	0	154	22	0
21 Octobre.....	4	12	0	41	11	0	146	25	0
12 Novembre.....	4	12	0	26	17	0	141	46	0
5 Novembre.....	4	13	0	35	3	0	141	25	0
30 Avril.....	4	14	0	52	58	0	156	25	0
22 Octobre.....	4	15	0	40	29	0	145	44	0
17 Octobre.....	4	18	0	44	29	0	150	55	0
15 Octobre.....	4	20	0	46	16	0	153	5	0
.....	4	21	0	45	29	0	152	20	0
14 Octobre.....	4	30	0	47	57	0	153	0	0
5 Novembre.....	4	32	0	35	3	0	141	25	0
15 Octobre.....	4	36	0	46	16	0	153	5	0
17 Octobre.....	4	37	0	44	29	0	150	55	0
13 Novembre.....	4	39	0	25	35	0	140	42	0
Cook.									
15 Octobre 1779.....	4	40	0	46	16	0	153	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
14 Octobre.....	4	42	0	46	44	0	153	5	0
Bayli.									
14 Octobre 1779.....	4	42	0	46	44	0	153	5	0
23 Décembre 1777.....	4	42	40	1	1	0	200	6	0
Bayli.									
18 Juin 1779.....	4	43	0	52	43	0	156	34	0
15 Octobre.....	4	44	0	46	16	0	153	5	0
17 Octobre.....	4	50	0	44	30	0	153	9	0
.....	4	51	0	44	29	0	150	55	0
Cook.									
17 Octobre 1779.....	4	55	45	44	29	0	150	55	0
Bayli.									
27 Décembre 1777.....	4	58	0	1	58	0	200	4	0
15 Octobre 1779.....	5	0	0	46	16	0	153	5	0
Cook et Bayli.									
15 Octobre 1779.....	5	0	0	45	29	0	152	20	0
17 Octobre.....	5	0	0	45	2	0	153	13	0
15 Octobre.....	5	1	0	45	29	0	152	20	0
12 Octobre.....	5	6	0	50	3	0	154	37	0
17 Octobre.....	5	7	0	44	29	0	150	55	0
Bayli.									
15 & 17 Octobre 1779..	5	7	30	45	15	30	153	12	0
21 Août.....	5	8	0	53	14	0	159	25	0
10 Janvier 1778.....	5	10	0	9	42	0	202	15	0
12 Octobre 1779.....	5	10	0	50	50	0	154	55	0
17 Octobre.....	5	10	0	44	29	0	150	55	0
18 juin.....	5	11	30	52	43	0	156	34	0
17 Octobre.....	5	12	0	44	29	0	150	55	0
15 Octobre.....	5	15	0	45	29	0	153	11	0
Wallis.									
17 Octobre 1767.....	5	15	0	16	10	0	141	10	0
Cook et Bayli.									
27 Décembre 1777.....	5	17	0	1	58	0	200	4	0
17 Avril 1779.....	5	17	0	43	43	0	157	39	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
12 Octobre 1779.....	5	17	30	50	52	30	154	45	0
24 Décembre 1777.....	5	18	0	1	52	0	200	0	0
25 Décembre.....	5	18	0	1	57	0	200	0	0
12 Octobre 1779.....	5	20	0	50	3	0	154	37	0
26 Décembre 1777.....	5	22	0	1	57	0	200	5	0
12 Octobre 1779.....	5	22	0	50	57	0	154	55	0
5 Janvier 1778.....	5	24	40	5	35	0	200	35	0
Cook.									
15 Octobre 1779.....	5	24	20	45	29	0	152	20	0
12 Octobre 1779.....	5	25	0	50	55	0	154	35	0
Bayli.									
10 Janvier 1778.....	5	25	30	9	42	0	202	15	0
8 Janvier.....	5	26	0	7	59	0	202	20	0
14 Avril 1779.....	5	26	0	46	48	0	154	5	0
3 Mai.....	5	27	0	52	57	0	156	25	0
Cook et Bayli.									
1 Janvier 1779.....	5	31	0	19	26	0	202	28	0
12 Octobre.....	5	33	0	50	57	0	154	55	0
Bayli.									
24, 25 & 26 Décembre 1777.....	5	34	0	50	3	0	154	37	0
.....	5	34	48	1	56	0	200	2	30
.....	5	35	0	50	3	0	154	37	0
Cook.									
27 Décembre 1777.....	5	36	10	1	58	0	200	4	0
12 Octobre 1779.....	5	37	20	50	3	0	154	37	0
10 Janvier 1778.....	5	41	0	9	42	0	202	15	0
12 Octobre 1779.....	5	41	0	50	57	0	154	55	0
Cook.									
15 Avril 1779.....	5	42	15	42	10	0	157	51	0
27 Décembre 1777.....	5	44	40	1	58	0	155	6	0
5 Janvier 1778.....	5	46	40	5	35	0	200	35	0
21 Août 1779.....	5	48	0	53	14	0	159	25	0
5 Janvier 1778.....	5	48	20	5	35	0	200	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
3 Mai	5	50	0	57	57	0	156	25	0
26 Décembre 1777.....	5	50	0	1	57	0	200	5	0
Bayli.									
7 Janvier 1778	5	51	0	7	33	0	202	5	0
15 Octobre 1779.....	5	51	0	45	29	0	152	20	0
21 Août	5	53	0	53	14	0	159	25	0
8 Janvier 1778	5	54	0	7	48	0	202	59	0
12 Janvier.....	5	55	0	13	55	0	200	41	0
15 Octobre 1779.....	5	55	0	45	29	0	152	20	0
Cook.									
14 Octobre 1779.....	5	56	0	46	48	0	154	5	0
12 Janvier 1778	5	56	40	13	55	0	200	41	0
30 Avril & 3 Mai 1770..	5	57	0	52	57	30	156	25	0
Bayli.									
29 Avril 1779.....	6	0	0	52	46	0	156	50	0
.....	6	0	0	52	41	0	157	5	0
Cook et Bayli.									
11 Octobre 1779.....	6	0	0	51	3	0	155	55	0
3 Mai.....	6	1	0	52	57	0	156	25	0
Cook et Bayli.									
30 Avril	6	3	0	52	58	0	156	25	0
20 Mai.....	6	3	0	52	28	0	156	20	0
Cook.									
12 Octobre 1779.....	6	3	10	50	57	0	154	55	0
26 Décembre 1767.....	6	6	0	1	57	0	200	5	0
21 Mai 1779.....	6	6	0	52	58	0	156	20	0
30 Avril.....	6	7	0	52	58	0	156	25	0
21 Août.....	6	7	0	52	57	0	156	25	0
14 Octobre.....	6	7	0	46	48	0	154	5	0
Bayli.									
22 Décembre 1777.....	6	8	0	0	24	0	200	35	0
Cook.									
5 Janvier 1778	6	8	30	5	35	0	200	35	0
Bayli.									
30 Avril 1779.....	6	9	0	52	38	0	156	25	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
27 Avril.....	6	9	0	52	22	0	157	58	0
28 Avril.....	6	10	0	52	28	0	156	50	0
3 Mai.....	6	10	0	52	41	0	157	5	0
22 Décembre 1777.....	6	10	45	0	29	0	200	9	0
5 Janvier 1778.....	6	11	30	5	35	0	200	35	0
12 Octobre 1779.....	6	14	0	50	3	0	154	37	0
14 Octobre.....	6	15	0	46	48	0	154	5	0
18 Mai.....	6	16	0	52	28	0	156	20	0
Cook.									
21 Août 1779.....	6	16	50	53	14	0	159	25	0
17 Octobre.....	6	18	40	1	58	0	200	4	0
Cook.									
27 Décembre 1777.....	6	19	22	1	56	45	200	2	30
23 Décembre.....	6	20	0	1	1	0	200	6	0
15 Octobre 1779.....	6	20	0	45	29	0	152	20	0
23 Décembre 1777.....	6	20	15	1	1	0	200	16	0
12 Octobre.....	6	21	0	50	57	0	154	55	0
23 Décembre.....	6	21	40	1	55	0	200	1	0
Bayli.									
Du 31 Avril au 21 Mai 1779.....	6	22	0	52	28	0	156	20	0
Cook.									
5 Janvier 1778.....	6	22	0	5	35	0	200	10	0
11 Janvier 1779.....	6	24	40	12	0	0	201	56	0
15 Avril.....	6	24	41	42	10	0	157	51	0
Bayli.									
5 Janvier 1779.....	6	25	0	5	36	0	200	15	0
27 Décembre 1777.....	6	26	0	1	55	0	200	1	0
30 Avril 1779.....	6	27	0	52	58	0	156	25	0
Cook.									
12 Janvier 1778.....	6	27	2	13	55	0	200	41	0
27 Décembre 1777.....	6	27	20	1	55	0	200	1	0
30 Août 1779.....	6	28	0	52	57	0	156	34	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
11 Octobre 1779.....	6	28	0	51	30	0	156	0	0
16 Mai.....	6	28	0	52	28	0	156	20	0
27 Décembre 1777.....	6	29	0	1	58	0	200	4	0
18 Avril 1779.....	6	29	0	48	20	0	158	56	0
18 Mai.....	6	30	0	52	28	0	156	20	0
Cook.									
22 Décembre 1777.....	6	31	20	0	29	0	200	9	0
17 Avril 1779.....	6	31	30	43	43	0	157	39	0
22 Décembre 1777.....	6	31	30	0	29	0	200	9	0
7 Janvier 1778.....	6	31	50	7	40	0	202	25	0
8 Janvier.....	6	33	0	7	48	0	202	49	0
.....	6	34	50	7	48	0	202	49	0
Bayli.									
3 Mai 1779.....	6	36	0	52	41	0	157	5	0
15 Avril.....	6	36	30	42	10	0	157	51	0
1 Janvier.....	6	37	0	19	26	0	202	28	0
7 Janvier 1778.....	6	38	50	7	40	0	202	25	0
8 Janvier.....	6	38	50	7	48	0	202	49	0
3 Mai 1779.....	6	39	0	52	57	0	156	25	0
7 Janvier 1778.....	6	39	10	7	40	0	202	25	0
Cook.									
22 Décembre 1777.....	6	39	11	0	29	0	200	9	0
12 Octobre 1779.....	6	40	0	50	57	0	154	55	0
.....	6	42	0	50	57	0	154	55	0
7 Janvier 1778.....	6	46	17	7	40	0	202	15	0
Cook et Bayli.									
22 Décembre 1777.....	6	47	0	0	29	0	200	9	0
Bayli.									
15 Mai 1779.....	6	47	0	52	41	0	157	5	0
Cook.									
8 Janvier 1778.....	6	47	33	7	48	0	202	39	0
.....	6	49	50	7	48	0	202	49	0
7 Janvier 1779.....	6	50	10	7	40	0	202	25	0
1 Janvier 1779.....	6	50	10	19	26	0	202	28	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
15 Avril.....	6	51	0	42	10	0	157	51	0
Bayli.									
21 Avril.....	6	52	0	50	39	0	159	42	0
21 Août.....	6	52	0	53	14	0	159	25	0
7 Janvier 1778.....	6	53	0	7	40	0	202	25	0
21 Août 1779.....	6	53	0	53	14	0	159	25	0
12 Janvier 1779.....	6	53	30	13	55	0	200	41	0
23 Décembre 1777....	6	55	10	1	1	0	200	6	0
11 Janvier 1778.....	6	56	0	12	0	0	201	56	0
11 Octobre 1779.....	6	56	0	51	57	0	156	5	0
15 Janvier 1778.....	6	59	0	18	1	0	198	40	0
23 Décembre 1777.....	6	59	30	1	1	0	200	6	0
Marion et Crozet.									
En Septembre 1772....	7	0	0	13	26	0	141	30	0
Cook.									
11 Janvier 1778.....	7	0	7	12	0	0	201	56	0
Cook et Bayli.									
27 Décembre 1778.....	7	1	10	19	15	0	202	26	0
12 Janvier.....	7	3	0	13	55	0	200	41	0
22 Décembre 1777....	7	8	20	0	29	0	200	9	0
Cook.									
1 Janvier 1779.....	7	10	52	19	20	30	202	27	0
23 Décembre.....	7	11	20	1	1	0	200	6	0
27 Décembre.....	7	11	20	1	55	0	200	1	0
Bayli.									
21 Août 1779.....	7	13	0	53	14	0	159	25	0
.....	7	14	0	53	50	0	159	25	0
27 Décembre 1778.....	7	16	55	19	15	0	202	26	0
1 Janvier 1779.....	7	17	5	19	26	0	202	28	0
Cook et Bayli.									
11 Janvier 1778.....	7	18	13	12	0	0	201	56	0
27 Décembre.....	7	20	15	19	15	0	202	26	0
Bayli.									
18 Avril 1779.....	7	24	0	48	18	0	158	5	0
17 Juin.....	7	24	0	52	44	0	157	21	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
11 Janvier 1778.....	7	27	0	12	0	0	201	56	0
18 Avril 1779.....	7	27	30	48	20	0	158	56	0
27 Décembre 1777.....	7	29	40	1	55	0	200	1	0
27 Décembre 1778.....	7	31	5	19	15	0	202	26	0
.....	7	31	15	19	15	0	202	26	0
Bayli.									
27 Décembre 1777.....	7	32	40	1	55	0	200	1	0
10 Janvier 1779	7	34	0	18	46	0	202	2	0
11 Janvier 1778	7	36	0	12	0	0	201	56	0
1 Janvier 1779	7	36	15	19	26	0	202	28	0
18 Mars.....	7	43	0	48	20	0	158	56	0
4 Janvier 1778.....	7	45	0	19	29	0	203	35	0
27 Mars 1779.....	7	46	0	43	43	0	157	39	0
4 & 5 Janvier 1778...	7	46	20	19	29	30	203	15	0
5 Janvier 1778.....	7	47	0	19	5	0	202	36	0
27 Décembre	7	49	10	19	15	0	202	26	0
1 Janvier 1779	7	49	15	19	26	0	202	28	0
16 Avril	7	52	0	42	50	0	157	46	0
8 Janvier 1778.....	7	55	10	7	48	0	202	39	0
3 Janvier.....	7	57	0	20	3	0	204	11	0
19 Avril 1779.....	7	58	0	49	40	0	158	36	0
7 Avril	8	3	20	30	30	0	165	51	0
Bayli.									
29 Novembre 1778.....	8	4	40	21	16	0	201	55	0
18 Avril 1779.....	8	10	30	48	20	0	158	56	0
Cook et Bayli.									
13 Janvier 1778.....	8	11	0	21	56	0	197	47	0
18 Mars 1779.....	8	12	0	21	12	0	192	43	0
2 Janvier...	8	12	0	20	13	0	204	11	0
30 Novembre 1778.....	8	13	0	20	5	0	202	12	0
Bayli.									
17 Juin 1779.....	8	13	0	52	45	0	156	46	0
1, 2 & 3 Janvier 1779..	8	13	30	20	6	15	204	15	30
15 Janvier 1778.....	8	17	0	18	42	0	198	31	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1 Janvier 1779	8	18	0	20	9	0	204	20	0
23 Janvier 1778	8	20	40	21	56	0	197	47	0
3 & 29 Novembre.....	8	22	30	20	4	30	202	4	0
15 Janvier 1778	8	22	30	18	42	0	198	33	0
1 Janvier 1779	8	27	0	20	0	0	204	20	0
15 Janvier 1778.....	8	28	0	18	42	0	198	35	0
Cook.									
18 Juin 1779.....	8	28	30	18	38	0	198	46	0
23 Janvier.....	8	28	30	21	56	0	197	47	0
18 Juin.....	8	29	30	52	43	0	156	34	0
29 Novembre 1778.....	8	32	0	20	4	0	201	56	0
15 Janvier.....	8	33	40	18	1	0	198	50	0
18 Mars 1779	8	36	0	21	12	0	192	43	0
27 Janvier 1778	8	39	30	21	22	0	197	49	0
18 Juin 1779.....	8	40	30	52	43	0	156	34	0
29 Novembre 1778.....	8	44	10	21	16	0	201	55	0
19 Janvier 1778	8	46	0	21	54	0	197	47	0
18 Juin 1779.....	8	46	0	52	43	0	156	34	0
Cook.									
15 Janvier 1778.....	8	47	30	18	1	0	198	50	0
27 Janvier.....	8	49	50	21	22	0	197	39	0
19 Janvier.....	8	52	0	21	56	0	197	45	0
20 Janvier.....	8	52	0	21	44	0	197	35	0
7 Avril 1779.....	8	52	0	30	30	0	165	51	0
Cook et Bayli.									
18 Mars 1779	8	53	0	21	12	0	192	43	0
18 Juin.....	8	53	0	52	43	0	156	34	0
15 Janvier 1778.....	8	54	20	18	1	0	198	50	0
Cook.									
7 Avril 1779.....	8	55	0	18	38	0	198	46	0
.....	8	56	30	18	38	0	198	46	0
.....	8	56	50	30	30	0	165	51	0
18 Juin 1779.....	8	59	0	52	43	0	156	34	0
Bayli.									
25 Février.....	8	59	0	21	3	0	200	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
15 Janvier 1778.....	9	0	0	18	1	0	198	50	0
16 Janvier.....	9	1	0	20	4	0	198	25	0
20 Juin 1779.....	9	1	0	55	13	0	160	41	0
17 Janvier 1778.....	9	1	5	21	8	0	198	24	0
7 Avril 1779.....	9	2	0	30	30	0	165	51	0
18 Juin.....	9	2	30	52	43	0	156	34	0
7 Avril.....	9	5	0	30	30	0	165	51	0
18 Juin.....	9	6	0	52	43	0	156	34	0
Cook.									
18 Mars 1779.....	9	9	40	21	12	0	192	43	0
20 Avril.....	9	10	0	49	54	0	158	37	0
Bayli.									
29 Novembre 1778.....	9	12	0	21	16	0	201	55	0
27 Janvier.....	9	13	0	21	22	0	197	39	0
24 Février 1779.....	9	13	0	20	36	0	200	43	0
Cook.									
29 Novembre 1778.....	9	14	42	21	16	0	201	55	0
20 Juin 1779.....	9	15	0	55	13	0	160	41	0
.....	9	15	0	55	49	0	161	25	0
7 Avril.....	9	16	4	30	30	0	165	51	0
Bayli.									
25, 26 & 28 Janvier 1778.	9	16	40	21	35	20	197	35	0
29 Novembre.....	9	18	35	21	16	0	201	55	0
17 Mars 1779.....	9	20	0	21	13	0	194	17	0
20 Juin.....	9	20	0	55	34	30	161	5	0
25 Janvier 1778.....	9	21	0	21	26	0	197	35	0
21 Juin 1779.....	9	21	0	56	1	0	161	47	0
Cook.									
15 Janvier 1778.....	9	21	27	18	19	30	198	48	0
Cook et Bayli.									
7 Avril 1779.....	9	22	0	30	30	0	165	51	0
20 Avril.....	9	22	0	49	54	0	158	37	0
27 Janvier 1778.....	9	23	10	21	22	0	197	39	0
.....	9	24	0	21	7	0	198	10	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
20 Juin 1779	9	24	0	55	13	0	160	41	0
15 Janvier 1778	9	26	0	18	38	0	198	46	0
2 Février	9	26	0	22	47	0	197	35	0
4 Février	9	26	0	24	48	0	196	44	0
Bayli.									
18 Juin 1779	9	26	0	49	54	0	158	38	0
18 Mars	9	26	0	21	12	0	192	43	0
16 Août	9	29	0	53	54	0	168	7	0
17 & 18 Janvier 1778	9	29	30	21	20	30	198	10	0
18 Avril 1779	9	32	0	21	12	0	192	43	0
18 Juin 1778	9	33	0	52	43	0	156	34	0
18 Janvier	9	35	0	21	34	0	197	50	0
3 & 4 Février	9	35	0	24	30	30	196	44	30
20 Juin 1779	9	35	0	55	13	0	160	41	0
18 Juin	9	36	0	52	43	0	156	34	0
26 Janvier 1778	9	37	0	21	36	0	197	35	0
21 Juin 1779	9	37	0	56	1	0	161	47	0
17 Juin 1778	9	39	5	21	8	0	198	24	0
20 Avril 1779	9	41	0	49	54	0	158	37	0
18 Juin	9	41	0	52	43	0	156	34	0
Cook.									
17 Janvier 1778	9	41	40	21	8	0	198	24	0
18 Juin 1779	9	42	30	52	43	0	156	34	0
2 Avril 1779	9	43	30	49	54	0	158	37	0
Bayli.									
3 Février 1778	9	44	0	24	13	0	196	45	0
6 & 8 Janvier 1779	9	44	30	18	58	0	201	35	30
17 Mars	9	45	0	21	13	0	156	43	0
Cook.									
20 Juin 1779	9	45	40	55	13	0	160	41	0
17 Août	9	47	0	21	42	0	165	39	0
Bayli.									
18 Mars 1779	9	51	0	21	13	0	192	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
17 Janvier 1778.....	9	51	38	21	8	0	198	24	0
21 Juin 1779.....	9	52	0	56	1	0	161	47	0
19 & 23 Janvier 1778..	9	53	9	21	56	30	197	55	0
17 Août 1779.....	9	55	30	53	42	0	165	39	0
21 Juin.....	9	56	0	56	1	0	161	47	0
17 Août.....	9	58	0	56	1	0	161	47	0
15 Janvier 1758.....	9	59	20	18	38	0	198	46	0
Bayli.									
17 Août 1779.....	10	0	0	53	42	0	165	46	0
29 Novembre.....	10	0	0	21	16	0	201	55	0
Marion et Crozet.									
En 1772.....	10	0	0	18	0	0	176	43	0
Bayli.									
8 Avril 1779.....	10	3	0	30	51	0	164	36	0
6 Janvier 1779.....	10	3	0	19	25	0	201	25	0
16 Mars.....	10	3	0	21	26	0	196	16	0
Cook.									
17 Mars 1779.....	10	3	40	21	13	0	194	17	0
29 Novembre 1778....	10	7	40	21	16	0	201	55	0
21 Juin 1779.....	10	8	0	56	1	0	161	47	0
17 Janvier 1778.....	10	9	50	21	8	0	198	24	0
27 & 28 Janvier.....	10	9	53	21	29	0	197	35	0
15 Janvier.....	10	10	20	18	1	0	198	50	0
17 Janvier.....	10	10	30	21	8	0	198	24	0
6 Janvier 1779.....	10	11	0	18	57	0	201	50	0
Bayli.									
21 Juin.....	10	11	0	56	6	0	161	38	0
19 Janvier 1778.....	10	11	40	21	57	0	198	3	0
3 Février.....	10	14	0	24	13	0	197	25	0
5 Mars 1779.....	10	14	0	21	57	0	197	36	0
7 Avril 1779.....	10	15	0	30	8	0	165	56	0
5 Mars.....	10	15	0	21	57	0	197	36	0
27 Janvier 1778.....	10	16	0	21	22	0	197	39	0
13 Janvier 1779.....	10	16	0	19	3	0	201	47	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
7 Avril.....	10	16	0	30	8	0	165	56	0
17 Mars.....	10	16	0	21	13	0	194	17	0
3 Février 1778.....	10	18	30	24	13	0	197	25	0
Cook et Bayli.									
18 Mars 1779.....	10	19	0	21	12	0	192	43	0
27 Janvier 1778.....	10	20	0	21	22	0	197	39	0
17 Mars 1779.....	10	20	0	21	13	0	194	17	0
14 Février 1778.....	10	22	0	31	39	0	203	38	0
17 Mars 1779.....	10	24	0	21	13	0	194	17	0
20 Avril.....	10	24	0	49	54	0	158	37	0
Bayli.									
28 Février.....	10	25	0	21	59	0	198	9	0
5 Mars 1779.....	10	26	0	21	57	0	197	36	0
17 Janvier 1778.....	10	27	40	21	8	0	199	24	0
Cook.									
5 Mars 1779.....	10	28	10	21	57	0	197	36	0
15 Janvier.....	10	29	10	18	1	0	198	50	0
17 Août 1779.....	10	30	0	53	42	0	165	39	0
5 Mars.....	10	32	0	21	57	0	197	36	0
20 Juin.....	10	36	0	55	13	0	160	41	0
15 Janvier 1778.....	10	37	0	18	1	0	198	50	0
Bayli.									
19 Mars 1779.....	10	37	0	20	56	0	191	47	0
17 Mars.....	10	39	0	21	16	0	194	23	0
28 Janvier 1778.....	10	40	0	21	36	0	197	32	0
5 Mars 1779.....	10	40	0	21	57	0	197	36	0
2 Mars.....	10	41	0	20	41	0	190	23	0
21 Mars.....	10	41	0	20	32	0	189	47	0
14 Février 1778.....	10	41	45	31	39	0	203	38	0
12 Août 1779.....	10	42	0	56	12	0	172	35	0
5 Mars 1779.....	10	42	0	21	57	0	197	36	0
20 Juin.....	10	43	0	55	13	0	160	41	0
11 Juillet.....	10	43	0	57	14	0	170	8	0
27 Février 1779.....	10	46	0	22	13	0	199	29	0
24 Mars.....	10	46	0	19	57	0	183	20	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
12 Mars.....	10	50	0	21	49	0	197	3	0
Cook.									
12 Août 1779.....	10	51	0	56	12	0	172	35	0
24 Mars.....	10	51	0	19	54	0	183	20	0
12 Mars.....	10	54	0	21	49	0	197	3	0
21 Mars.....	10	54	0	20	34	0	189	33	0
12 Mars.....	10	59	0	21	49	0	197	3	0
20 Mars.....	10	59	0	20	41	0	190	23	0
27 Mars.....	10	59	0	19	51	0	179	56	0
Bayli.									
9 Avril 1779.....	11	0	0	30	27	0	165	54	0
10 Août.....	11	0	0	57	33	0	173	27	0
Cook.									
20 Mars 1779.....	11	0	20	20	41	0	190	23	0
17 Février 1778.....	11	2	46	36	10	0	204	20	0
14 Février 1778.....	11	3	51	31	39	0	203	38	0
3 Février.....	11	4	7	24	13	0	197	25	0
28 Janvier.....	11	4	20	21	36	0	197	32	0
12 Avril 1779.....	11	8	0	56	12	0	172	35	0
19 Janvier 1778.....	11	9	0	21	57	0	198	3	0
28 Mars 1779.....	11	9	0	19	57	0	183	31	0
1 Avril.....	11	9	0	22	23	0	177	6	0
12 Mars.....	11	10	0	21	49	0	197	3	0
21 Mars.....	11	12	0	20	34	0	189	33	0
12 Mars.....	11	14	0	21	49	30	197	3	0
20 Mars.....	11	15	0	20	41	0	190	23	0
19 Janvier 1778.....	11	16	0	21	57	0	198	3	0
Bayli.									
23 Juin 1779.....	11	16	0	58	9	0	163	21	0
14 Février 1778.....	11	17	0	31	39	0	203	38	0
24 Mars 1779.....	11	17	0	19	57	0	183	20	0
Cook et Bayli.									
21 Mars 1779.....	11	20	0	20	34	0	189	33	0
3 Février 1778.....	11	20	50	24	13	0	197	25	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
1 Avril 1779.....	11	21	30	22	23	0	177	6	0
20 Mars.....	11	22	0	21	49	0	197	3	0
24 Mars.....	11	23	0	19	57	0	183	20	0
12 Mars.....	11	24	0	21	49	0	197	7	0
21 Mars.....	11	25	25	20	34	0	189	33	0
Bayli.									
12 Août.....	11	27	0	55	32	0	168	15	0
28 Mars.....	11	28	0	20	15	0	178	5	0
6 Février 1778.....	11	29	40	28	39	0	197	44	0
3 Février.....	11	30	50	24	13	0	197	12	0
23 Mars 1779.....	11	32	0	19	52	0	186	17	0
27 Mars.....	11	33	0	19	51	0	179	56	0
Cook.									
23 & 24 Mars.....	11	33	12	19	57	0	183	25	0
1 Avril.....	11	33	40	12	23	0	177	6	0
Cook.									
10 Août 1779.....	11	34	0	57	33	0	173	27	0
24 Mars.....	11	35	0	19	57	0	183	20	0
23 Janvier 1778.....	11	35	40	21	56	0	197	57	0
3 Février.....	11	35	40	24	13	0	197	25	0
Bayli.									
12 Août 1779.....	11	37	0	56	17	0	169	21	0
23 Mars.....	11	37	30	19	57	0	183	31	0
28 Janvier 1778.....	11	38	10	21	36	0	197	32	0
6 Février.....	11	39	0	28	35	0	197	26	0
10 Août 1779.....	11	39	0	57	32	0	171	53	0
14 Février 1778.....	11	41	50	31	39	0	203	38	0
21 Mars 1779.....	11	43	0	20	34	0	189	33	0
12 Août.....	11	43	0	56	12	0	172	35	0
24 Mars.....	11	48	0	19	59	0	183	45	0
25 Mars.....	11	49	0	19	52	0	179	2	0
Cook et Bayli.									
4 Février 1778.....	11	49	50	24	50	0	197	12	0
6 Février.....	11	50	0	28	39	0	197	44	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
15 Novembre.....	11	53	0	22	55	0	201	55	0
21 Mars 1779.....	11	54	0	20	34	0	189	33	0
27 Mars.....	11	54	0	19	51	0	179	56	0
Cook.									
15 & 16 Novembre 1778.	11	56	30	22	25	0	201	55	0
23 Mars 1779.....	11	57	0	19	57	0	193	31	0
13 Février 1778.....	12	0	0	31	37	0	203	39	0
16 Novembre.....	12	0	0	22	55	0	201	55	0
23 Mars 1779.....	12	1	0	19	57	0	193	31	0
6 Février 1778.....	12	1	45	28	39	0	197	44	0
Bayli.									
9 Février.....	12	3	0	31	6	0	199	15	0
27 Mars 1779.....	12	3	0	20	2	0	178	24	0
24 Juin.....	12	3	0	58	34	0	164	51	0
23 Juin.....	12	5	0	58	6	0	164	35	0
28 Janvier 1778.....	12	6	10	21	36	0	197	32	0
Cook.									
12 Mars 1779.....	12	7	0	21	49	0	197	3	0
26 & 27 Mars.....	12	7	40	19	50	0	180	10	0
10 Août.....	12	8	0	57	33	0	173	27	0
6 Février 1778.....	12	10	19	28	39	0	197	44	0
23 Juin.....	12	12	0	58	6	0	164	35	0
24 Juin.....	12	12	0	58	37	0	165	45	0
6 Février.....	12	13	10	28	39	0	197	44	0
4 Février.....	12	17	30	24	50	0	197	12	0
Bayli.									
13 Février 1778.....	12	20	30	31	33	30	203	44	0
26 Mars 1779.....	12	22	0	19	49	0	180	24	0
31 Mars.....	12	22	0	20	38	0	177	35	0
24 Juin.....	12	22	0	59	1	0	165	37	0
14 Novembre 1778.....	12	23	0	21	16	0	201	55	0
8 Février.....	12	28	0	30	53	0	199	8	0
23 Mars 1779.....	12	32	0	19	57	0	183	31	0
14 Novembre 1778	12	39	0	33	46	0	205	1	0
13 Février.....	12	41	0	31	30	0	203	39	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
4 Février 1778.....	12	41	52	24	50	0	197	12	0
17 Février.....	12	43	20	36	10	0	204	20	0
16 Mars 1779.....	12	44	0	19	49	0	180	24	0
Bayli.									
17 Février 1778.....	12	49	40	24	50	0	197	12	0
14 Novembre.....	12	52	0	21	16	0	201	55	0
26 Mars 1779.....	12	52	0	19	49	0	180	24	0
3 Avril.....	12	55	0	24	51	0	173	1	0
26 Mars.....	12	56	0	19	49	0	180	24	0
Cook.									
24 Juin 1779.....	13	3	0	58	37	0	165	45	0
23 Juin.....	13	3	10	58	6	0	164	35	0
14 Novembre 1778....	13	3	58	21	16	0	201	55	0
24 Juin 1779.....	13	10	20	58	37	0	165	45	0
.....	13	13	0	58	37	0	165	45	0
4 Février 1778.....	13	15	10	24	50	0	197	12	0
23 Juin 1769.....	13	17	0	58	6	0	164	35	0
24 Juin.....	13	18	0	58	6	0	164	35	0
.....	13	22	0	58	37	0	165	45	0
9 Février 1778.....	13	22	10	31	4	0	200	0	0
8 Février.....	13	25	0	30	55	0	199	52	0
Bayli.									
27 Juin 1779.....	13	29	0	30	55	0	199	52	0
14 Novembre.....	13	30	0	21	16	0	201	55	0
9 Février.....	13	30	30	31	4	0	200	0	0
24 Juin 1779.....	13	32	0	58	37	0	165	45	0
Cook.									
17 Février 1778.....	13	32	49	36	10	0	204	20	0
Bayli.									
6 Février 1778.....	13	34	30	24	50	0	197	12	0
14 Novembre 1778....	13	34	40	21	16	0	201	55	0
Bayli.									
27 Juin 1779.....	13	37	0	60	28	0	173	4	0
23 Juin.....	13	38	0	58	6	0	164	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
6 Février 1778.....	13	40	0	28	39	0	197	44	0
24 Juin 1779.....	13	40	0	58	37	0	165	45	0
17 Février 1778.....	13	42	40	36	10	0	204	20	0
.....	13	46	0	36	6	0	203	31	0
9 Février.	13	48	55	31	4	0	200	0	0
23 Juin 1779.....	13	49	0	58	6	0	164	35	0
Cook.									
8 & 9 Février 1778....	14	1	18	30	59	45	199	51	0
Bayli.									
8 Février 1778.....	14	13	50	30	55	0	199	42	0
Cook.									
8 & 9 Février.....	14	25	40	30	55	0	199	42	0
9 Février.....	14	32	5	31	4	0	200	0	0
.....	14	36	45	31	4	0	200	0	0
Bayli.									
19 Février 1777.....	14	38	0	37	30	0	204	38	0
8 Février 1778.....	14	39	40	30	55	0	199	42	0
9 Février.....	14	43	10	31	4	0	200	0	0
18 Février 1777.....	14	52	0	37	15	0	203	37	0
21 Février.....	15	10	0	40	2	0	207	44	0
8 Novembre 1778.....	15	29	40	40	29	0	198	59	0
19 Février.....	15	38	20	37	30	0	199	55	0
8 Novembre.....	15	41	10	40	29	0	198	59	0
22 Février 1777.....	15	42	0	40	27	0	209	42	0
11 Mars 1778.....	15	47	0	43	37	0	232	39	0
Cook.									
8 Novembre 1778....	16	1	35	40	29	0	198	59	0
.....	16	3	40	40	29	0	198	59	0
.....	16	6	40	40	29	0	198	59	0
Bayli.									
18 Mars 1778.....	16	8	0	44	44	0	231	51	0
18 Février.....	16	10	40	37	15	0	203	50	0
19 Mars.....	16	13	0	45	3	0	231	35	0
8 Novembre.....	16	14	40	40	29	0	198	59	0
20 Février.....	16	20	50	37	30	0	203	55	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
22 Février.....	16	22	0	41	2	0	213	15	0
8 Novembre.....	16	22	0	40	20	0	199	50	0
7 Mars.....	16	26	0	44	26	0	232	49	0
13 Août.....	16	27	20	66	36	0	189	40	0
20 Février.....	16	31	15	37	30	0	203	55	0
8 Novembre.....	16	33	40	40	29	0	198	59	0
22 Février.....	16	34	30	47	36	0	233	10	0
8 Mars.....	16	38	0	43	50	0	232	52	0
Cook.									
22 Mars 1778.....	16	38	0	47	36	0	233	10	0
Bayli.									
7 & 8 Novembre 1778.	16	40	30	40	33	30	199	47	0
Cook.									
18 & 19 Février 1778...	16	42	21	37	22	30	204	52	0
Bayli.									
17 Février 1778.....	16	42	30	36	10	0	204	20	0
24 Février.....	16	44	0	41	46	0	215	19	0
21 Février.....	16	47	40	39	14	0	209	29	0
18 Février.....	16	48	40	37	15	0	203	50	0
21 Février.....	16	51	45	39	14	0	209	29	0
19 Février.....	16	53	40	37	30	0	203	55	0
18 Février.....	16	56	40	37	15	0	203	50	0
7 Novembre.....	16	59	0	40	47	0	199	44	0
19 Février.....	16	59	20	37	15	0	203	50	0
Cook.									
20 Février 1778.....	17	2	33	38	16	0	205	35	0
18 Février.....	17	4	40	37	15	0	203	50	0
Bayli.									
28 Février 1778.....	17	5	0	44	27	0	224	50	0
19 Février.....	17	6	50	37	30	0	203	55	0
20 Février.....	17	8	0	38	16	0	205	35	0
6 Novembre.....	17	12	0	42	13	0	208	52	0
7 Août 1779.....	17	12	0	59	16	0	178	23	0
29 Juin.....	17	12	0	61	50	0	176	1	0
24 Mars 1778.....	17	15	0	47	47	0	232	9	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
27 Mars.....	17	17	0	48	8	0	229	44	0
21 Février.....	17	17	45	39	14	0	209	29	0
6 Mars.....	17	22	0	44	30	0	232	30	0
19 Mars.....	17	22	40	45	5	0	231	50	0
1 Mars.....	17	30	0	44	54	0	226	21	0
27 Juillet.....	17	30	10	59	39	0	187	57	0
28 Février 1778.....	17	33	0	44	46	0	225	15	0
Cook.									
21 Février 1778.....	17	36	20	39	14	0	209	29	0
.....	17	37	15	39	14	0	209	29	0
1 Mars.....	17	38	20	44	52	0	225	53	0
6 Août 1779.....	17	40	0	59	47	0	181	58	0
Bayli.									
4 Mars 1778.....	17	42	0	43	57	0	229	15	0
6 Août 1779.....	17	42	0	59	47	0	181	58	0
Cook.									
19 Mars 1778.....	17	51	44	45	5	0	231	50	0
.....	17	54	45	45	5	0	231	50	0
7 Août 1779.....	17	56	0	59	27	0	182	12	0
20 Février 1778.....	17	56	50	38	16	0	205	35	0
19 Mars.....	17	58	10	45	5	0	231	50	0
7 Août 1779.....	18	5	0	59	27	0	182	12	0
6 Août.....	18	6	0	59	47	0	181	58	0
Cook et Bayli.									
19 Mars 1778.....	18	11	20	45	5	0	231	50	0
6 Août 1779.....	18	15	0	59	47	0	181	58	0
Bayli.									
1 & 2 Mars 1778.....	18	20	0	59	47	0	181	58	0
.....	18	20	40	44	50	40	226	23	20
Cook.									
1 Février 1778.....	18	21	0	39	14	0	209	29	0
6 & 7 Août 1779.....	18	25	15	59	37	0	182	5	0
Bayli.									
1 Mars.....	18	26	0	44	51	0	226	25	0
7 Août 1779.....	18	26	0	59	30	0	180	55	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
24 Février 1778.....	18	29	0	39	14	0	209	29	0
28 Juin 1779.....	18	31	0	62	5	0	173	19	0
1 Mars 1778.....	18	31	30	44	52	0	225	53	0
27 Juillet.....	18	31	40	59	39	0	187	57	0
.....	18	34	20	59	39	0	187	57	0
21 Février.....	18	34	35	39	14	0	209	29	0
Cook.									
27 Juillet 1778.....	18	40	23	59	39	0	187	57	0
16 Juin.....	18	44	5	55	37	0	199	14	0
27 Juillet.....	18	52	35	59	39	0	187	57	0
21 Février.....	18	53	50	39	14	0	209	29	0
7 Août 1779.....	18	55	0	59	27	0	182	12	0
27 Juillet 1778.....	18	56	25	59	39	0	187	57	0
22 Février 1778.....	18	58	37	40	25	0	210	5	0
7 Août 1779.....	19	1	0	59	27	0	182	12	0
13 Juillet 1778.....	19	2	15	58	8	0	196	9	0
2 Mars.....	19	6	0	44	47	0	226	24	0
25 Juillet.....	19	6	0	58	31	0	189	35	0
1 Août 1779.....	19	8	10	64	12	0	187	13	0
Bayli.									
25 & 26 Juillet 1778....	19	8	30	58	40	0	189	35	0
22 Février 1778.....	19	10	35	40	25	0	210	5	0
26 Juillet.....	19	11	0	58	49	0	189	35	0
28 Février.....	19	12	7	44	46	0	225	53	0
Cook et Bayli.									
16 Juin 1778.....	19	13	35	55	37	0	199	14	0
1 Août 1779.....	19	14	40	64	12	0	187	13	0
Cook.									
27 Mars 1778.....	19	17	0	48	15	0	230	5	0
1 Mars.....	19	19	10	44	52	0	225	53	0
22 Février.....	19	29	5	40	25	0	210	5	0
7 Août 1779.....	19	31	0	59	27	0	182	12	0
1 Août.....	19	34	50	64	12	0	187	13	0
27 Juillet 1778.....	19	37	10	59	39	0	187	57	0
28 Juin 1779.....	19	37	40	62	10	0	174	31	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
27 Août 1778.....	19	39	0	48	15	0	230	5	0
1 Août 1779.....	19	42	50	64	12	0	187	13	0
1 Août	19	46	51	64	12	0	187	13	0
1 Mars 1778.....	19	48	55	44	52	0	225	53	0
7 Août 1779.....	19	50	0	59	27	0	182	12	0
28 Février 1778.....	19	52	18	44	49	0	225	49	0
28 Juin.....	19	55	40	62	10	0	174	31	0
1 Août	20	2	15	64	12	0	187	13	0
Bayli.									
2 Juillet 1778.....	20	4	0	54	34	0	191	25	0
28 Juin 1779.....	20	5	30	62	10	0	174	31	0
30 Avril 1778.....	20	15	0	53	38	0	224	30	0
21 Juin.....	20	15	0	53	49	0	195	16	0
16 Juin.....	20	16	40	55	37	0	199	14	0
18 Juin.....	20	17	0	55	12	0	199	14	0
22 Septembre.....	20	17	0	61	34	0	186	49	0
28 Février.....	20	17	50	44	46	0	225	45	0
.....	20	17	55	44	46	0	225	45	0
12 Juin.....	20	18	0	55	37	0	199	14	0
27 Septembre 1778.....	20	20	0	58	38	0	186	51	0
12 Juin 1778.....	20	21	50	56	20	0	203	35	0
10 Octobre.....	20	22	0	53	55	0	191	5	0
Cook.									
16 Juin.....	20	23	22	55	37	0	199	14	0
Bayli.									
12 Octobre.....	20	24	0	53	54	0	191	5	0
10 & 11 Octobre 1778...	20	25	0	55	55	0	191	5	0
26 Juin.....	20	25	0	53	51	0	191	28	0
Cook.									
28 Juin 1779.....	20	25	6	62	10	0	174	31	0
13 Juillet.....	20	25	35	58	8	0	196	9	0
11 Octobre.....	20	28	0	53	55	0	191	5	0
26 & 27 Septembre 1778.....	20	29	0	58	39	30	187	5	0
30 Avril.....	20	30	0	53	37	0	222	42	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
28 Juin 1779.....	20	30	55	62	10	0	174	31	0
Cook.									
12 Juin 1778.....	20	30	55	56	20	0	203	35	0
28 Février.....	20	31	25	44	46	0	225	45	0
.....	20	36	30	44	46	0	225	45	0
13 Juillet.....	20	37	50	58	8	0	196	9	0
Bayli.									
27 Octobre.....	20	38	0	58	41	0	186	51	0
Cook.									
13 Juillet 1778.....	20	39	13	58	8	0	196	9	0
12 Juin	20	40	30	56	20	0	203	35	0
Bayli.									
21 Juin.....	20	46	0	54	11	0	195	28	0
28 Juin 1779.....	20	48	0	62	10	0	174	31	0
28 Février 1778.....	20	48	45	44	46	0	225	45	0
29 Avril.....	21	3	0	53	6	0	230	55	0
13 Juillet.....	21	7	50	58	8	0	196	9	0
Cook.									
30 Avril 1778.....	21	12	0	53	37	0	222	42	0
24 Juillet 1779.....	21	12	55	68	43	0	184	37	0
30 Avril 1778.....	21	13	30	58	8	0	196	9	0
12 Juillet.....	21	14	15	58	31	0	197	38	0
13 Juillet	21	28	20	58	8	0	196	9	0
19 Juillet.....	21	30	0	59	37	0	195	2	0
28 Juin 1779.....	21	32	55	62	10	0	174	31	0
Cook et Bayli.									
24 Juillet 1779.....	21	37	0	68	43	0	184	37	0
.....	21	37	25	68	43	0	184	37	0
17 Juin 1778.....	21	37	30	55	25	0	198	13	0
24 Juillet 1779.....	21	38	45	68	43	0	184	37	0
16 Juin 1778.....	21	42	15	55	37	0	199	14	0
Cook.									
24 Juillet 1779.....	21	47	52	68	43	0	185	37	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
28 Septembre.....	21	49	0	57	55	0	188	15	0
17 Juin.....	21	50	0	55	27	0	199	15	0
30 Avril.....	21	52	0	53	37	0	222	42	0
13 Juin.....	21	52	0	56	40	0	203	25	0
12 Juillet.....	21	58	45	58	31	0	197	38	0
30 Septembre.....	22	0	0	56	29	0	190	35	0
19 & 20 Juillet 1778....	22	2	30	59	37	45	195	5	0
5 Juillet.....	22	4	0	56	59	0	196	46	0
8 Mai.....	22	4	10	59	26	0	224	56	0
16 Juin.....	22	6	30	55	37	0	199	14	0
24 Juillet 1779.....	22	7	25	68	43	0	184	37	0
17 Juin 1778.....	22	7	50	55	25	0	198	13	0
20 Juillet.....	22	9	0	59	37	0	195	2	0
.....	22	13	0	59	37	0	195	2	0
29 Septembre.....	22	15	0	56	37	0	189	57	0
8 Mai.....	22	15	45	59	26	0	224	56	0
5 & 6 Juillet.....	22	19	0	56	57	30	197	6	0
19 Septembre.....	22	20	0	63	49	0	190	58	0
9 Juillet.....	22	20	45	55	18	0	199	12	0
22 Mai.....	22	20	50	55	12	0	222	35	0
16 Juin.....	22	21	0	55	47	0	200	5	0
31 Juillet 1779.....	22	22	45	64	56	0	186	53	0
Cook.									
19 Septembre 1778.....	22	23	0	63	49	0	190	58	0
Cook et Bayli.									
20 Juillet 1778.....	22	23	20	59	37	0	195	2	0
5 Mai.....	22	23	0	58	58	0	218	29	0
Cook.									
17 Juin 1778.....	22	24	40	55	25	0	198	13	0
19 Juillet.....	22	25	20	59	37	0	194	58	0
12 Juillet.....	22	25	35	58	31	0	197	38	0
8 Mai.....	22	25	50	59	26	0	224	56	0
8 Juillet 1778.....	22	27	10	59	26	0	224	56	0
24 Juillet 1779.....	22	27	45	68	43	0	184	37	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
31 Juillet 1779.....	22	32	0	64	35	0	187	11	0
Cook.									
5 Mai 1778.....	22	32	15	58	58	0	218	19	0
17 Juin.....	22	32	23	55	25	0	198	13	0
12 Juillet.....	22	32	23	58	31	0	197	38	0
6 Juillet.....	22	34	0	56	56	0	197	24	0
31 Juillet 1779.....	22	34	20	64	56	0	187	52	0
8 Mai 1778.....	22	34	30	59	26	0	224	56	0
Bayli.									
29 Juillet.....	22	41	0	60	18	0	195	13	0
3 Mai.....	22	43	45	58	58	0	218	19	0
2 Août 1779.....	22	44	0	64	5	0	200	5	0
9 Juillet 1778.....	22	45	0	55	18	0	199	12	0
20 Juillet.....	22	45	0	59	38	0	195	8	0
Cook.									
20 Juillet 1778.....	22	45	20	59	37	0	195	2	0
17 Juin.....	22	46	5	55	25	0	198	13	0
31 Juillet 1779.....	22	46	35	64	56	0	186	53	0
20 Juillet 1778.....	22	46	40	59	37	0	195	2	0
16 Juillet.....	22	47	0	58	46	0	195	47	0
9 Juillet.....	22	47	30	55	18	0	199	12	0
19 Juillet.....	22	47	40	59	37	0	194	58	0
Bayli et Cook.									
20 Juillet 1778.....	22	47	40	59	37	0	195	2	0
Bayli.									
31 Juillet 1778.....	22	48	0	61	54	0	187	5	0
Cook.									
9 Juillet 1778.....	22	48	33	55	18	0	199	12	0
24 Mai.....	22	49	15	58	16	0	205	47	0
31 Juillet 1779.....	22	52	25	64	56	0	186	53	0
9 Juillet 1778.....	22	53	50	55	18	0	199	12	0
20 Mai.....	22	54	50	59	39	0	208	27	0
9 Juillet.....	22	55	0	55	18	0	199	12	0
8 Mai.....	22	55	8	59	26	0	224	56	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
31 Juillet	22	56	45	64	56	0	186	53	0
17 Juin	22	59	15	55	25	0	198	13	0
2 Août 1779	23	0	5	64	56	0	186	53	0
12 Juillet 1778	23	4	15	58	31	0	197	38	0
.....	23	8	45	58	31	0	197	38	0
Bayli.									
1 Mai	23	9	0	56	26	0	221	57	0
5 Mai	23	9	10	58	53	0	218	19	0
9 Juillet	23	9	15	55	18	0	199	12	0
14, 15 & 16 Juillet	23	9	40	58	31	0	196	12	20
2 Mai	23	11	0	57	17	0	221	45	0
15 Juillet	23	14	0	58	29	0	196	15	0
5 Mai	23	14	45	58	53	0	218	19	0
11 Septembre	23	15	5	64	20	0	196	42	0
17 Juin	23	19	0	55	25	0	198	13	0
19 Juillet	23	22	20	59	37	0	194	58	0
12 Juillet	23	22	45	58	31	0	197	38	0
20 Mai	23	25	10	59	39	0	208	27	0
3 Juillet 1779	23	27	0	63	42	0	184	30	0
3 Mai 1778	23	27	40	58	14	0	218	16	0
Cook et Bayli.									
14 Juillet 1778	23	28	0	58	18	0	196	15	0
1 Mai	23	29	30	55	12	0	222	35	0
3 Mai	23	31	10	58	14	0	218	16	0
19 Juillet	23	32	20	59	37	0	194	58	0
Cook.									
31 Juillet 1779	23	34	0	64	56	0	186	53	0
19 Juillet 1778	23	34	36	59	37	0	194	58	0
Bayli.									
9 Juillet 1778	23	37	0	58	11	0	199	33	0
30 Juillet 1779	23	37	0	65	36	0	188	55	0
Cook.									
20 Mai 1778	23	41	34	59	39	0	208	27	0
Bayli.									
12 Juin 1778	23	45	0	57	1	0	204	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
12 Juillet	23	45	0	58	20	0	198	15	0
11 Septembre	23	46	20	64	20	0	196	42	0
20 Mai	23	46	40	59	39	0	208	27	0
2 Août 1779	23	47	0	64	5	0	187	52	0
20 Mai 1778	23	48	20	59	39	0	208	27	0
7 Juillet	23	49	0	57	13	0	197	58	0
4 Septembre	23	55	15	64	26	0	186	11	0
6 Mai	23	55	20	59	9	0	217	42	0
31 Juillet 1779	23	57	0	65	1	0	187	2	0
11 Septembre 1778	23	57	45	64	20	0	196	42	0
20 Mai	23	57	50	59	22	0	207	13	0
12 Juillet	23	58	0	58	23	30	198	12	0
2 Août 1779	23	59	0	64	4	0	187	18	0
20 Mai 1778	24	2	42	59	39	0	208	27	0
11 Septembre	24	3	45	64	20	0	194	25	0
9 & 10 Juillet	24	8	40	58	16	0	199	24	40
Cook.									
1 Mai 1778	24	9	26	55	12	0	222	35	0
12 Juillet	24	11	0	58	27	0	198	10	0
Bayli.									
4 Septembre	24	11	0	64	29	0	185	22	0
Cook et Bayli.									
20 Mai 1778	24	11	40	59	39	0	208	27	0
19 Juillet	24	12	20	59	37	0	194	58	0
20 Juillet	24	12	20	59	37	0	195	2	0
1 Mai	24	12	50	55	12	0	222	35	0
6 Mai	24	13	20	59	9	0	217	42	0
3 Mai	24	17	50	58	14	0	218	16	0
2 Août 1779	24	22	0	64	5	0	187	52	0
21 Mai 1778	24	22	45	59	22	0	207	27	0
Bayli.									
9 Août 1779	24	27	0	65	35	0	188	55	0
3 Mai 1778	24	29	10	58	14	0	218	16	0
Cook.									
6 Mai 1778	24	29	32	59	9	0	217	42	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
6 Mai 1778.....	24	29	40	59	9	0	217	42	0
3, 4 & 5 Mai.....	24	30	55	58	27	20	218	20	20
6 Mai 1778..... ...	24	36	12	59	9	0	217	42	0
21 Mai.....	24	36	55	59	22	0	207	27	0
.....	24	37	48	59	22	0	207	27	0
.....	24	39	30	59	22	0	207	27	0
3 Mai.....	24	40	20	58	14	0	218	16	0
2 Août 1779.....	24	42	40	58	14	0	218	16	0
.....	24	43	40	54	5	0	187	52	0
10 Juillet.....	24	44	0	58	17	0	199	6	0
Bayli.									
9 Août.....	24	45	0	65	36	0	187	50	0
3 Septembre.....	24	47	0	64	55	0	185	45	0
6 Mai.....	24	49	30	59	9	0	217	42	0
.....	24	50	20	59	9	0	217	42	0
6 Septembre.....	24	50	45	64	13	0	192	15	0
1 Mai.....	24	52	0	55	12	0	222	35	0
2 Mai.....	24	52	40	55	12	0	222	35	0
5 Mai.....	24	55	40	58	53	0	218	19	0
Cook et Bayli.									
6 Mai.....	24	59	0	59	9	0	197	42	0
Bayli.									
7 Septembre.....	25	1	0	64	21	0	181	35	0
Cook.									
4 Septembre.....	25	1	30	64	26	30	187	11	0
21 Mai.....	25	3	50	59	22	0	207	27	0
21 Mai.....	25	6	0	59	22	0	207	27	0
6 Septembre.....	25	6	55	64	13	0	192	15	0
19 Juillet.....	25	7	40	59	37	0	194	58	0
1 Mai.....	25	8	45	55	12	0	222	35	0
Bayli.									
3 Septembre.....	25	12	0	65	24	0	186	25	0
Cook.									
6 Septembre.....	25	12	31	63	58	0	191	47	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
10 Juillet 1779.....	25	14	0	67	58	0	186	38	0
19 Septembre.....	25	17	0	63	47	0	193	13	0
12 Août 1778.....	25	24	0	66	17	0	208	24	0
5 Septembre.....	25	26	0	63	55	0	187	14	0
27 Août.....	25	29	0	69	20	0	180	35	0
2 Septembre.....	25	32	0	65	40	0	187	5	0
Cook.									
13 Août.....	25	32	8	66	36	0	189	40	0
12 Juillet 1779.....	25	33	0	69	2	0	207	55	0
Bayli.									
10 Août 1778.....	25	36	0	66	0	0	207	45	0
23 Mai.....	25	37	0	58	14	0	202	32	0
4 Septembre.....	25	37	0	64	26	0	186	11	0
4 Mai.....	25	38	30	58	35	0	218	27	0
4 Septembre.....	25	38	55	64	26	0	186	11	0
9 Juillet 1779.....	25	39	0	69	5	0	185	53	0
2 Août.....	25	40	0	64	5	0	187	52	0
12 Juillet.....	25	45	0	69	2	0	187	55	0
6 Septembre.....	25	45	0	63	58	0	181	45	0
2 Août.....	25	50	0	64	5	0	187	52	0
Cook et Bayli.									
14 Juillet 1779.....	25	54	0	68	51	0	186	10	0
4 Mai 1778.....	25	54	40	58	35	0	218	27	0
.....	25	55	10	58	35	0	218	27	0
Cook.									
27 Août 1778.....	25	56	0	69	20	0	180	35	0
6 Septembre.....	25	57	53	64	13	0	192	15	0
.....	25	58	0	64	13	0	192	15	0
2 Août 1779.....	25	59	0	64	5	0	187	52	0
7 Juillet 1778.....	26	2	10	57	7	0	197	47	0
6 Septembre.....	26	3	20	64	13	0	192	15	0
12 Juillet 1779.....	26	10	30	69	2	0	187	55	0
7 Juillet 1778.....	26	13	39	57	7	0	197	47	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
12 Juillet 1779.....	26	14	0	69	2	0	187	55	0
Bayli.									
24 Mai.....	26	16	0	58	16	0	206	19	0
Cook.									
11 Septembre 1778....	26	16	12	64	20	0	196	42	0
Bayli.									
3 Mai.....	26	21	0	58	11	0	219	55	0
5 Mai.....	26	21	0	58	49	0	218	31	0
4 Mai.....	26	22	0	58	30	0	218	5	0
13 Août.....	26	22	0	66	33	0	189	24	0
12 Juillet 1779.....	26	22	0	69	2	0	187	55	0
7 Juillet 1778.....	26	22	40	57	7	0	197	47	0
27 Août.....	26	23	0	69	20	0	180	35	0
7 Juillet.....	26	23	45	57	7	0	197	47	0
2 Septembre.....	26	24	0	66	30	0	186	47	0
27 Juillet 1779.....	26	24	0	67	11	0	186	10	0
4 Mai 1778.....	26	25	0	58	35	0	218	27	0
6 Septembre.....	26	25	45	63	58	0	191	47	0
7 Juillet.....	26	29	40	57	7	0	197	47	0
10 Août.....	26	33	50	65	43	0	187	1	0
4 Mai.....	26	34	0	58	35	0	218	27	0
Cook et Bayli.									
12 Juillet 1779.....	26	34	0	69	2	0	186	55	0
Bayli.									
4 Mai 1778.....	26	35	0	58	32	0	218	20	0
8 Mai.....	26	35	0	59	33	0	215	58	0
12 Juillet 1779.....	26	35	0	69	2	0	186	55	0
21 Juillet.....	26	35	0	69	32	0	195	44	0
7 Juillet 1778.....	26	36	55	57	7	0	197	47	0
13 Août.....	26	37	40	66	36	0	189	40	0
4 Juin.....	26	39	0	60	1	0	205	1	0
4 Mai.....	26	40	40	58	35	0	218	27	0
7 Mai.....	26	42	0	59	28	0	217	3	0
6 Septembre.....	26	42	50	63	58	0	191	47	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
6 Septembre 1778.....	26	42	58	64	13	0	192	15	0
9 Mai.....	26	48	0	59	31	0	214	50	0
1 Septembre.....	26	48	0	66	50	0	184	44	0
15 Septembre.....	26	50	0	64	20	0	194	25	0
11 Juillet 1779.....	26	50	0	68	6	0	187	20	0
29 Août 1778.....	26	55	0	69	20	0	180	30	0
6 Septembre.....	26	56	50	63	58	0	191	47	0
6 Mai.....	26	59	0	59	23	0	218	32	0
12 Septembre.....	27	0	0	64	32	0	195	18	0
10 Août.....	27	0	50	65	43	0	187	1	0
15 Septembre.....	27	4	50	64	20	0	194	25	0
6 Septembre.....	27	5	20	63	58	0	191	47	0
.....	27	6	0	63	58	0	191	47	0
11 Juillet 1779.....	27	8	0	68	6	0	187	20	0
13 Août 1778.....	27	11	40	66	36	0	189	40	0
Cook et Bayli.									
19 Mai 1778.....	27	15	0	60	12	0	209	47	0
13 Août.....	27	16	0	66	36	0	189	40	0
Bayli.									
24 Août.....	27	17	0	69	17	0	187	23	0
15 Septembre.....	27	21	0	64	22	0	195	1	0
8 Septembre.....	27	22	0	64	21	0	193	25	0
Cook.									
10 Août 1778.....	27	22	27	65	43	0	187	1	0
15 Septembre.....	27	23	40	64	20	0	194	25	0
16 Septembre.....	27	25	0	64	22	0	195	1	0
15 Septembre.....	27	28	40	64	20	0	194	25	0
6 Septembre.....	27	29	20	63	58	0	191	47	0
10 Septembre.....	27	30	0	64	27	0	195	18	0
10 Août.....	27	31	55	65	43	0	187	1	0
1 Septembre.....	27	32	10	66	47	0	187	8	0
11 Juillet 1779.....	27	32	25	68	6	0	187	20	0
Bayli.									
10, 12, 15, 16 & 17 Juillet 1778.....	27	37	12	64	52	0	195	1	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
10 Août	27	39	10	65	43	0	187	1	0
5 Juin	27	41	0	59	0	0	204	49	0
11 Juillet 1779.....	27	42	0	68	6	0	187	20	0
12 Juillet.....	27	46	0	69	33	0	186	45	0
11 Juillet.....	27	46	30	68	6	0	187	20	0
13 Août 1778.....	27	50	0	66	36	0	189	40	0
.....	27	50	5	66	36	0	189	40	0
11 Juillet 1779	27	53	0	68	6	0	187	20	0
Cook.									
1 Septembre 1778.....	27	53	40	66	47	0	187	10	0
.....	27	55	0	68	6	0	187	20	0
10 Août 1778.....	27	58	45	65	43	0	187	1	0
19 Juillet 1779	28	11	0	70	5	0	194	5	0
1 Septembre 1778	28	15	10	66	47	0	187	10	0
9 Juillet 1779.....	28	17	55	69	5	0	185	53	0
Bayli.									
18 Septembre 1778....	28	18	0	63	34	0	195	23	0
15 Septembre.....	28	18	40	64	20	0	194	25	0
9 Septembre.....	28	22	0	64	40	0	195	18	0
11 Juillet 1779.....	28	27	0	68	6	0	187	0	0
15 Septembre 1778.....	28	31	0	64	20	0	194	25	0
9 Juillet 1779.....	28	42	0	69	6	0	186	10	0
17 Septembre 1778....	28	50	0	64	11	0	195	1	0
Cook.									
19 Juillet 1779.....	28	59	0	70	5	0	194	5	0
.....	29	19	0	70	5	0	194	5	0
15 Septembre 1778....	29	24	3	64	20	0	194	3	0
3 Juillet 1778.....	29	25	0	61	11	0	205	35	0
9 Juillet 1779.....	29	27	34	69	5	0	185	53	0
.....	29	29	0	70	5	0	194	5	0
1 Juin 1778.....	30	6	0	61	1	0	260	3	0
.....	30	14	0	61	1	0	206	5	0
Bayli.									
1 Juin.....	30	20	0	61	1	0	206	4	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
9 Juillet 1779.....	30	20	55	69	5	0	185	53	0
Bayli.									
2 Juin 1778.....	30	21	0	60	43	0	205	57	0
Cook.									
9 Juillet 1779.....	30	21	45	70	17	0	194	11	0
20 Juillet 1778.....	30	28	0	69	38	0	193	24	0
9 Juillet 1779.....	38	37	40	69	5	0	185	53	0
Bayli.									
16 Septembre 1778....	30	47	5	64	20	0	193	42	0
9 Juillet 1779.....	30	47	40	69	5	0	185	53	0
Cook.									
20 Août 1778.....	31	3	10	69	38	0	193	24	0
.....	31	4	40	69	38	0	193	24	0
15 Septembre.....	31	4	45	64	20	0	193	42	0
17 Juillet 1779.....	31	10	20	64	20	0	193	42	0
.....	31	19	47	70	17	30	194	11	0
Cook et Bayli.									
20 Août 1778.....	31	20	40	69	38	0	193	24	0
15 Septembre.....	31	24	0	64	20	0	193	42	0
17 Juillet 1769.....	31	28	20	70	17	0	194	11	0
.....	31	32	45	70	17	0	194	11	0
20 Août 1778.....	31	37	0	69	38	0	193	24	0
15 Septembre.....	31	50	30	64	20	0	193	42	0
17 Juillet 1779.....	31	56	30	70	17	0	194	11	0
Bayli.									
19 Août 1778.....	32	24	0	70	15	0	193	53	0
21 Août	32	45	0	69	31	0	192	57	0
.....	33	0	0	69	31	0	193	8	0
18 Août.....	33	3	0	70	25	0	195	39	0
.....	33	28	0	69	53	0	194	55	0
17 Juillet 1779.....	33	37	0	70	16	0	190	59	0
.....	33	40	0	70	0	0	190	54	0
16 Août 1778.....	34	55	0	70	21	0	191	11	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
18 Juillet 1779.....	35	30	0	70	20	0	193	43	0
17 Juillet.....	35	39	0	70	4	0	193	26	0
.....	35	40	0	70	4	0	193	26	0
Cook.									
17 Juillet 1779.....	35	57	0	70	4	0	193	26	0
.....	36	10	0	70	4	0	193	26	0
.....	36	19	0	70	4	0	193	26	0
	Déclinaison Ouest.								
Byron.									
30 Octobre 1765	0	30	0	7	14	0	253	14	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER PACIFIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
19 Octobre 1765.....	0	0	0	21	10	0	233	18	0
Cook.									
16 Mars 1773.....	0	31	0	58	58	0	142	8	0
Bougainville.									
En 1766.....	0	39	0	23	24	0	246	7	0
Cook.									
2 Janvier 1777.....	1	4	25	43	27	0	140	10	0
Furneau.									
7 Mars 1773.....	1	13	0	43	47	0	138	40	0
Cook.									
2 Janvier 1777.....	1	15	40	43	27	0	140	10	0
30 Mars 1774.....	1	27	0	9	24	0	231	34	0
2 Octobre.....	1	28	0	54	56	0	232	35	0
Bayli.									
21 Janvier 1777.....	1	50	0	43	35	0	139	59	0
Carteret.									
17 Juin 1767.....	1	51	0	24	4	0	244	58	0
Cook.									
24 Mars 1774.....	1	56	0	17	7	0	240	35	0
29 Mars.....	1	57	0	10	10	0	240	35	0
21 Janvier 1777.....	1	58	0	43	27	0	141	10	0
Bayli.									
20 Janvier 1776.....	2	0	0	43	28	0	138	17	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
16 Juin 1767.....	2	0	0	28	11	0	246	20	0
18 Juin.....	2	0	0	28	7	0	243	40	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	4	0	24	0	0	248	19	0
Bayli.									
20 Janvier 1776.....	2	9	0	43	29	0	138	25	0
Carteret.									
20 Juin 1767.....	2	9	0	28	4	0	241	6	0
Cook.									
26 Mars 1774.....	2	10	0	14	41	0	237	15	0
21 & 22 Janvier 1777...	2	28	44	43	30	0	140	18	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	30	0	23	10	0	243	27	0
Carteret.									
3 Juillet 1767.....	2	30	0	25	0	0	221	19	0
2 Juillet.....	2	32	0	26	0	0	226	40	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	32	0	18	53	0	228	52	0
.....	2	33	0	18	50	0	232	58	0
Cook.									
11 Janvier 1774.....	2	34	0	47	51	0	235	23	0
18 Mars.....	2	34	0	26	5	0	246	3	0
21 Janvier 1777.....	2	44	50	43	27	0	140	10	0
21 & 22 Janvier.....	2	45	38	43	30	0	140	18	0
Carteret.									
2 Juillet 1767.....	2	46	0	25	2	0	223	57	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	50	0	18	54	0	227	36	0
Cook.									
22 Janvier 1777.....	2	50	20	43	33	0	140	26	0
10 Juillet 1773.....	3	0	0	43	46	0	213	22	0
Bougainville.									
En 1766.....	3	0	0	23	30	0	247	9	0
.....	3	0	0	26	50	0	253	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
En 1766.....	3	2	0	42	3	0	225	20	0
Cook.									
21 Mars 1774.....	3	4	0	21	1	0	243	37	0
18 Mars 1776.....	3	5	0	23	0	0	244	34	0
21 & 22 Janvier 1777...	3	5	33	43	30	0	140	18	0
21 Août 1770.....	3	6	0	10	36	0	140	11	0
Bougaingille.									
En 1766.....	3	14	0	18	45	0	225	1	0
Cook.									
19 Avril 1770.....	3	17	0	35	50	0	147	6	0
Byron.									
14 Mai 1765.....	3	20	0	23	0	0	256	7	0
Cook.									
4 Novembre 1774....	3	22	0	53	15	0	236	53	0
Bougainville.									
En 1766.....	3	37	0	25	56	0	251	0	0
.....	3	39	0	25	34	0	250	15	0
.....	3	40	0	27	30	0	256	0	0
.....	3	40	0	18	40	0	222	18	0
Carteret.									
4 Juillet 1767.....	3	43	0	25	24	0	220	17	0
Cook.									
2 Février 1774.....	3	44	0	34	53	0	255	2	0
1 Mars.....	3	45	0	32	28	0	254	48	0
2 Août 1777.....	3	50	0	8	1	0	202	10	0
Bougainville.									
En 1766.....	3	53	0	18	41	0	224	34	0
Cook.									
12 Janvier 1774.....	4	0	0	49	32	0	246	43	0
7 Juillet 1767.....	4	2	0	24	10	0	217	40	0
1 Avril 1774.....	4	3	0	9	30	0	227	39	0
Byron.									
8 Juin 1765.....	4	3	0	14	10	0	212	43	0
Cook.									
14 Décembre 1776.....	4	6	30	10	9	0	203	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
17 Août 1770.....	4	9	0	12	38	0	140	50	0
Bougainville.									
En 1766.....	4	10	0	17	43	0	214	17	0
Carteret.									
12 Juin 1767.....	4	13	0	26	53	0	257	14	0
Cook.									
16 Décembre 1766.....	4	14	45	8	1	0	202	10	0
.....	4	15	0	8	1	0	202	10	0
Bougainville.									
En 1766.....	4	15	0	27	47	0	257	30	0
Carteret.									
6 Juillet 1767.....	4	16	0	24	32	0	219	4	0
10 Juillet.....	4	20	0	21	38	0	215	59	0
Bayli.									
22 Janvier 1777.....	4	20	0	43	30	0	141	35	0
Cook.									
5 Mars 1774.....	4	27	0	9	32	0	220	57	0
Byron.									
7 Juin 1765.....	4	30	0	14	5	0	212	37	0
Cook.									
8 Mars 1774.....	4	31	0	27	4	0	253	37	0
2 Mars.....	4	36	0	31	12	0	255	6	0
Bayli.									
18 Décembre 1777.....	4	38	0	5	13	0	201	45	0
3 Avril 1774.....	4	40	0	9	32	0	224	17	0
19 Septembre 1776.....	4	40	0	1	45	0	140	37	0
20 Septembre.....	4	40	0	1	33	0	139	57	0
Carteret.									
12 Juillet 1767.....	4	40	0	20	36	0	211	56	0
Bougainville.									
En 1766.....	4	40	0	17	32	0	208	0	0
Cook.									
11 Décembre 1776.....	4	42	15	13	15	0	204	11	0
7 Mars 1764.....	4	45	0	28	20	0	255	32	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
10 Mai 1765.....	4	45	0	24	30	0	259	50	0
Cook.									
10 Décembre 1776.....	4	45	30	14	17	0	205	5	0
14 Décembre	4	46	40	10	9	0	203	3	0
6 Mars 1774.....	4	47	0	29	23	0	256	32	0
17 Décembre 1776.....	4	49	5	7	21	0	201	56	0
4 Mars 1774.....	4	50	0	39	56	0	256	36	0
Bougainville.									
En 1776.....	4	50	0	17	47	0	215	26	0
Cook.									
16 Décembre 1777.....	4	53	42	8	1	0	202	10	0
3 Août 1773.....	4	54	0	22	8	0	223	56	0
Carteret.									
21 Septembre 1776.....	4	54	0	1	20	0	139	4	0
Cook.									
8 Mars 1769.....	4	54	0	17	23	0	211	41	0
20 Décembre 1767.....	4	57	40	3	13	0	201	7	0
11 Juillet 1773.....	5	0	0	43	34	0	205	39	0
Byron.									
En Juin 1765.....	5	0	0	14	41	0	208	20	0
Wallis.									
20 Mai 1767.....	5	0	0	21	0	0	250	48	0
23 Mai.....	5	0	0	20	20	0	245	29	0
Carteret.									
12 Juillet 1767.....	5	0	0	20	38	0	211	35	0
Cook.									
27 Juillet 1773.....	5	0	0	27	53	0	222	18	0
17 Décembre 1777.....	5	0	0	7	21	0	201	56	0
7 Décembre 1774.....	5	1	0	53	19	0	248	47	0
11 Décembre 1777.....	5	1	45	13	15	0	204	11	0
26 Juillet 1773.....	5	3	0	28	53	0	222	5	0
Bayli.									
19 Décembre 1777.....	5	7	0	4	39	0	202	2	0
14 Décembre.....	5	8	0	10	9	0	203	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Wallis.									
1 Juin 1767.....	5	9	0	20	38	0	229	50	0
Byron.									
10 Octobre 1765.....	5	10	0	18	33	0	220	45	0
Cook.									
4 Août 1773.....	5	10	0	17	45	0	209	19	0
14 Décembre 1777.....	5	10	0	10	49	0	203	33	0
11 Décembre.....	5	11	0	13	15	0	204	11	0
19 Décembre.....	5	11	40	3	51	0	201	16	0
21 Octobre 1773.....	5	12	0	39	6	0	176	13	0
Carteret.									
7 Juillet 1767.....	5	12	0	24	10	0	217	40	0
Cook.									
14 Décembre 1777.....	5	13	0	10	9	0	203	33	0
30 Janvier.....	5	13	25	43	15	0	146	17	0
10 Décembre.....	5	13	30	14	17	0	205	5	0
17 Décembre.....	5	15	0	7	21	0	201	56	0
11 Juillet 1773.....	5	18	0	43	16	0	217	26	0
19 Décembre 1777.....	5	19	40	3	51	0	201	16	0
Carteret.									
En Août 1767.....	5	20	0	5	0	0	149	54	0
Wallis.									
8 Juin 1767.....	5	20	0	19	18	0	219	21	0
Cook.									
17 Décembre 1777.....	5	20	56	7	21	0	201	56	0
22 Juillet 1773.....	5	21	0	31	6	0	223	23	0
11 Décembre 1777.....	5	21	10	13	15	0	204	11	0
19 Décembre.....	5	22	20	3	51	0	201	16	0
.....	5	24	50	3	51	0	201	16	0
20 Décembre.....	5	25	0	3	13	0	201	7	0
Carteret.									
19 Septembre 1767.....	5	26	0	1	57	0	141	3	0
Cook.									
17 Décembre 1777.....	5	28	0	7	21	0	201	56	0
19 Décembre.....	5	28	55	3	31	0	201	16	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
18 Juillet 1773.....	5	29	0	37	56	0	224	17	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	29	0	13	10	0	149	40	0
Byron.									
13 Juin 1765.....	5	30	0	15	0	0	205	42	0
Wallis.									
4 Juillet 1767.....	5	30	0	17	30	0	207	35	0
Bayli.									
21 Décembre 1777.....	5	31	0	1	48	0	200	15	0
14 Décembre.....	5	32	30	10	49	0	203	33	0
19 Juillet.	5	33	0	36	34	0	224	28	0
23 Juillet.....	5	34	0	29	22	0	223	23	0
Cook.									
5 Juin 1770.....	5	35	0	19	12	0	144	35	0
10 Décembre 1777.....	5	35	24	14	17	0	205	5	0
16 Décembre 1777.....	5	35	30	8	1	0	202	10	0
13 Juillet 1770.....	5	37	0	43	2	0	218	35	0
10 Décembre 1777.....	5	38	0	14	17	0	205	5	0
5 Mars 1769.....	5	38	0	18	23	0	206	23	0
14 Décembre 1777.....	5	38	26	10	29	0	203	18	0
17 Décembre.....	5	39	0	7	21	0	201	56	0
11 Décembre.....	5	39	45	13	15	0	204	11	0
Wallis.									
3 Juin 1767.....	5	40	0	19	30	0	227	45	0
Carteret.									
10 Juin 1766.....	5	40	0	26	30	0	259	10	0
Cook.									
10 Décembre 1777.....	5	42	15	14	17	0	205	5	0
20 Décembre.....	5	42	53	3	13	0	201	7	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	43	0	18	39	0	211	53	0
Cook et Bayli.									
16 Décembre 1777.....	5	43	0	8	1	0	202	10	0
.....	5	43	40	8	1	0	202	10	0
11 Décembre.....	5	44	15	13	15	0	204	11	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
7 Juin 1766.....	5	45	0	27	23	0	260	19	0
8 Juin.....	5	45	0	27	20	0	259	44	0
Bayli.									
14 Décembre 1777.....	5	45	0	10	46	0	203	2	0
Carteret.									
13 Juillet 1767.....	5	46	0	21	7	0	210	21	0
Cook.									
11 Décembre 1777.....	5	48	0	13	15	0	204	11	0
20 Décembre	5	49	50	3	13	0	201	7	0
Bayli.									
15 Décembre 1777.....	5	50	0	9	10	0	202	55	0
Cook.									
20 Décembre 1777.....	5	50	10	3	13	0	255	42	0
23 Janvier.....	5	51	13	43	48	0	144	31	0
14 Décembre 1774.....	5	52	40	10	49	0	203	33	0
26 Février.....	5	53	0	36	37	0	255	42	0
28 Janvier 1777	5	53	16	43	21	0	145	28	0
17 Décembre	5	54	30	7	21	0	201	56	0
Bayli.									
24 Janvier 1777	5	56	0	43	41	0	145	0	0
8 Juillet 1767	5	56	0	23	46	0	217	40	0
Wallis.									
7 Juin 1767	6	0	0	19	26	0	219	39	0
4 Mai	6	0	0	28	12	0	261	5	0
11 Juin.....	6	0	0	19	20	0	219	5	0
17 Juin.....	6	0	0	17	51	0	210	5	0
19 Juin.....	6	0	0	17	48	0	208	20	0
27 Juillet.....	6	0	0	17	28	0	207	35	0
Surville.									
23 Septembre 1769.....	6	0	0	0	0	0	146	0	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	1	0	11	56	0	148	18	0
Cook.									
7 Août 1777.....	6	1	20	25	0	0	206	50	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	6	4	0	15	33	0	148	44	0
Cook.									
10 Décembre 1777.....	6	4	40	14	9	0	205	5	0
19 Décembre	6	4	40	3	51	0	201	16	0
Carteret.									
23 Juillet 1767	6	5	0	16	22	0	195	3	0
Cook.									
20 Décembre 1777.....	6	5	30	3	13	0	201	7	0
Carteret.									
19 Juillet 1767.....	6	8	0	19	50	0	203	36	0
Cook.									
10 Décembre 1777.....	6	8	30	14	7	0	205	5	0
14 Décembre.....	6	8	50	10	9	0	203	3	0
20 Décembre	6	9	10	3	13	0	201	7	0
Bayli.									
13 Décembre.....	6	15	0	11	20	0	203	25	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	16	0	11	48	0	149	35	0
Bayli.									
9 Décembre	6	17	0	14	47	0	205	22	0
14 Décembre	6	20	0	10	49	0	203	33	0
Carteret.									
15 Juillet 1767.....	6	23	0	21	46	0	206	45	0
24 Août.....	6	25	0	5	7	0	152	43	0
Cook.									
8 Janvier 1774	6	26	0	49	7	0	226	33	0
14 Décembre 1777.....	6	26	30	10	49	0	203	33	0
.....	6	28	50	10	49	0	203	33	0
.....	6	29	40	10	49	0	203	3	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	30	0	15	4	0	205	0	0
Wallis.									
28 Juillet 1767.....	6	30	0	17	28	0	206	31	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
En Août 1767.....	6	30	0	5	7	0	152	43	0
16 Septembre.....	6	30	0	2	19	0	143	6	0
Cook.									
7 Mars 1769.....	6	32	0	17	48	0	210	0	0
Carteret.									
22 Juillet 1767.....	6	34	0	22	22	0	206	26	0
Cook.									
25 Novembre 1774.....	6	35	0	55	9	0	208	7	0
7 Janvier.....	6	36	0	50	36	0	224	17	0
25 Février.....	6	38	0	37	52	0	255	57	0
7 Août 1777.....	6	39	10	25	0	0	206	50	0
27 Mars.....	6	42	30	22	50	0	156	33	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	55	0	2	32	0	148	8	0
Cook.									
16 Avril 1777.....	6	45	35	18	4	0	161	7	0
13 Juillet 1773.....	6	48	0	17	16	0	213	41	0
Bayli.									
30 Mars 1777.....	6	50	0	20	43	0	198	55	0
31 Mars.....	6	58	0	21	4	0	198	32	0
9 Décembre.....	7	0	0	15	30	0	205	21	0
Wallis.									
13 Juin 1767.....	7	0	0	19	18	0	217	1	0
.....	7	0	0	19	0	0	217	29	0
Bougainville.									
En 1766.....	7	0	0	14	42	0	201	40	0
.....	7	2	0	12	13	0	151	8	0
Bayli.									
2 Avril 1777.....	7	2	0	20	2	0	198	32	0
21 Mars.....	7	3	30	27	1	0	156	3	0
30 Mars.....	7	5	30	20	43	0	198	54	0
6 Août.....	7	6	0	25	17	0	205	21	0
6 Janvier 1774.....	7	7	0	52	0	0	222	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
1 Août 1777.....	7	7	37	27	43	0	200	16	0
Carteret.									
20 Juillet 1767.....	7	9	0	19	8	0	201	20	0
30 Août 1769.....	7	9	0	38	20	0	210	29	0
8 Avril 1777.....	7	9	30	25	17	0	205	21	0
Wallis.									
12 Juin 1767.....	7	10	0	19	11	0	217	29	0
Bougainville.									
En 1766.....	7	10	0	4	5	0	151	31	0
Cook.									
8 Avril 1777.....	7	10	45	19	2	0	158	15	0
Carteret.									
26 Août 1767.....	7	14	0	4	46	0	150	52	0
Cook et Bayli.									
16 Avril 1777.....	7	14	15	18	4	0	161	7	0
Bougainville.									
En 1766.....	7	15	0	3	10	0	149	44	0
.....	7	15	0	5	0	0	152	30	0
Cook et Bayli.									
13 Mai 1777.....	7	15	50	20	15	0	172	18	0
16 Avril.....	7	20	5	18	4	0	161	7	0
Cook.									
7 Août 1777.....	7	20	44	25	0	0	206	50	0
30 Mars.....	7	21	0	20	43	0	198	56	0
8 Avril.....	7	22	0	19	2	0	161	15	0
24 Janvier.....	7	22	30	19	2	0	158	15	0
.....	7	25	13	43	45	30	145	51	10
13 Mai.....	7	25	45	20	15	0	172	20	0
21 Septembre 1773	7	26	0	18	4	0	201	13	0
8 Avril 1777.....	7	26	27	19	2	0	158	15	0
Bayli.									
6 Avril.....	7	27	0	19	32	0	196	46	0
14 Avril.....	7	27	0	18	7	0	192	55	0
7 Août.....	7	30	0	24	6	0	207	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	7	33	0	14	56	0	197	39	0
.....	7	34	0	7	36	0	153	15	0
.....	7	36	0	15	10	0	196	45	0
Bayli.									
8 Avril 1777.....	7	36	0	19	2	0	158	15	0
Cook.									
2 Février.....	7	36	44	44	51	0	153	22	0
13 Mai.....	7	36	50	20	15	0	172	20	0
Bayli.									
16 Avril 1777.....	7	36	50	18	4	0	161	7	0
Cook.									
6 Août 1777.....	7	37	27	25	17	0	205	21	0
21 Mars	7	38	0	27	1	0	156	3	0
Byron.									
21 Juillet 1765.....	7	38	0	18	43	0	199	8	0
Cook.									
16 Avril 1777.....	7	39	25	18	4	0	161	7	0
Byron.									
16 Juin 1765.....	7	40	0	14	28	0	201	12	0
Wallis.									
30 Juillet 1769.....	7	40	0	16	46	0	203	22	0
Carteret.									
22 Août 1767.....	7	42	0	6	24	0	155	7	0
Cook.									
1 Avril 1777.....	7	42	15	19	57	0	156	2	0
Bayli.									
1 Avril.....	7	44	0	20	4	0	198	34	0
Cook.									
31 Juillet.....	7	44	7	27	51	0	198	25	0
6 Août	7	45	25	25	17	0	205	21	0
Cook et Bayli.									
2 Juin.....	7	46	0	19	53	30	192	31	0
12 Mars.....	7	47	35	23	46	0	156	22	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
7 Août.....	7	49	40	25	0	0	206	50	0
18 Septembre.....	7	50	0	17	41	0	203	14	0
Bayli.									
8 Avril 1777.....	7	52	0	19	1	0	195	41	0
Cook.									
7 Août 1777.....	7	52	10	25	0	0	206	50	0
26 Juillet.....	7	52	26	26	41	0	191	35	0
27 Mars.....	7	53	15	22	50	0	156	33	0
13 Mai.....	7	53	35	20	15	0	172	18	0
24 Avril 1770.....	7	54	0	35	19	0	147	53	0
8 Juin 1773.....	7	55	0	17	32	0	201	34	0
13 Mai 1777.....	7	55	25	20	15	0	172	20	0
22 Septembre.....	7	56	0	18	40	0	200	17	0
Bayli.									
3 Avril.....	7	56	0	20	2	0	198	26	0
7 Avril.....	7	56	0	19	12	0	196	5	0
Cook.									
8 Avril.....	7	58	0	19	2	0	158	15	0
16 Avril.....	7	59	30	18	5	0	161	14	0
10 Mai 1770.....	8	0	0	32	2	0	149	35	0
21 Février 1774.....	8	0	0	37	54	0	263	30	0
Wallis.									
31 Juillet 1767.....	8	0	0	16	28	0	202	5	0
Cook et Bayli.									
16 Avril 1777.....	8	0	25	18	6	0	161	21	0
Bayli.									
11 Avril.....	8	2	0	18	15	0	193	39	0
13 Mai.....	8	3	45	20	15	0	172	20	0
5 Août.....	8	6	0	26	44	0	204	14	0
Carteret.									
1 Juin 1767.....	8	8	0	25	51	0	273	22	0
Cook et Bayli.									
6 Août 1777.....	8	9	0	25	17	0	205	21	0
21 Mars.....	8	9	0	27	1	0	156	3	0
13 Mai.....	8	9	25	20	15	0	172	20	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
9 Juin 1774.....	8	10	0	17	48	0	200	52	0
Carteret.									
31 Mai 1767.....	8	10	0	26	26	0	275	20	0
Cook.									
24 Février 1774.....	8	10	0	37	25	0	259	25	0
Cook et Bayli.									
27 Mars 1777.....	8	11	45	22	50	0	156	33	0
Bayli.									
6 Août.....	8	12	0	25	17	0	207	16	0
Cook.									
27 Juillet 1777.....	8	12	34	25	57	0	192	35	0
13 Mai.....	8	13	0	20	15	0	172	20	0
16 Avril.....	8	14	15	18	6	0	161	21	0
27 Mars.....	8	14	20	22	50	0	156	33	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	15	0	15	3	0	194	21	0
Cook.									
25 Mars.....	8	16	15	23	46	0	156	22	0
Bayli.									
26 Mars.....	8	17	0	23	21	0	198	20	0
24 Juillet.....	8	18	0	25	45	0	189	52	0
1 Avril 1777.....	8	18	10	19	57	0	156	2	0
16 Avril.....	8	18	15	18	4	0	161	7	0
27 Mars.....	8	19	15	22	50	0	156	33	0
Carteret.									
20 Août 1769.....	8	20	0	7	56	0	156	31	0
Cook.									
1 Avril 1777	8	20	51	19	57	0	156	2	0
Cook et Bayli.									
27 Mars 1777.....	8	22	15	22	50	0	156	13	0
25 Mars.....	8	22	45	23	46	0	156	22	0
Bayli.									
27 Mars 1777.....	8	23	0	22	48	0	156	55	0
20 Mars.....	8	23	20	27	1	0	156	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
1 Avril.....	8	23	25	19	57	0	156	2	0
.....	8	23	35	19	57	0	156	2	0
21 Mars.....	8	23	45	27	1	0	156	3	0
1 Avril.....	8	23	45	19	57	0	156	2	0
16 Avril.....	8	24	30	18	6	0	161	21	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	25	0	15	4	0	191	51	0
Cook.									
25 Mars 1777.....	8	26	5	23	46	0	156	22	0
Cook et Bayli.									
5 Juin.....	8	29	0	19	53	0	182	35	0
Carteret.									
18 Août 1777.....	8	30	0	9	58	0	160	32	0
19 Août.....	8	30	0	8	52	0	158	16	0
Marion et Crozet.									
En 1772.....	8	30	0	16	0	0	182	30	0
Carteret.									
20 Août 1767.....	8	31	0	7	53	0	156	31	0
Cook et Bayli.									
21 Mars 1777.....	8	31	0	23	46	0	156	22	0
25 Mars.....	8	31	45	23	46	0	156	22	0
19 Septembre 1769.....	8	32	0	29	0	0	198	6	0
13 Mai 1777.....	8	32	0	20	15	0	172	20	0
16 Avril.....	8	33	55	20	15	0	172	20	0
Cook.									
21 Mars 1777.....	8	35	15	27	1	0	156	3	0
27 Mars.....	8	36	40	22	50	0	156	33	0
16 Avril.....	8	37	0	18	6	0	161	21	0
7 Août.....	8	40	5	25	17	0	205	31	0
25 Mars.....	8	40	55	23	46	0	156	22	0
19 Juillet.....	8	41	51	22	25	0	184	1	0
27 Mars.....	8	42	23	22	50	0	156	13	0
Bayli.									
18 Juillet.....	8	43	0	22	35	0	183	25	0
27 Mars.....	8	44	0	22	50	0	156	13	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
23 Mars 1777.....	8	44	0	25	31	0	198	20	0
16 Avril.....	8	46	50	18	6	0	161	21	0
2, 5 & 6 Juin.....	8	48	0	19	53	36	182	35	0
Cook.									
25 Avril 1770.....	8	48	0	34	29	0	148	59	0
Bayli.									
25 Mars 1777.....	8	52	20	23	46	0	155	22	0
21 Mars.....	8	53	0	26	15	0	198	55	0
Cook.									
21 Mars 1770.....	8	53	40	27	1	0	156	3	0
Bayli.									
1 Avril 1777.....	8	53	55	19	57	0	156	2	0
21 Mars.....	8	54	0	27	34	0	198	58	0
9 Mars.....	8	55	0	39	23	0	192	23	0
16 Mars.....	8	56	0	33	36	0	158	13	0
16 Avril.....	8	56	45	18	6	0	161	21	0
21 Mars.....	8	57	40	27	1	0	156	3	0
20 Mars.....	8	59	15	28	50	0	156	17	0
Carteret.									
26 Juillet 1767.....	9	0	0	10	1	0	190	33	0
Wallis.									
13 Août 1767.....	9	0	0	15	50	0	182	25	0
Surville.									
7 Septembre 1769.....	9	0	0	6	36	0	151	27	0
Cook et Bayli.									
10 Mars 1777.....	9	0	45	39	24	0	161	33	0
21 Mars.....	9	1	40	27	1	0	156	3	0
27 Mars.....	9	3	30	22	50	0	156	33	0
Carteret.									
28 Juillet 1767.....	9	4	0	9	50	0	186	9	0
Bougainville.									
En 1766.....	9	4	0	15	40	0	152	8	0
Cook et Bayli.									
27 Mars 1777.....	9	5	20	22	50	0	156	33	0
21 Mars.....	9	7	0	27	1	0	156	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
6 Juin 1777.....	9	7	20	19	55	0	183	15	0
20 Mars.....	9	8	0	28	50	0	156	17	0
11 Mai 1770.....	9	10	0	32	2	0	150	5	0
14 Juin 1774.....	9	15	0	18	35	0	194	50	0
Byron.									
20 Juin 1765.....	9	15	0	12	33	0	189	48	0
Cook.									
16 Juin 1774.....	9	16	0	18	4	0	194	25	0
Bougainville.									
En 1766.....	9	21	0	14	55	0	189	51	0
.....	9	21	0	14	28	0	182	37	0
Cook.									
18 Mai 1777.....	9	21	22	19	46	0	183	12	0
16 Mars.....	9	22	40	33	36	0	158	13	0
23 Novembre 1774.....	9	24	0	55	46	0	201	31	0
16 Mars 1777.....	9	24	0	33	36	0	158	13	0
20 Mars.....	9	24	0	28	50	0	156	17	0
16 Janvier 1774.....	9	26	0	56	19	0	238	11	0
27 Mars 1777.....	9	26	15	22	50	0	156	33	0
2 Octobre 1774.....	9	27	0	23	18	0	167	9	0
Carteret.									
25 Juillet 1767.....	9	30	0	12	13	0	192	45	0
Bougainville.									
En 1766.....	9	30	0	14	44	0	185	30	0
Cook.									
16 Mars 1777.....	9	30	20	33	36	0	158	13	0
Carteret.									
30 Juillet 1767.....	9	32	0	9	50	0	182	7	0
Cook.									
10 Mars.....	9	36	50	39	24	0	161	33	0
4 Février.....	9	37	10	43	43	0	159	3	0
20 Mars.....	9	39	54	28	50	0	156	17	0
Carteret.									
28 Avril 1767.....	9	40	0	29	45	0	277	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
25 Juillet 1767.....	9	40	0	12	13	0	192	45	0
Cook et Bayli.									
24 Avril 1777.....	9	42	0	19	22	10	168	17	0
Bayli.									
5 Mars.....	9	42	0	39	19	0	186	20	0
21 Mars.....	9	43	0	27	1	0	156	3	0
28 Septembre 1773.....	9	44	0	21	3	0	189	6	0
30 Septembre.....	9	44	0	21	10	0	185	2	0
27 Juin 1774.....	9	47	0	20	15	0	183	4	0
Bougainville.									
En 1766.....	9	47	0	24	35	0	164	51	0
Bayli.									
20 Mars 1777.....	9	48	25	28	50	0	156	17	0
23 Février 1774.....	9	51	0	36	40	0	260	33	0
15 Novembre.....	9	52	0	51	12	0	184	18	0
Bayli.									
27 Mars 1777.....	9	52	40	22	50	0	156	33	0
16 Mars.....	9	52	40	23	36	0	158	13	0
10 Mars.....	9	54	25	39	24	0	161	13	0
16 Mars.....	9	55	40	33	36	0	158	13	0
24 Avril.....	9	56	0	19	22	0	168	17	0
Cook.									
1 Décembre 1774.....	9	58	0	53	40	0	174	27	0
24 Avril 1777.....	9	58	30	19	22	0	168	17	0
Wallis.									
13 Août 1767.....	10	0	0	15	53	0	181	42	0
17 Août.....	10	0	0	13	18	0	180	35	0
Cook.									
4 Octobre 1774.....	10	0	0	35	26	0	168	48	0
13 Octobre.....	10	0	0	32	55	0	165	55	0
Carteret.									
9 Août 1767.....	10	2	0	10	56	0	168	35	0
1 Août.....	10	4	0	9	53	0	178	2	0
Bayli.									
15 Mars 1777.....	10	7	0	33	52	0	196	6	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
18 Décembre 1777.....	10	8	0	64	41	0	205	29	0
5 Mars.....	10	9	0	39	45	0	186	15	0
20 Mars.....	10	9	0	28	46	0	198	20	0
6 Juin.....	10	9	0	19	53	40	182	35	0
Byron.									
29 Juin 1765.....	10	10	0	8	13	0	181	15	0
Cook.									
7 Mars 1777.....	10	11	35	39	17	0	165	3	0
Bayli.									
14 Mai.....	10	13	0	20	11	0	192	31	0
14 Juillet 1773.....	10	14	0	15	39	0	170	10	0
11 Mars 1777.....	10	15	0	39	30	0	196	9	0
15 Octobre 1774.....	10	18	0	35	32	0	168	30	0
Cook.									
16 Mars 1777.....	10	18	47	33	36	0	158	13	0
15 Février.....	10	20	0	49	0	0	261	57	0
22 Juin 1773.....	10	19	0	44	41	0	195	12	0
Bougainville.									
En 1766.....	10	21	0	36	36	0	266	50	0
Cook.									
11 Juillet 1773.....	10	22	0	18	26	0	172	35	0
19 Juin 1774.....	10	22	30	18	25	0	190	24	0
20 Janvier.....	10	24	0	62	34	0	241	11	0
Carteret.									
En Mai 1767.....	10	24	0	33	45	0	276	49	0
Cook.									
18 Novembre 1774.....	10	26	0	52	44	0	187	38	0
Carteret.									
8 Août 1767.....	10	27	0	11	2	0	168	50	0
Cook.									
10 Mars 1767.....	10	29	45	39	24	0	161	33	0
Carteret.									
2 Août 1767.....	10	30	0	10	9	0	176	33	0
Cook.									
16 Mars 1777.....	10	34	20	33	36	0	158	13	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
24 Avril 1777.....	10	34	57	19	22	0	168	17	0
16 Mars.....	10	36	20	33	36	0	158	13	0
Carteret.									
11 Août 1767.....	10	38	0	10	49	0	164	35	0
Bougainville.									
En 1766.....	10	40	0	15	13	0	168	10	0
Cook et Bayli.									
16 Mars 1777.....	10	41	20	33	36	0	158	13	0
10 Mars.....	10	41	45	39	24	0	161	33	0
29 Septembre 1773....	10	42	0	36	18	0	147	40	0
Cook.									
21 Avril 1770.....	10	42	0	36	18	0	147	40	0
1 Octobre.....	10	42	0	21	21	0	183	21	0
23 Mai 1777.....	10	44	52	19	46	0	183	14	0
13 Juillet 1773.....	10	46	0	16	25	0	171	6	0
Bayli.									
8 Mars 1777.....	10	46	0	39	35	0	189	50	0
24 Septembre 1769.....	10	48	0	33	18	0	184	44	0
17 Octobre 1773.....	10	49	0	32	41	0	178	3	0
18 Octobre.....	10	49	0	33	48	0	177	56	0
Carteret.									
5 Août 1767.....	10	52	0	10	35	0	173	25	0
4 Août.....	10	54	0	10	22	0	174	45	0
Cook.									
7 Mars 1777.....	10	56	5	39	17	0	165	3	0
10 Mars.....	10	56	25	39	24	0	161	33	0
Cook et Bayli.									
10 Mars 1777.....	10	56	30	39	24	0	161	33	0
7 Mars.....	10	59	0	39	17	0	165	3	0
22 Janvier 1774.....	10	59	0	62	9	0	244	41	0
Carteret.									
En Mai 1767.....	11	0	0	33	40	0	278	43	0
En Août.....	11	0	0	10	40	0	162	24	0
Bayli.									
13 Mai 1777.....	11	1	0	20	9	0	192	53	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
16 Octobre 1774.....	11	2	0	31	41	0	177	7	0
7 Mars.....	11	2	40	39	17	0	165	3	0
15 Juillet 1774.....	11	3	0	15	9	0	168	51	0
10 Octobre.....	11	9	0	28	57	0	165	35	0
5 Mars 1777.....	11	9	0	41	25	0	168	45	0
24 Avril.....	11	9	0	19	22	0	168	17	0
7 Mars.....	11	10	20	39	17	0	165	3	0
10 Juillet 1774.....	11	11	0	19	53	0	173	10	0
14 Octobre 1773.....	11	11	0	28	38	0	177	48	0
2 Janvier 1774.....	11	12	0	57	58	0	220	23	0
20 Mars 1777.....	11	12	45	28	50	0	156	17	0
Cook.									
7 Mars 1777.....	11	13	36	39	17	0	165	3	0
15 Octobre 1773.....	11	14	0	30	15	0	177	29	0
Carteret.									
5 Août 1767.....	11	14	0	10	35	0	173	25	0
Byron.									
En Juillet 1765.....	11	15	0	1	18	0	183	49	0
Carteret.									
7 Août 1767.....	11	17	0	10	52	0	169	58	0
Cook.									
19 Mars 1773.....	11	19	0	55	1	0	149	36	0
15 Juin 1773.....	11	24	30	46	46	0	183	35	0
10 Avril 1770.....	11	25	0	38	51	0	154	52	0
4 Février 1777.....	11	27	44	43	43	0	159	3	0
7 Mars.....	11	29	45	39	17	0	165	3	0
14 Avril 1770.....	11	30	0	39	30	0	151	37	0
16 Mars 1777.....	11	31	0	33	36	0	158	17	0
5 Février.....	11	34	30	42	29	0	161	44	0
24 Juin.....	11	40	0	20	24	0	183	56	0
27 Septembre 1773.....	11	42	0	20	40	0	191	23	0
5 Mars 1777.....	11	42	30	41	25	0	168	45	0
Marion et Crozet.									
En 1772.....	11	45	0	20	9	0	182	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
10 Mars 1777.....	11	48	57	39	24	0	161	33	0
7 Mars.....	11	53	15	39	17	0	165	3	0
23 Janvier 1774.....	11	55	0	62	22	0	247	13	0
5 Mars.....	11	59	0	41	25	0	168	45	0
Wallis.									
21 Avril 1767.....	12	0	0	42	30	0	261	49	0
Cook.									
4 Février 1777.....	12	0	0	43	54	0	153	22	0
26 Juin 1774.....	12	6	0	20	33	0	183	29	0
4 Février 1777.....	12	6	0	43	25	0	139	59	0
Bayli.									
4 Février 1777.....	12	6	0	43	35	0	159	17	0
7 Mars.....	12	6	0	39	17	0	165	3	0
Cook.									
5 Mars 1777.....	12	8	52	41	25	0	168	45	0
24 Avril.....	12	13	15	19	22	0	168	17	0
4 Février.....	12	13	30	43	43	0	159	3	0
13 Avril 1770.....	12	27	0	39	23	0	153	33	0
3 Juillet 1774.....	12	28	0	19	47	0	179	33	0
5 Juillet.....	12	30	0	20	37	0	178	15	0
4 Février 1777.....	12	31	0	55	0	0	41	18	0
7 Février.....	12	38	0	42	4	0	165	7	0
6 Février.....	12	40	0	43	49	0	162	38	0
17 Février 1774.....	12	42	0	49	32	0	262	24	0
Cook et Bayli.									
10 Février 1777.....	12	42	12	40	36	0	171	9	0
6 Février.....	12	43	40	43	49	0	162	38	0
6 Juillet 1774.....	12	44	0	20	56	0	177	5	0
27 Février 1777.....	12	44	5	41	29	0	174	49	0
16 Mars.....	12	44	40	33	36	0	158	13	0
27 Février.....	12	49	45	41	29	0	174	49	0
5 Octobre 1769.....	12	50	0	37	0	0	184	8	0
10 Février 1777.....	12	51	50	40	36	0	171	9	0
7 Février.....	12	52	0	43	27	0	173	34	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
10 Mars 1777	12	55	5	39	24	0	161	33	0
27 Février	12	58	45	41	29	0	174	49	0
8 Juillet 1774	12	59	0	20	42	0	174	53	0
27 Février 1777	13	0	15	41	29	0	174	49	0
Cook.									
7 Février 1777	13	0	55	42	4	0	165	7	0
10 Février	13	1	20	40	36	0	171	9	0
7 Février	13	2	0	42	4	0	165	7	0
23 Mars 1773	13	7	0	47	46	0	159	22	0
9 Juillet	13	8	0	20	14	0	173	50	0
31 Décembre	13	9	0	59	40	0	222	24	0
9 Octobre	13	9	0	28	54	0	166	56	0
6 Février 1777	13	18	16	43	49	0	163	6	0
8 Octobre 1773	13	19	0	28	25	0	168	1	0
Bayli.									
10 Février 1777	13	21	0	40	22	0	169	20	0
	13	22	5	43	49	0	162	38	0
Cook.									
10 Décembre 1773	13	24	0	64	49	0	208	11	0
27 Février 1777	13	28	45	41	29	0	174	49	0
7 Février	13	29	0	42	4	0	165	7	0
12 Février 1774	13	30	0	50	15	0	262	17	0
27 Février 1777	13	37	30	41	29	0	174	49	0
20 Mars 1773	13	40	0	52	22	0	152	28	0
5 Mars 1777	13	45	0	41	25	0	167	45	0
29 Décembre 1773	13	46	0	62	24	0	219	42	0
10 Février 1777	13	47	0	40	36	0	171	9	0
11 Avril 1770	13	48	0	38	30	0	154	35	0
En Mai 1773	13	49	0	45	47	26	163	53	0
11 Avril 1770	13	50	10	40	46	0	171	9	0
21 Mars 1773	13	59	0	49	55	0	157	3	0
5 Octobre 1769	14	2	0	37	0	0	183	35	0
10 Février 1777	14	3	5	40	46	0	171	9	0
14 Décembre 1774	14	14	0	53	25	0	270	39	0
6 Février 1777	14	26	20	43	49	0	162	38	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
13 Février 1774.....	14	30	0	50	13	0	261	34	0
6 Octobre 1769.....	15	4	0	37	0	0	176	35	0
Carteret.									
28 Avril 1767.....	15	10	0	44	27	0	276	11	0
Cook.									
10 Février 1774.....	15	17	0	53	17	0	260	11	0
15 Décembre 1773.....	15	26	0	66	23	0	222	28	0
Carteret.									
26 Avril 1767.....	16	17	0	45	57	0	276	13	0
Cook.									
11 Décembre 1773.....	17	18	0	60	42	0	184	31	0
Carteret.									
20 Avril 1767	17	20	0	48	4	0	276	39	0
18 Avril.....	17	36	0	49	18	0			
Cook.									
16 Décembre 1773.....	17	38	0	53	26	0	277	58	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	0	0	50	2	0	276	54	0
Cook.									
26 Janvier 1774.....	18	20	0	66	36	0	248	5	0
5 Décembre 1773.....	18	25	0	50	15	0	177	19	0
Bougainville.									
En 1766.....	19	0	0	52	22	0	279	16	0
Cook.									
2 Décembre 1773.....	19	13	0	62	46	0	187	9	0
Bougainville.									
En 1766.....	19	16	0	46	33	0	285	0	0
Byron.									
8 Janvier 1765.....	20	0	0	51	50	0	277	49	0
10 Janvier.....	20	0	0	51	31	0	278	51	0
Cook.									
17 Décembre 1774.....	20	6	0	53	21	0	281	18	0
En Décembre 1766.....	22	0	0	52	23	0	279	33	0
Dans le Détroit de Ma-									

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
gellan.....	22	10	0	54	3	0			
A la Rade d'Yorc, même Détroit.....	22	22	0						
Au Port de Famine, même Détroit.....	22	22	0						
Wallis.									
27 Décembre 1766.....	22	30	0	53	43	0	286	5.	0
Rade d'Yorc, au Détroit de Magellan.....	22	30	0	53	40	0			
Au Cap Quade, même Détroit.....	22	35	0	53	33	0			
22 Décembre.....	22	40	0	53	30	0	287	45	0
19 Janvier 1767.....	22	40	0	54	3	0			
20 Janvier, au Cap Hollande.....	22	40	0	53	50	0			
23 Janvier, au Cap Galant.	22	40	0	53	50	0			
18 Février, au Cap Wright.	22	40	0	53	5	0			
26 Décembre 1766....	22	50	0	33	18	0	286	5	0
Carteret.									
En Décembre 1766.....	22	50	0	53	23	0	289	33	0
Cook.									
4 Mars 1769.....	22	54	0	18	47	0	218	7	0
3 Février 1774.....	22	55	0	62	42	0	257	51	0
Carteret.									
En Décembre 1766, à l'Isle Elisabeth, au Détroit de Magellan.....	22	56	0						
Wallis.									
17 Décembre 1766.....	23	0	0	52	24	0	288	29	0
4 Mars 1767, dans le Détroit de Magellan...	23	0	0	52	22	0			
11 Avril 1767.....	23	0	0	52	46	0	281	35	0
Cook.									
En Janvier 1769.....	23	30	0	55	53	0	289	22	0

29 Janvier

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Est.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
29 Janvier 1764.....	24	18	0	70	0	0	250	30	0
26 Janvier 1769.....	27	9	0	60	10	0	283	5	0
4 Février 1774.....	25	42	0	65	42	0	257	51	0
	Déclinaison Ouest.								
Byron.									
19 Octobre 1765.....	0	0	0	21	10	0	231	20	0
Cook.									
21 Janvier 1776.....	0	5	25	43	27	0	140	10	0
Byron.									
30 Octobre 1765.....	0	30	0	7	14	0	253	14	0
Cook.									
21 Janvier 1777.....	0	43	2	43	27	0	140	10	0
Byron.									
23 Octobre 1765.....	1	20	0	21	18	0	239	21	0
Cook.									
21 Janvier 1776.....	1	20	40	43	27	0	140	10	0
22 Janvier 1777.....	3	1	10	43	33	0	140	26	0
.....	3	3	30	43	33	0	140	26	0
24 Janvier.....	3	3	55	43	48	0	145	47	0
30 Janvier.....	4	30	30	43	15	0	146	17	0
.....	5	3	0	43	15	0	146	17	0
.....	5	12	0	43	15	0	146	17	0
.....	5	13	25	43	15	0	146	17	0
22 Janvier.....	5	13	40	43	33	0	140	26	0
Cook et Bayli.									
23 Janvier 1777.....	5	16	40	43	48	0	144	31	0
24 Janvier.....	5	17	30	43	48	0	145	47	0
30 Janvier.....	5	20	30	43	15	0	146	17	0
23 Janvier.....	5	20	40	43	48	0	144	31	0
28 Janvier.....	5	24	20	43	21	0	145	28	0
30 Janvier.....	5	24	30	43	15	0	146	17	0
20 Janvier.....	5	37	30	43	48	0	145	47	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
30 Janvier 1777.....	5	40	0	43	15	0	146	17	0
28 Janvier.....	5	44	45	43	21	0	145	28	0
.....	5	46	40	43	21	0	145	28	0
30 Janvier.....	5	50	0	43	15	0	146	17	0
Cook.									
23 Janvier 1777	5	51	13	43	48	0	144	31	0
22 Janvier.....	5	52	0	43	33	0	140	26	0
28 Janvier.....	5	53	16	43	21	0	145	28	0
1 Août	5	54	15	27	43	0	154	54	0
23 Janvier.....	5	57	0	43	48	0	144	31	0
24 Janvier.....	6	3	15	43	48	0	145	47	0
2 Février.....	6	4	35	44	51	0	153	22	0
23 Janvier.....	6	20	20	43	48	0	144	31	0
.....	6	22	20	43	48	0	144	31	0
2 Février 1777	6	35	0	44	51	0	153	22	0
31 Juillet.....	6	38	30	27	51	0	156	45	0
26 Juillet.....	6	45	0	26	41	0	163	35	0
28 Janvier.....	6	45	15	43	21	0	145	28	0
Cook et Bayli.									
1 Juillet 1773.....	6	55	0	43	7	0	199	51	0
2 Février 1777.....	6	56	10	44	51	0	153	22	0
1 Août	6	59	15	27	43	0	1,4	54	0
2 Février.....	7	7	25	44	51	0	153	22	0
1 Août	7	8	45	27	43	0	154	54	0
.....	7	13	14	27	43	0	154	54	0
Cook.									
24 Janvier 1777.....	7	25	13	43	45	30	145	51	10
31 Juillet	7	30	45	27	51	0	156	45	0
.....	7	32	30	27	51	0	156	45	0
Furneau.									
11 Janvier 1774.....	7	36	0	58	17	0	210	12	0
Cook.									
2 Février 1777.....	7	36	44	44	51	0	152	39	0
31 Juillet.....	7	37	0	27	51	0	156	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
6 Août.....	7	39	20	25	17	0	149	49	0
1 Août.....	7	41	45	27	43	0	154	54	0
3 Juillet 1773.....	7	43	30	43	18	0	202	35	0
Furneau.									
14 Janvier 1774.....	7	45	0	58	48	0	215	21	0
Cook.									
6 Août 1777.....	7	48	30	27	43	0	154	54	0
30 Juin 1773.....	7	59	0	43	7	0	198	10	0
26 Juillet 1777.....	8	1	0	26	41	0	163	35	0
27 Juillet.....	8	3	30	25	57	0	162	35	0
26 Juillet.....	8	6	15	26	41	0	163	35	0
27 Juillet.....	8	8	15	25	57	0	162	35	0
.....	8	13	45	25	57	0	162	35	0
31 Juillet.....	8	18	15	27	51	0	156	45	0
17 Juillet.....	8	24	45	25	57	0	162	35	0
Furneau.									
19 Janvier 1774.....	8	25	0	59	24	0	238	22	0
Cook.									
19 Juillet 1777.....	8	28	10	22	25	0	171	9	0
.....	8	28	45	22	25	0	171	9	0
2 Juillet 1773.....	8	32	0	43	3	0	201	18	0
19 Juillet 1777.....	8	34	30	22	25	0	171	9	0
6 Juin.....	8	35	30	19	55	0	171	55	0
26 Juillet.....	8	37	30	26	41	0	163	35	0
Cook.									
24 Janvier.....	8	41	30	43	43	0	145	55	0
18 Mai.....	8	45	0	19	46	0	183	12	0
8 Mai.....	8	46	30	19	46	0	183	2	0
31 Juillet.....	8	47	45	22	25	0	171	9	0
19 Juillet.....	8	49	30	22	25	0	171	9	0
6 Juin.....	8	56	30	19	55	0	171	55	0
19 Juillet.....	9	2	30	22	25	0	171	9	0
6 Juin.....	9	5	45	19	55	0	171	55	0
Furneau.									
12 Janvier 1774.....	9	20	0	58	36	0	212	55	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
18 Mai 1777.....	9	21	30	19	46	0	171	58	0
2 Février 1777.....	9	28	30	44	51	0	153	22	0
18 Mai.....	9	28	45	19	46	0	171	58	0
2 Février.....	9	28	45	44	51	0	153	22	0
6 Juin.....	9	55	45	19	55	0	171	55	0
24 Janvier.....	10	2	20	43	43	0	145	35	0
Cook et Bayli.									
24 Janvier.....	10	13	30	43	43	0	145	55	0
.....	10	18	15	43	43	0	145	55	0
23 Mai.....	10	19	0	19	46	0	171	56	0
22 Juin 1773.....	10	19	0	44	41	0	195	12	0
24 Janvier 1767.....	10	23	10	43	43	0	145	55	0
23 Mai.....	10	31	30	19	46	0	171	56	0
18 Mai.....	10	40	15	19	46	0	173	12	0
24 Juin 1773.....	10	43	0	44	38	0	196	8	0
23 Mai 1777.....	10	47	30	19	46	0	171	56	0
.....	10	53	30	19	46	0	171	56	0
Furneau.									
21 Janvier 1774.....	11	6	0	60	9	0	244	23	0
Cook.									
24 Janvier 1777.....	11	7	45	43	43	0	145	55	0
5 Février.....	11	11	15	42	29	0	161	44	0
Furneau.									
22 Janvier 1774.....	11	15	0	59	30	0	246	9	0
Cook.									
5 Février 1777.....	11	18	45	42	29	0	161	44	0
15 Juin 1773.....	11	24	30	46	46	0	183	35	0
4 Février 1777.....	11	27	0	43	43	0	159	3	0
23 Mai.....	11	44	45	19	46	0	161	44	0
Furneau.									
24 Janvier 1774.....	13	12	0	59	35	0	252	19	0
2 Janvier.....	15	30	0	51	37	0	180	24	0
Byron.									
22 Mai 1765.....	19	0	0	20	52	0	241	57	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Déclinaison Ouest.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Wallis.									
11 Février 1768.....	19	30	0	34	0	0	159	35	0
Bougainville.									
En Janvier 1768, au Port Galant, Détroit de Magellan.....	22	30	32	53	40	0			
Furneau.									
28 Janvier 1774.....	22	48	0	61	45	0	268	35	0
29 Janvier.....	24	30	0	61	49	0	273	24	0
31 Janvier.....	26	6	0	61	20	0	285	55	0

TABLES

CONTENANT LES OBSERVATIONS *qui ont été faites, dans ces derniers tems, sur l'Inclinaison de l'Aiguille aimantée.*

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER ATLANTIQUE.

NOMS DES VOYAGEURS ET DATES DES OBSERVATIONS.	INCLINAISON.			LATITUDES.			LONGITUDES.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
LE GENTIL.									
En 1771.....	0	45	0	10	2	0	349	28	0
.....	2	30	0	11	10	0	351	2	0
.....	4	45	0	12	18	0	352	47	0
.....	4	52	30	8	50	0	347	53	0
.....	7	22	30	7	57	0	343	41	0
.....	10	37	30	14	43	0	356	0	0
.....	10	45	0	5	40	0	342	40	0
.....	14	37	30	4	12	0	341	8	0
.....	14	37	30	10	21	0	357	49	0
BAYLI.									
15 Septembre 1776.....	24	21	45	0	42	0	344	11	0
ECKBERG.									
En Mars 1774.....	26	45	0	0	49	0	337	59	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
En Avril 1775.....	26	52	0	2	14	0	335	0	0
En Mars 1774.....	27	0	0	1	4	0	337	53	0
.....	27	52	0	1	54	0	337	54	0
.....	29	26	0	2	22	0	337	57	0
Bayli.									
11 Juin 1780.....	29	28	30	1	10	0	331	5	0
Eckberg.									
En Mars 1774.....	30	48	0	3	49	0	337	57	0
Bayli.									
8 Septembre 1776....	31	16	30	4	24	0	343	45	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	31	52	0	4	28	0	333	42	0
Cook.									
31 Août 1776.....	32	24	30	1	4	30	331	13	0
13 Juin 1780.....	32	52	0	3	48	0	331	45	0
30 Août 1776.....	33	15	0	2	9	45	332	44	0
29 Août.....	34	30	0	2	43	55	334	25	0
Eckberg.									
En Mars 1774.....	34	30	0	5	55	0	337	24	0
Cook.									
17 Août 1776.....	35	17	30	3	39	45	335	17	0
16 Juin.....	35	37	0	5	25	0	330	17	0
Cook.									
25 Août 1776.....	37	25	0	5	2	0	337	25	0
23 Août.....	38	3	0	6	2	0	336	53	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	38	22	0	6	43	0	331	56	0
Cook.									
18 Juin 1779.....	38	30	0	18	35	45			
Bayli.									
17 Juin 1780.....	39	0	0	6	26	0	331	40	0
Cook.									
22 Août 1779.....	39	24	0	6	31	30	336	38	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Mars 1774.....	39	41	0	8	18	0	336	43	0
Chappe.									
En 1769.....	40	47	0	19	10	0			
Cook.									
19 Août 1776.....	42	19	30	8	50	45	334	57	0
23 Juin 1780.....	42	52	0	9	44	0	328	41	0
Bayli.									
22 Juin 1780.....	43	26	20	9	43	0	328	33	0
Le Gentil.									
En 1771.....	44	0	0	12	13	0	331	39	0
Cook.									
18 Août 1776.....	44	12	45	10	0	0	334	43	0
Bayli.									
30 Août 1776.....	44	39	45	11	0	0	334	5	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	44	45	0	10	38	0	336	33	0
Le Gentil.									
En 1771.....	46	30	0	13	12	0	330	55	0
Chappe.									
En 1769.....	46	30	0	17	47	0	283	40	0
Cook.									
16 Août 1776.....	46	47	30	11	43	0	333	16	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	46	52	0	13	1	0	335	33	0
Cook.									
16 Août 1776.....	47	0	0	12	1	45	333	49	0
Chappe.									
En 1769.....	47	15	0	15	12	0	293	42	0
.....	48	55	0	15	12	0	300	29	0
.....	49	0	0	22	18	0	271	44	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	49	45	0	16	10	0	324	42	0
Mars 1774.....	49	56	0	15	0	0	336	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1771.....	50	0	0	17	7	0	327	52	0
Cook.									
28 Juin 1780.....	50	37	0	15	25	0	324	9	0
12 Août 1776.....	51	0	0	15	8	0	333	57	0
Bayli.									
26 Août 1776.....	51	14	0	16	20	0	333	53	0
28 Juin 1780.....	51	37	0	16	45	0	322	41	0
Le Gentil.									
En 1771.....	51	37	30	18	23	0	327	16	0
Cook.									
10 Août 1776.....	52	34	30	17	2	0	335	35	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	53	0	0	16	40	0	336	15	0
Le Gentil.									
En 1771.....	53	37	30	20	1	0	326	19	0
Chappe.									
En 1769.....	54	7	0	18	4	0	314	47	0
Cook.									
1 Juillet 1780.....	54	40	0	20	0	0	320	38	0
9 Août 1776.....	55	1	0	19	17	0	337	7	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	55	7	0	18	34	0	335	34	0
Cook.									
8 Août 1776.....	56	15	0	20	47	0	337	59	0
Bayli.									
23 Août 1776.....	56	45	0	21	0	0	335	5	0
Cook.									
7 Août 1776.....	57	25	0	22	25	0	338	35	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	57	52	0	21	24	0	336	38	0
Le Gentil.									
En 1771.....	58	45	0	26	34	0	322	52	0
Cook.									
6 Août 1776.....	59	0	45	24	24	30	339	24	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
4 Juillet 1780.....	59	7	0	24	4	0	318	50	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	59	30	0	22	51	0	321	38	0
Chappe.									
En 1769.....	59	31	0	23	12	0	329	25	0
Bayli.									
4 Juillet 1780.....	59	42	45	24	2	0	318	15	0
Chappe.									
En 1769.....	60	1	0	27	46	0	342	24	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	60	11	0	24	25	0	337	6	0
Bayli.									
19 Août 1776.....	60	51	30	27	39	0	327	5	30
Le Gentil.									
4 Août 1776.....	60	52	30	28	26	0	322	3	0
Chappe.									
En 1769.....	60	56	0	26	26	0	338	30	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	61	15	0	26	11	0	321	46	0
Le Gentil.									
En 1771.....	61	37	30	28	58	0	322	4	0
Cook.									
4 Août 1776.....	61	52	30	28	30	30	341	15	0
Eckberg.									
Février 1774.....	62	11	0	27	36	0	338	45	0
Cook.									
31 Juillet 1766.....	62	17	0	29	18	0	341	8	0
Le Gentil.									
En 1771.....	62	37	30	29	54	0	322	16	0
.....	63	15	0	31	6	0	322	16	0
Eckberg.									
En Mai 1775.....	63	22	0	27	43	0	322	47	0
.....	64	34	0	30	16	0	323	29	0
Cook.									
9 Juillet 1780.....	65	1	10	39	33	0	316	32	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
9 Juillet 1780.....	65	1	10	39	33	0	315	47	0
Eckberg.									
Février 1774.....	65	3	0	30	0	0	340	2	0
Bayli.									
13 Août 1776.....	65	29	0	33	10	0	340	26	0
12 Août.....	66	1	30	33	48	0	342	5	30
Cook.									
28 Juillet 1776.....	66	12	0	34	57	15	343	27	0
Eckberg.									
Février 1774.....	66	22	0	33	1	0	340	46	0
Mai 1775.....	66	32	0	34	57	0	324	36	0
Cook.									
12 Juillet 1780.....	67	0	0	32	11	0	317	25	0
Eckberg.									
Février 1774.....	67	11	0	35	41	0	341	38	0
Bayli.									
13 Juillet 1780.....	67	41	30	33	17	0	315	25	0
Eckberg.									
Février 1774.....	68	3	0	37	55	0	341	25	0
Cook.									
27 Juillet 1776.....	68	22	0	36	34	45	344	4	0
Le Gentil.									
En 1771.....	68	37	30	38	15	0	321	55	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	68	49	0	39	24	0	325	56	0
Février 1774.....	69	37	0	41	15	0	341	36	0
Cook.									
17 Juillet 1780.....	70	3	30	36	13	0	317	34	0
22 Juillet.....	70	7	0	38	20	0	320	27	0
Bayli.									
21 Juillet 1776.....	70	11	0	37	51	0	320	39	0
Cook.									
26 Juillet 1776.....	70	30	0	38	53	0	345	34	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Mai 1775.....	70	49	0	44	10	0	330	40	0
Février 1771.....	71	11	0	44	30	0	342	38	0
Le Gentil.									
A Basle en Suisse.....	71	30	0	47	55	0			
Cook.									
22 Juillet 1776.....	71	34	0	44	5	0	349	25	0
A Paris.....	71	35	0	48	50	30	360	0	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	71	52	0	50	30	0	355	47	0
Cook.									
28 Juillet 1780.....	72	7	30	41	9	0	326	16	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	72	11	0	49	17	0	352	27	0
Phipps.									
5 Juin 1773.....	72	12	0	Près de Harwich.					
Cook.									
5 Août 1780.....	72	15	0	45	50	0	338	17	0
Le Gentil.									
A Berlin.....	72	15	0	53	31	30			
Eckberg.									
Février 1774.....	72	15	0	48	30	0	340	33	0
Mai 1775.....	72	18	0	44	48	0	345	53	0
Chappe.									
En 1769.....	72	24	0	36	31	0	350	56	0
Bayli.									
27 Juillet 1780.....	72	30	15	40	55	0	323	28	0
Eckberg.									
Février 1774.....	72	45	0	50	16	0	338	58	0
Bayli.									
30 Juillet 1780.....	72	52	30	39	57	0	325	58	0
Le Gentil.									
En 1771.....	73	7	30	39	57	0	325	58	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Phipps.									
6 Juin 1773.....	73	22	0	52	22	0	358	53	0
Bayli.									
3 Août 1780.....	73	24	20	45	8	0	333	4	0
Eckberg.									
Février 1774.....	73	30	0	52	24	0	338	24	0
Phipps.									
14 Juin 1773.....	73	30	0	60	16	0	354	38	0
2 Juin.....	73	31	0	51	35	0	358	31	0
A Péterſbourg.....	73	45	0	59	59	0			
Bayli.									
11 Août 1780.....	74	18	20	52	28	0	341	20	0
Eckberg.									
Janvier 1774.....	74	41	0	54	0	0	335	50	0
.....	74	41	0	57	15	0	359	21	0
Bayli.									
14 Août 1780.....	74	49	30	53	34	0	341	53	0
Phipps.									
15 Juin 1773.....	74	52	0	60	19	0	357	18	0
.....	75	0	0	60	18	0	356	39	30
14 Juin 1773.....	75	18	0	60	16	0	354	38	0
Bayli.									
26 Août 1780.....	75	52	0	58	56	0	354	4	0
Eckberg.									
Janvier 1774.....	76	17	0	57	8	0	339	57	0
Bayli.									
20 Août 1780.....	76	28	30	58	44	0	352	13	0
17 Août.....	76	39	0	56	10	0	344	54	0
Phipps.									
16 Juin 1773.....	76	45	0	60	29	0	357	15	0
Eckberg.									
Janvier 1774.....	76	48	0	59	39	0	349	20	0
A Kola.....	77	45	0	68	52	0			
Phipps.									
22 Juin 1773.....	77	52	0	70	45	0	356	59	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
21 Juin.....	79	4	0	69	2	0	357	35	0
26 Juin.....	79	22	0	74	30	0	7	33	0
30 Juin.....	79	30	0	73	36	0	2	5	0
.....	79	30	0	78	8	0	7	3	0
29 Juin.....	80	26	0	78	2	0	7	6	0
24 Juin.....	80	35	0	73	22	0	1	35	0
.....	80	35	0	73	40	0	356	58	0
.....	80	45	0	78	22	0	7	3	0
28 Juin.....	81	7	0	77	48	0	4	45	0
9 Juillet.....	81	52	0	80	12	0	359	37	0
15 Juillet, sur une Isle...	82	0	0	79	50	0	7	38	0
29 Août.....	82	2	30	80	27	0	12	51	0
30 Septembre, sur une Isle.	82	8	45	79	44	0	6	43	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER ATLANTIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.	Latitudes.	Longitudes.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Eckberg.			
Mars 1774.....	0 3 0	13 21 0	335 55 0
Avril 1775.....	0 12 0	11 42 0	346 42 0
Cook.			
31 Mai 1780.....	0 12 0	12 0 0	341 23 0
Bayli.			
30 Mai 1780.....	0 24 40	12 54 0	342 2 0
Eckberg.			
Mars 1774.....	0 37 0	13 57 0	335 51 0
Bayli.			
31 Mai 1780.....	0 53 0	12 37 0	341 43 0
Cook.			
31 Mai 1780.....	1 14 30	12 11 0	341 37 0
Bayli.			
27 Septembre 1776....	1 16 0	14 51 0	334 19 0
Cook.			
31 Mai 1780.....	1 18 30	12 46 0	341 50 0
Bayli.			
27 Septembre 1776.....	1 25 30	13 30 0	334 35 0
.....	1 36 30	14 51 0	334 19 0
30 Mai 1780.....	1 51 0	13 33 0	342 37 0
Eckberg.			
Mars 1774.....	1 51 0	13 2 0	336 2 0
Bayli.			
1 Juin 1780.....	1 58 0	11 50 0	340 59 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Mars 1774.....	2	12	0	14	29	0	335	57	0
Cook.									
2 Juin 1780.....	2	30	0	11	15	0	340	20	0
Bayli.									
29 Mai 1780.....	2	48	30	13	47	0	343	1	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	2	52	0	12	19	0	336	13	0
.....	3	30	0	12	32	0	347	52	0
.....	3	56	0	12	2	0	336	32	0
Cook.									
13 Septembre 1776.....	3	58	0	16	4	0	322	59	0
.....	4	21	0	16	0	0	323	0	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	4	26	0	16	33	0	335	44	0
Cook.									
30 Mai 1780.....	4	41	15	13	39	45	342	43	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	4	45	0	13	54	0	348	59	0
.....	4	56	0	10	21	0	345	19	0
Bayli.									
5 Juin 1780.....	5	12	0	11	15	0	340	3	0
25 Septembre 1777....	5	50	30	11	20	0	335	38	0
28 Mai 1780.....	6	6	10	14	50	0	344	21	0
Cook.									
14 Septembre 1776....	6	27	0	17	22	0	322	15	0
Bayli.									
26 Mai 1780.....	6	45	20	16	40	0	346	37	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	6	56	0	14	43	0	349	48	0
Cook.									
28 Mai 1780.....	6	56	30	14	56	0	344	35	0
Bayli.									
25 Septembre 1776....	7	41	30	10	0	0	336	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Mars 1774.....	7	48	0	9	52	0	336	29	0
.....	8	27	0	18	17	0	336	6	0
Cook.									
27 Mai 1780.....	8	27	15	15	54	0	345	31	0
5 Juin.....	9	0	0	8	51	0	337	32	0
10 Septembre 1776....	9	15	0	11	25	30	323	11	0
Bayli.									
29 Septembre 1776.....	9	38	15	18	45	0	333	35	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	9	52	0	15	35	0	350	35	0
Mars 1774.....	10	37	0	19	36	0	337	12	0
Bayli.									
5 Juin 1780.....	11	15	10	8	51	0	336	54	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	11	37	0	20	8	0	337	30	0
Bayli.									
1 Octobre 1776.....	12	2	30	20	49	0	332	55	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	12	41	0	8	50	0	344	17	0
Bayli.									
25 Mai 1780.....	12	43	10	17	52	0	347	41	0
Cook.									
9 Septembre 1776.....	13	28	0	9	52	0	323	5	0
Bayli.									
23 Septembre	13	36	15	7	0	0	337	15	0
Cook.									
25 Mai 1780.....	13	37	0	18	12	0	348	28	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	13	41	0	7	18	0	336	29	0
....	14	15	0	20	30	0	337	32	0
Cook.									
7 Septembre 1776....	14	17	30	8	10	0	323	35	0
Eckberg.									
Janvier 1774.....	14	19	0	16	8	0	352	40	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
7 Juin 1780.....	15	0	0	4	50	0	334	55	0
17 Septembre 1776....	15	8	0	21	57	0	321	35	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	15	52	0	7	6	0	342	37	0
Mars 1774.....	16	26	0	5	3	0	342	35	0
.....	16	30	0	21	15	0	337	50	0
Bayli.									
20 Septembre 1776.....	17	34	12	3	23	0	339	15	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	17	52	0	22	11	0	339	10	0
Cook.									
6 Septembre 1776.....	17	57	0	7	3	0	324	14	0
Le Gentil.									
En 1771.....	18	22	30	2	30	0	339	46	0
Bayli.									
5 Octobre 1776.....	19	42	0	24	40	0	333	44	0
Cook.									
9 Juin 1780.....	20	15	0	3	12	0	332	31	0
Bayli.									
8 Juin.....	20	19	45	4	50	0	333	43	0
Le Gentil.									
En 1771.....	20	30	0	18	39	0	359	31	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	21	10	0	23	35	0	340	57	0
Cook.									
19 Septembre 1775....	21	33	0	25	37	0	322	35	0
Bayli.									
17 Septembre.....	21	45	0	0	49	0	343	8	0
Cook.									
4 Septembre 1776....	22	15	30	4	40	45	327	1	0
Eckberg									
Avril 1774.....	22	25	0	25	3	0	340	55	0
Mars 1774.....	22	30	0	2	40	0	337	33	0
Avril 1775.....	22	37	0	2	4	0	337	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inlcinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
22 Mai 1776.....	22	45	0	22	16	0	353	18	0
Le Gentil.									
En 1771.....	23	0	0	0	12	0	338	48	0
.....	23	0	0	21	8	0	1	27	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	23	30	0	25	41	0	341	11	0
Cook.									
20 Septembre 1775	23	36	0	27	1	30	323	40	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	24	30	0	22	18	0	358	59	0
Cook.									
3 Septembre 1776.....	24	43	0	3	14	30	328	13	0
Bayli.									
20 Mai 1780.....	24	47	45	23	34	0	355	19	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	25	0	0	26	13	0	342	1	0
Mars 1774.....	25	18	0	1	9	0	337	57	0
Cook.									
21 Septembre 1776....	25	26	0	27	52	0	325	0	0
11 Juin 1780	25	52	0	0	19	0	331	35	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	26	0	0	27	10	0	343	45	0
Le Gentil.									
En 1771.....	26	30	0	1	49	0	336	14	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	26	45	0	27	12	0	345	7	0
Cook.									
21 Septembre 1776.....	26	49	0	27	58	0	325	20	0
Le Gentil.									
En 1771.....	27	30	0	22	40	0	3	10	0
.....	27	30	0	23	8	0	3	42	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	27	30	0	28	46	0	347	47	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
8 Octobre 1776.....	27	51	15	28	47	0	336	45	0
Cook.									
2 Septembre 1776.....	27	51	30	1	32	0	328	57	0
20 Mai 1780.....	28	15	0	24	35	0	357	35	0
24 Septembre 1776....	29	2	0	30	16	30	329	33	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	29	37	0	30	20	0	350	59	0
Cook.									
1 Septembre 1776....	30	3	30	0	3	0	329	57	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	31	26	0	26	37	0	3	25	0
Le Gentil.									
En 1771.....	31	52	30	3	26	0	337	58	0
Bayli.									
14 Octobre 1776.....	31	52	30	30	24	0	340	17	0
18 Mai 1780.....	32	43	30	26	25	0	1	5	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	32	45	0	31	36	0	354	9	0
Le Gentil.									
En 1771.....	33	15	0	5	31	0	337	43	0
Cook.									
17 Mai 1780.....	34	22	0	27	36	0	3	23	0
29 Septembre 1776....	34	22	30	33	47	0	340	54	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	35	15	0	32	23	0	356	43	0
Cook.									
3 Octobre 1776.....	36	13	30	34	32	0	348	25	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	37	15	0	33	7	0	359	3	0
Bayli.									
19 Octobre 1776.....	37	16	30	33	41	0	354	55	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	37	32	0	33	7	0	360	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Avril 1774.....	37	52	0	33	36	0	0	33	0
Cook.									
7 Octobre 1776.....	38	7	30	35	17	30	349	39	0
8 Octobre.....	38	49	0	35	31	0	350	0	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	39	0	0	34	9	0	3	9	0
Bayli.									
21 Octobre 1776.....	39	4	30	33	40	0	359	7	0
Cook.									
15 Mai 1780.....	39	5	0	29	54	0	8	15	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	39	50	0	34	16	0	3	32	0
.....	40	22	0	34	52	0	6	35	0
Cook.									
10 Octobre 1776.....	40	30	0	35	47	0	355	10	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	40	45	0	30	18	0	7	22	0
Bayli.									
15 Mai 1780.....	40	53	45	29	53	0	8	10	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	41	0	0	34	49	0	9	2	0
Le Gentil.									
En 1771.....	41	7	30	10	14	0	333	48	0
Bayli.									
26 Octobre 1776.....	41	26	30	34	5	0	6	25	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	41	30	0	34	36	0	10	32	0
.....	42	0	0	32	51	0	11	2	0
Le Gentil.									
En 1771.....	42	0	0	10	0	0	336	2	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	42	30	0	34	36	0	12	50	0
.....	43	30	0	34	35	0	14	44	0
Le Gentil.									
En 1771.....	44	0	0	11	8	0	332	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Avril 1774.....	44	7	0	34	12	0	15	50	0
.....	44	15	0	34	12	0	16	45	0
Cook.									
13 Mai 1780.....	44	20	0	32	32	0	13	31	0
Eckberg,									
Avril 1774.....	44	27	0	34	8	0	15	47	0
Bayli.									
8 Novembre 1776.....	44	48	0	34	5	0	15	25	0
21 Avril 1780, à Fals-bay, au Cap de Bonne-espérance.....	46	46	0	34	11	0	15	56	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER DES INDES.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Juillet 1774.....	0	5	0	9	24	0	105	47	0
Le Gentil.									
En 1768, à 15 ou 20 lieues de Ceylan, & à 30 de la Côte de Tanjaour.....	0	44	0	10	7	0	78	35	0
A 25 lieues de Négapatan.	0	49	0	10	39	0	79	35	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	0	52	0	10	0	0	106	23	0
Le Gentil.									
En 1766, allant à Manille par les Isles de la Sonde.	0	52	30	7	22	0			
.....	1	30	0	8	22	0			
Bayli.									
29 Janvier 1780.....	1	33	0	7	15	0	103	35	0
Le Gentil.									
En 1770, à bord du Dauphin.....	1	37	0	9	38	0	83	30	0
Cook.									
29 Janvier 1780.....	1	39	30	6	53	45	102	54	0
26 Janvier, dans le Havre de Pulo-Condor.....	1	55	30	8	39	0	103	54	0
20 Janvier.....	2	0	0	8	46	30	105	20	0
Bayli.									
27 Janvier 1780.....	2	1	0	8	40	0	104	19	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
20 Janvier.....	2	11	20	8	45	0	104	55	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	2	15	0	7	42	0	104	47	0
Le Gentil.									
En 1768, hors le Détroit de Malaca, dans les Isles de Nicobar, à 90 lieues de la presqu'Isle de Malaca, 50 de Sumatra, & 250 de la presqu'Isle de l'Inde.....	2	41	0	7	45	0			
En 1770.....	2	52	30	8	8	0	84	27	0
En 1768, à 50 lieues de la presqu'Isle & 40 de la pointe d'Achem....,	2	52	30	7	31	0			
A 40 lieues de la presqu'Isle, & 40 de la pointe d'Achem.....	2	22	30	6	31	0			
En 1770.....	3	37	30	10	40	0	82	56	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	4	37	0	11	27	0	107	12	0
Le Gentil.									
En 1768, à 20 lieues de Sumatra.....	4	56	0	6	9	0			
En 1770.....	5	35	0	12	3	0	82	19	0
En 1768, à demi-lieue de Pol-pinang, 7 de la presqu'Isle, & 40 de Sumatra.....	6	22	30	5	25	0			
En 1770.....	6	37	30	6	8	0	84	57	0
Bayli.									
30 Janvier 1780.....	7	3	45	4	47	0	102	30	0
Le Gentil.									
En 1768, à 7 lieues de la presqu'Isle de Malaça,									

40 de

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
40 de Sumatra & 15 de Pol-Pinany	7	26	0	4	55	0			
A 15 lieues de la presqu'Isle & à 30 de Sumatra	8	43	30	4	2	0			
En 1770	8	52	30	13	29	0	82	1	0
Cook.									
31 Janvier 1780	9	2	15	3	18	20	101	51	0
Eckberg.									
Juillet 1774	9	15	0	14	1	0	109	22	0
Le Gentil.									
En 1768, à 15 lieues de la presqu'Isle, & 25 de Sumatra	9	31	30	3	48	0			
En 1770	9	37	30	4	28	0	85	27	0
Eckberg.									
Juillet 1774	10	3	0	3	30	0	101	42	0
Le Gentil.									
En 1768, proche les Isles de Dam, à 20 lieues de la presqu'Isle & 12 de Sumatra	10	59	30	2	12	0			
A 6 lieues de la presqu'Isle & 20 de Sumatra	11	7	30	2	12	0			
En 1770	11	41	0	3	24	0	85	52	0
En 1768, à 15 lieues de la presqu'Isle de Malaca, & environ cent toises de Pol-aor	12	0	0	4	6	0			
Dans la Rade de Malaca	12	20	0	2	12	0			
En 1770	12	22	15	2	24	0	85	17	0
Eckberg.									
Août 1774	12	30	0	18	3	0	108	32	0
Cook.									
1 Février 1780	12	51	45	1	20	45	102	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1768, à 3 lieues de la presqu'Isle, & 15 de Sumatra.....	13	5	0	4	6	0			
Dans le Détroit, à 2 lieues du Mont Formose, & à 15 de Sumatra.....	13	7	30	4	6	0			
Bayli.									
17 Janvier 1780.....	13	11	40	12	54	0	109	35	0
1 Février.....	13	16	0	1	20	0	103	5	0
Le Gentil.									
En 1770.....	14	18	30	1	50	0	86	28	0
.....	15	45	0	1	0	0	86	29	0
En 1776, allant à Manille, par les Isles de la Sonde.....	16	30	0	0	44	0			
Eckberg.									
Août 1774.....	19	52	0	19	34	0	107	32	0
Cook.									
15 Janvier 1780.....	21	32	30	18	58	0	111	16	0
Bayli.									
27 Novembre 1779....	23	38	45	20	35	0	113	22	0
Cook.									
20 Novembre 1779.....	25	56	0	22	7	30	127	22	0
Bayli.									
19 Novembre 1779.....	26	5	20	22	48	0	130	15	0
13 Décembre.....	27	1	0	22	9	0	111	11	0
Cook.									
16 Novembre 1779.....	30	48	0	25	5	0	136	18	0
Eckberg.									
Août 1774.....	36	10	0	23	30	0	110	2	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER DES INDES.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
2 Février 1780.....	15	22	0	0	22	0	102	29	0
Le Gentil.									
En 1776, hors le Détroit de Banca, à 9 lieues de Monopin, & à 8 de Sumatra.....	17	45	0	1	38	0			
En 1770.....	17	52	0	0	6	0	86	31	0
En 1776, à 4 lieues des Montagnes de Monopin, & à 2 lieues & demie de Sumatra.....	19	0	0	2	6	0			
A 2 lieues & demie de Sumatra.....	19	15	0	2	12	0			
A 2 lieues de Sumatra...	19	22	30	2	21	0			
En 1770.....	19	26	0	1	14	0	86	57	0
En 1776, à deux-tiers de lieue de la premiere pointe de Banca.....	20	22	30	2	43	0			
Dans le Détroit de Banca, à demi-lieue de Sumatra.	20	22	30	3	9	0			
En 1776, à 7 lieues de Sumatra.....	21	15	0	3	8	0			
Eckberg.									
Juillet 1774.....	21	37	0	2	20	0	102	8	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1766, à 6 lieues de Sumatra.....	21	52	0	4	4	0			
En 1770.....	22	30	0	2	47	0	87	36	0
Bayli.									
5 Février 1780.....	22	36	30	3	15	0	103	44	0
Le Gentil.									
En 1770.....	23	52	30	3	55	0	88	4	0
Cook.									
6 Février 1780.....	24	22	0	4	36	30	101	37	0
Le Gentil.									
En 1776, à 6 lieues de Sumatra, 15 de Java & une des deux Sœurs...	24	30	0	5	2	0			
En 1770.....	24	48	30	4	24	0	88	8	0
En 1776, à 6 lieues de la Pointe Saint-Nicolas & 4 trois-quarts de Sumatra.....	25	7	30	5	33	0			
En 1770.....	25	22	30	4	25	0	88	11	0
.....	25	22	30	4	26	0	88	13	0
En 1776, à une lieue de la pointe Horale, Détroit de la Sonde.....	25	30	0	6	3	0			
En 1770.....	26	0	0	4	52	0	88	33	0
A 2 lieues & demie de la Pointe Saint-Nicolas..	26	0	0	5	46	0			
Bayli.									
12 Février 1780.....	26	2	45	6	5	0	104	11	0
Le Gentil.									
En 1776, à 2 lieues de Java.	26	22	30	6	13	0			
En 1770.....	26	26	0	4	30	0	88	4	0
En 1771.....	26	30	0	1	49	0	336	14	0
En 1776, à trois-quarts de lieue de la premiere									

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
pointe de Java.....	26	45	0	6	31	0			
Eckberg.									
Janvier 1775.....	26	49	0	5	45	0	101	57	0
Le Gentil.									
En 1776.....	26	52	30	5	7	0	88	18	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	26	56	0	5	59	0	101	8	0
Le Gentil.									
En 1770.....	27	41	0	5	38	0	87	57	0
En 1776.....	27	52	30	6	58	0	88	5	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	28	0	0	6	30	0	100	57	0
Janvier 1775.....	28	0	0	6	28	0	101	2	0
Cook.									
17 Février 1780.....	28	15	0	24	35	0			
Eckberg.									
Juillet 1774.....	28	30	0	7	37	0	101	30	0
Le Gentil.									
En 1770.....	29	22	30	6	47	0	87	18	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	29	26	0	7	59	0	102	29	0
.....	29	57	0	8	27	0	102	32	0
Bayli.									
19 Février 1780.....	30	23	45	8	17	0	102	55	0
Eckberg.									
Juillet 1784.....	30	37	0	8	41	0	105	6	0
.....	30	56	0	8	49	0	108	3	0
Le Gentil.									
En 1770.....	31	15	0	7	35	0	86	37	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	31	45	0	6	42	0	101	53	0
Le Gentil.									
En 1770.....	31	52	30	8	1	0	86	10	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	32	52	0	9	23	0	105	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Janvier 1775.....	32	52	0	9	24	0	99	32	0
Le Gentil.									
En 1770.....	33	56	0	8	52	0	85	4	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	34	37	0	11	0	0	99	9	0
Cook.									
23 Février 1780.....	35	0	0	13	35	0	100	58	0
Le Gentil.									
En 1770.....	35	45	0	10	7	0	83	46	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	36	0	0	11	56	0	104	13	0
.....	38	56	0	14	53	0	104	33	0
Janvier 1775.....	39	15	0	14	6	0	97	22	0
Le Gentil.									
En 1770.....	39	18	30	11	42	0	82	2	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	41	30	0	17	19	0	93	14	0
Juin 1774.....	42	7	0	17	6	0	103	39	0
Le Gentil.									
En 1770.....	42	7	30	13	19	0	80	20	0
.....	44	3	30	14	13	0	78	52	0
Eckberg.									
Juillet 1774,.....	44	52	0	19	47	0	102	30	0
Cook.									
1 Mars 1780.....	45	4	0	16	51	0	89	12	0
Le Gentil.									
En 1770.....	45	7	30	15	0	0	77	41	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	45	15	0	35	16	0	20	49	0
Cook.									
6 Avril 1780.....	45	37	0	35	49	0	19	8	0
Le Gentil.									
En 1763, à la Baye d'Antongil, à Madagascar. .	45	45	0						

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Janvier 1775.....	46	3	0	20	34	0	87	42	0
.....	46	52	0	35	48	0	21	41	0
.....	46	56	0	35	15	0	22	11	0
Le Gentil.									
En 1770.....	47	7	30	15	58	0	76	18	0
Cook.									
4 Mars 1780.....	47	22	0	18	29	0	86	30	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	47	52	0	21	42	0	102	49	0
Bayli.									
2 Mars 1780.....	47	57	20	17	56	0	84	55	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	48	22	0	34	29	0	25	8	0
Le Gentil.									
En 1763, à Foulpointe, à Madagascar.....	48	32	0						
A l'Isle Sainte-Marie, sur la Côte de Madagascar.	48	32	20						
En 1770.....	49	30	0	17	15	0	74	44	0
Cook.									
6 Décembre 1776.....	49	30	0	39	0	0	21	7	0
4 Avril 1780.....	49	37	0	35	23	0	22	30	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	49	52	0	34	39	0	26	40	0
Bayli.									
6 Avril 1780.....	50	7	45	35	48	0	19	15	0
Cook.									
1 Avril.....	50	27	0	32	11	0	28	16	0
Le Gentil.									
En 1770.....	50	27	30	18	20	0	72	52	0
Eckberg.									
Mai 1774.....	50	30	0	36	54	0	23	8	0
Janvier 1775.....	50	41	0	22	23	0	82	41	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
3 Avril 1780.....	51	16	15	35	0	0	21	16	0
Le Gentil.									
En 1770.....	51	30	0	19	14	0	70	18	0
Bayli.									
5 Décembre 1776.....	51	33	0	38	54	0	21	5	0
Le Gentil.									
En 1770.....	52	3	30	19	28	0	67	27	0
En 1763, au Fort Dauphin, à Madagascar...	52	5	0						
Cook.									
9 Mars 1780.....	52	7	0	20	33	30	72	45	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	52	11	0	35	0	0	29	36	0
Bayli.									
8 Mars 1780.....	52	16	10	20	4	0	74	45	0
Eckberg.									
Mai 1774.....	52	30	0	37	4	0	25	24	0
Juin 1774.....	52	52	0	23	12	0	101	22	0
Bayli.									
30 Mars 1780.....	53	7	15	31	3	0	31	0	0
Le Gfntil.									
En 1770.....	53	35	0	19	45	0	61	21	0
Eckberg.									
Mai 1774.....	54	0	0	36	44	0	30	14	0
Cook.									
27 Mars 1780.....	54	17	0	31	3	0	34	59	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	54	30	0	25	37	0	97	39	0
Bayli.									
11 Mars 1780.....	54	36	15	20	54	0	69	11	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	54	52	0	24	17	0	71	52	0
.....	55	0	0	32	34	0	36	44	0

Cook.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
15 Mars 1780.....	55	52	0	22	37	30	60	38	0
Bayli.									
25 Mars 1780.....	55	58	30	26	36	0	52	5	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	56	0	0	29	37	0	94	38	0
Mars 1774.....	56	11	0	36	39	0	36	42	0
Cook.									
24 Mars 1780.....	56	15	0	29	6	0	40	28	0
Bayli.									
16 Mars 1780.....	56	48	30	23	13	0	57	52	0
Cook.									
18 Mars 1780.....	57	29	30	25	8	45	56	8	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	57	34	0	30	48	0	42	7	0
.....	57	45	0	26	2	0	63	22	0
Juin 1774.....	57	52	0	32	45	0	88	17	0
Janvier 1775.....	58	30	0	28	58	0	48	2	0
Bayli.									
20 Mars 1780.....	58	30	40	26	36	0	52	5	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	59	12	0	34	39	0	86	3	0
Mai 1774.....	59	22	0	36	44	0	39	11	0
Janvier 1775.....	59	45	0	27	24	0	56	47	0
Juin 1774.....	60	33	0	35	25	0	81	35	0
Bayli.									
13 Décembre 1776.....	61	14	15	47	40	0	41	15	0
Eckberg.									
Mai 1774.....	61	26	0	36	22	0	45	11	0
Juin 1774.....	61	37	0	34	39	0	76	1	0
.....	61	48	0	35	13	0	71	46	0
Mai 1774.....	62	30	0	36	52	0	63	52	0
Juin 1774.....	62	30	0	35	30	0	69	32	0
Mai 1774.....	62	49	0	36	45	0	53	20	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
17 Décembre 1776.....	65	36	0	48	24	0	52	55	0
Cook.									
17 Décembre 1776.....	65	44	0	48	24	0	52	55	0
Bayli.									
19 Décembre 1776.....	66	54	0	47	40	0	52	55	0
Cook.									
27 Décembre.....	67	47	0	48	41	0	66	45	0
Bayli.									
27 Décembre	68	14	0	48	41	0	66	35	0
.....	68	26	0	48	41	0	66	35	0
21 Décembre.....	68	38	15	48	17	0	61	15	0
Cook.									
3 Janvier 1777	68	59	0	48	17	0	81	35	0
Bayli.									
3 Janvier	69	20	0	48	17	0	81	55	0
Cook.									
7 Janvier 1777	69	54	0	48	10	0	92	44	0
Bayli.									
8 Janvier 1777.....	71	18	30	48	20	0	99	25	0
16 Janvier.....	71	34	15	44	17	0	125	30	0
11 Janvier.....	72	27	0	48	15	0	106	51	0
13 Janvier.....	73	10	15	47	50	0	111	25	0
Cook.									
14 Janvier.....	73	21	0	47	19	0	112	47	0
Bayli.									
13 Janvier.....	73	22	45	47	50	0	111	25	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER PACIFIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
23 Décembre 1777.....	8	42	0	0	44	45	200	10	0
24 Décembre.....	10	53	30	2	2	30	200	1	0
Bayli.									
25 Décembre 1777.....	11	29	45	1	57	0	200	5	0
Cook.									
22 Décembre 1777.....	11	54	15	1	58	0	200	5	0
Bayli.									
4 Janvier 1778.....	15	40	15	4	50	0	200	0	0
Cook.									
4 Janvier 1778.....	16	16	0	4	8	0	200	21	0
8 Janvier.....	23	1	30	7	45	0	202	33	0
9 Janvier.....	23	37	30	8	12	15	202	39	0
Bayli.									
10 Janvier 1778.....	26	49	30	10	31	0	202	5	0
Cook.									
14 Novembre 1779.....	29	31	30	24	36	0	139	35	0
12 Janvier 1778.....	29	54	56	12	17	30	201	41	0
13 Novembre 1779.....	31	27	0	25	56	0	140	51	0
Bayli.									
14 Novembre 1779....	31	58	0	24	50	0	138	25	0
Cook.									
26 Mars 1779.....	37	0	0	19	48	30	180	44	0
17 Septembre 1776.....	37	38	20	17	40	15	198	59	0
2 Avril 1779.....	38	0	0	22	36	15	174	55	0
12 Janvier 1779.....	38	30	0	18	35	45	201	50	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
25 Mars 1779.....	38	47	45	19	59	0	181	40	0
Cook.									
25 Mars 1779.....	38	52	30	19	57	30	181	47	0
3 Avril.....	38	52	30	24	38	15	172	56	0
Bayli.									
15 Janvier 1778.....	39	49	0	19	0	0	198	15	0
Cook.									
9 Novembre 1779.....	40	3	0	41	40	0	144	8	0
25 Janvier, dans la Baye de l'Isle Ocyhea.....	40	32	0	19	28	0	201	5	0
3 Février 1779.....	41	14	15	19	28	0	201	5	0
21 Mars 1779.....	41	25	0	20	37	45	189	48	0
18 Janvier 1778.....	42	1	7	21	17	30	198	23	0
Bayli.									
31 Janvier 1778.....	42	4	30	21	47	0	197	30	0
19 Mars 1779.....	42	10	15	21	12	0	191	45	0
Cook.									
28 Janvier 1778.....	42	23	0	21	21	0	197	35	0
Bayli.									
18 Janvier 1778.....	42	36	30	21	46	0	198	5	0
Cook.									
7 Novembre 1779.....	42	50	0	33	52	20	145	40	0
8 Avril.....	42	55	0	30	49	0	164	39	0
Bayli.									
5 Avril 1779.....	43	10	20	25	57	0	171	22	0
Cook.									
6 Mars 1779.....	43	11	15	21	56	45	213	51	0
Bayli.									
8 Avril 1779.....	43	35	15	30	54	0	164	7	0
Cook.									
9 Avril 1779.....	43	47	0	32	16	0	164	14	0
31 Octobre.....	45	0	0	35	30	30	139	25	0
10 Avril.....	45	37	15	33	30	0	163	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
3 Février 1778.....	45	43	30	24	30	0	196	49	0
Cook.									
4 Février 1778.....	45	52	30	24	31	0	197	5	0
30 Août 1779.....	46	26	0	36	41	30	139	31	0
Bayli.									
1 Novembre 1779....	46	35	20	35	9	0	139	21	0
Cook.									
28 Octobre 1779.....	48	10	0	38	6	0	139	35	0
Bayli.									
5 Février 1778.....	48	51	30	27	43	0	197	35	0
Cook.									
6 Février 1778.....	49	42	0	27	41	30	198	5	0
8 Février 1778.....	51	25	30	30	18	0	198	42	0
Bayli.									
26 Octobre 1779.....	51	34	45	40	4	0	139	49	0
Cook.									
22 Octobre 1779.....	51	53	0	40	59	0	145	52	0
14 Février 1778	52	12	31	31	35	0	203	48	0
Bayli.									
14 Février 1778.....	53	10	0	31	34	0	203	22	0
Cook.									
16 Avril 1779.....	53	34	7	42	12	45	157	16	0
Bayli.									
9 Février 1778	53	47	0	31	16	0	200	23	0
15 Avril 1779.....	53	58	20	41	53	0	157	15	0
Cook.									
17 Avril 1779.....	54	15	0	43	18	30	155	12	0
17 Novembre 1778.....	54	54	0	32	26	0	204	35	0
18 Février 1778.....	55	19	0	36	53	0	203	37	0
Bayli.									
15 Novembre 1778	56	3	0	33	34	0	204	37	0
17 Février 1778.....	56	53	30	35	4	0	203	35	0
Cook.									
15 Octobre 1779.....	57	10	0	46	30	0	153	6	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
16 Octobre 1779.....	57	28	20	45	8	0	151	15	0
Cook.									
21 Février 1778.....	59	15	0	39	6	0	207	20	0
14 Octobre 1779.....	59	20	30	48	17	30	153	20	0
Bayli.									
20 Février 1778.....	59	32	30	38	10	0	205	20	0
20 Avril 1779.....	60	55	20	49	47	0	158	28	0
22 Février 1778.....	62	54	30	41	0	0	212	45	0
Cook.									
15 Septembre 1779....	63	1	0	53	0	30	156	19	0
7 Juin.....	63	8	7	53	0	30	156	19	0
Bayli.									
12 Octobre 1779.....	63	38	40	50	55	0	154	47	0
27 Avril 1779.....	64	57	20	52	22	0	156	28	0
Cook.									
21 Juin 1779.....	65	31	15	55	51	15	161	26	0
Bayli.									
26 Février 1778.....	65	43	0	43	20	0	220	35	0
17 Août 1779.....	66	3	40	53	50	0	165	46	0
21 Juin 1779.....	66	40	10	56	2	0	161	45	0
Cook.									
24 Juin 1778.....	67	15	0	58	20	15	165	6	0
19 Mars 1778.....	67	20	0	44	57	30	231	15	0
1 Mars.....	67	25	0	44	49	0	225	34	0
Bayli.									
12 Août 1779.....	67	47	40	55	24	0	168	35	0
Cook.									
16 Mars 1778.....	68	19	30	44	56	0	232	1	0
30 Juin.....	68	20	30	53	54	0	191	5	0
25 Juin 1779.....	68	25	0	59	7	45	166	22	0
Bayli.									
6 Mars 1778.....	68	29	0	44	30	0	232	55	0
1 Mars.....	68	31	15	44	51	0	226	25	0
3 Octobre.....	69	11	20	53	54	0	191	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
12 Octobre 1778.....	69	23	30	53	55	0	193	5	0
Bayli.									
24 Mars 1778.....	70	23	45	47	44	0	232	5	0
27 Juin 1779.....	70	26	0	59	56	0	173	5	0
Cook.									
18 Juin 1778.....	70	57	0	55	24	30	198	25	0
Bayli.									
5 Juillet 1778.....	71	1	30	56	33	0	196	35	0
Cook.									
7 Août 1779.....	71	25	0	59	33	45	180	25	0
Bayli.									
28 Mars 1778.....	71	53	45	49	27	0	230	55	0
Cook.									
30 Juin 1779.....	71	54	37	61	48	30	178	5	0
Bayli.									
1 Juillet 1779.....	72	18	40	61	52	0	179	15	0
Cook.									
14 Juillet 1780.....	72	22	30	58	12	0	196	20	0
5 Avril 1778.....	72	35	30	49	36	0	230	52	0
Bayli.									
19 Juillet 1778.....	73	3	30	59	37	0	194	50	0
13 Juillet.....	73	6	0	58	12	0	195	53	0
1 Mai	73	34	15	54	40	0	222	5	0
27 Septembre.....	73	34	15	58	38	0	186	13	0
10 Juin,.....	73	49	20	57	10	0	205	0	0
Cook.									
3 Juillet 1779.....	74	12	45	63	36	0	184	6	0
Bayli.									
3 Juillet 1779.....	74	59	10	63	42	0	185	5	0
Cook.									
14 Mai 1780.....	75	26	0	58	22	0	218	27	0
1 Août 1779.....	76	3	0	64	23	20	186	37	0
2 Août.....	76	7	30	64	3	0	186	25	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
31 Mai 1778.....	76	9	0	61	12	0	206	15	30
31 Juillet 1779.....	76	17	0	65	9	0	187	2	0
Cook.									
13 Septembre 1778.....	76	25	0	64	33	0	194	55	0
Bayli.									
5 Mai 1778.....	76	26	45	58	47	0	218	38	0
7 Septembre 1778.....	76	36	15	64	20	0	192	45	0
5 Août.....	76	40	30	64	35	0	189	59	0
13 Septembre.....	76	58	20	64	21	0	195	35	0
Cook.									
13 Août 1778.....	77	7	0	66	32	30	189	32	0
Bayli.									
17 Mai 1778.....	77	7	30	60	51	0	210	13	0
11 Août.....	77	10	30	66	30	0	188	18	0
2 Septembre.....	77	15	30	66	30	0	186	35	0
27 Juillet 1779.....	78	15	20	67	30	0	186	12	0
Cook.									
16 Juillet 1779.....	78	30	0	68	1	0	185	50	0
17 Mai 1778.....	78	32	0	60	50	30	210	31	0
28 Juillet 1779.....	78	48	0	67	8	20	186	54	0
9 Juillet.....	79	0	0	69	12	15	185	40	0
14 Juillet.....	79	0	0	69	36	20	185	50	0
Bayli.									
26 Août 1778.....	79	4	15	69	37	0	179	45	0
Cook.									
26 Août 1778.....	79	35	0	69	36	0	182	49	0
19 Août.....	79	40	0	70	6	45	194	11	0
Bayli.									
17 Juillet 1779.....	79	52	30	69	56	0	192	50	0
Cook.									
18 Juillet.....	79	58	7	70	26	30	193	27	0
Bayli.									
8 Juillet.....	80	3	45	69	23	0	191	35	0
13 Juillet.....	80	5	20	69	26	0	185	50	0
18 Août 1779.....	81	46	45	70	30	0	195	20	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER PACIFIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.	Latitudes.	Longitudes.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Bayli.			
20 Décembre 1777....	0 9 30	3 16 0	201 11 0
Cook.			
20 Décembre 1777.....	0 12 15	3 13 0	201 0 0
Bayli.			
19 Décembre.....	0 48 45	3 40 0	201 15 0
Cook.			
20 Décembre	0 55 0	3 32 0	201 5 0
Bayli.			
19 Décembre	0 56 45	3 41 0	201 15 0
Cook.			
20 Décembre	1 2 0	3 50 0	201 5 0
Bayli.			
20 Décembre	2 54 0	2 2 30	200 45 0
21 Décembre	3 4 45	1 50 0	200 25 0
Cook.			
19 Décembre	3 11 0	4 56 30	201 47 0
Bayli.			
19 Décembre	3 16 45	4 36 0	201 35 0
Cook.			
22 Décembre	5 57 0	0 34 20	200 33 0
Bayli.			
22 Décembre	6 1 0	0 20 0	201 5 0
18 Décembre.....	6 56 45	6 10 0	201 59 0
Cook.			
18 Décembre 1777.....	7 15 0	6 23 45	201 45 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
17 Décembre	9	9	15	7	24	0	201	51	0
Cook.									
17 Décembre	10	12	0	7	38	30	201	54	0
16 Décembre	13	12	30	8	56	45	201	59	0
15 Décembre	14	58	0	9	48	45	202	55	0
14 Décembre	16	23	0	11	3	0	203	0	0
Bayli.									
3 Février 1780.....	18	37	0	1	24	0	103	5	0
9 Décembre 1777.....	24	0	0	14	36	0	205	11	0
Cook.									
25 Octobre 1777, sur la côte de l'Isle Huaheine.	28	19	0	16	44	0	202	9	0
8 Septembre, sur la Côte d'Otahiti.	29	3	22	17	29	0	207	45	0
10 Novembre.....	29	15	0	16	45	30	206	0	0
9 Septembre.....	29	21	52	16	44	0	206	27	0
Bayli.									
16 Avril 1777.....	32	16	30	18	6	0	193	55	0
.....	32	16	45	18	8	0	193	38	0
5 Avril.....	32	53	0	19	14	0	197	39	0
Cook.									
1 Avril 1777.....	34	35	0	19	51	15	199	11	0
Bayli.									
30 Mars 1777.....	36	50	15	21	53	0	199	35	0
Cook.									
19 Septembre.....	36	55	0	19	46	0	183	13	0
Bayli.									
7 Juin.....	38	15	0	20	14	0	182	35	0
.....	38	41	45	20	14	0	182	35	0
Cook.									
8 Août 1777.....	38	57	0	23	55	45	208	31	0
22 Juin 1777.....	39	1	30	21	8	20	182	30	0
27 Mars.....	40	10	0	23	16	15	198	58	0
5 Août	43	50	0	26	50	30	203	50	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Inclinaison.			Latitudes.			Longitudes.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
22 Mars 1776..... Bayli.	44	41	30	26	52	0	199	15	0
21 Mars 1777..... Cook.	44	48	0	26	50	0	199	5	0
3 Août 1777.....	45	37	30	27	43	15	201	29	0
20 Mars..... Bayli.	47	21	30	29	4	0	198	54	0
15 Mars 1777..... Cook.	53	41	30	33	40	0	196	15	0
12 Mars 1776..... Bayli.	59	3	30	38	41	45	193	56	0
10 Mars 1777..... Cook.	59	38	15	39	23	0	192	50	0
10 Mars 1777.....	60	9	0	39	26	0	193	14	0
19 Février 1776, à la nouvelle Zélande..... Bayli.	62	49	22	41	5	0	171	45	0
3 Mars 1777..... Cook.	64	22	15	42	0	0	180	35	0
A la nouvelle Zélande, en trois différens tems.... Bayli.	64	36	0	41	5	56	172	0	7
19 Février 1777.....	64	39	20	41	5	0	171	40	0
9 Février..... Cook.	64	56	45	40	33	0	168	55	0
5 Février 1777..... Bayli.	68	52	30	43	31	45	159	25	0
4 Février..... Cook.	69	46	0	43	40	0	157	5	0
En Mai 1773, à la Baie d'Usky, nouvelle Zélande. Bayli.	70	5	45	45	47	26	163	53	0
27 Janvier 1777.....	70	55	20	43	21	0	145	8	0
22 Janvier.....	71	0	0	43	17	0	144	55	0
29 Janvier.....	71	0	40	43	21	0	145	8	0

TABLES

Contenant les Observations qui ont été faites, dans ces derniers tems, sur la Déclinaison de l'Aiguille aimantée.

Nota. Dans les Tables suivantes, les Observations, tant sur la Déclinaison que sur l'Inclinaison de l'Aiguille aimantée, sont présentées suivant l'ordre des Latitudes où elles ont été faites, depuis 0 jusqu'à 90 degrés.

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER ATLANTIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
19 Avril 1769.....	14	22	0	306	0	0	2	24	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	14	22	0	299	18	0	3	0	0
.....	14	27	0	303	44	0	2	30	0
.....	14	31	0	307	9	0	0	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
3 Mai 1769.....	14	39	0	297	28	0	3	29	0
28 Avril 1769.....	14	45	0	309	55	0	0	0	0
2 Mai.....	14	51	0	299	38	0	2	23	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	18	54	0	295	11	0	4	45	0
Chappe.									
(A Véra-Crux.).....	19	10	0	276	22	0	6	28	0
De Fleurieu.									
22 Mai.....	20	0	0	285	42	0	5	10	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	20	16	0	295	19	0	3	30	0
.....	21	54	0	295	16	0	3	15	0
De Fleurieu.									
20 Juin.....	23	53	0	287	13	0	3	54	0
Gérard de Brahm.									
Au Cap Florida.....	24	25	0	274	41	0	6	25	0
.....	25	42	42	276	34	0	6	0	0
.....	26	50	0	276	35	0	5	24	52
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	27	16	0	295	36	0	1	30	0
Gérard de Brahm.									
.....	27	20	0	276	35	0	4	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	27	37	0	295	47	0	0	15	0
Gérard de Brahm.									
26 Juillet 1771.....	27	40	0	276	35	0	2	0	0
De Fleurieu.									
22 Juin 1769.....	27	47	0	286	29	0	3	27	0
Gérard de Brahm.									
26 Juillet 1771.....	28	40	0	275	55	0	2	0	0
.....	29	40	0	275	15	0	5	59	0
.....	30	10	0	275	5	0	6	47	0
.....	30	30	0	274	55	40	1	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
23 Juin 1769.....	30	48	0	286	5	0	2	52	0
24 Juin.....	32	15	0	286	43	0	2	0	0
Gérard de Brahm.									
25 Juillet 1771.....	32	30	0	281	3	9	2	50	0
.....	32	40	0	276	52	17	2	42	0
26 Juillet.....	33	25	0	282	11	13	1	30	0
En 1771.....	33	30	0	280	5	0	1	30	0
27 Juillet.....	34	38	0	283	38	0	0	45	0
.....	35	30	0	282	35	0	0	0	0
							Déclinaison Ouest.		
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	0	7	0	330	35	0	4	25	0
.....	0	7	0	330	35	0	4	45	0
Cook.									
31 Août 1776.....	0	7	0	330	35	0	4	49	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	0	7	0	330	35	0	4	53	0
Cook.									
31 Août 1776.....	0	7	0	330	35	0	5	35	0
Rosnevet.									
En 1773.....	0	13	0	338	59	0	9	0	0
Bayli.									
16 Septembre 1776.....	0	22	0	343	15	0	13	19	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	0	51	0	330	25	0	6	41	0
Cook.									
30 Août 1776.....	0	51	0	330	25	0	3	53	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	0	51	0	330	35	0	4	42	0
.....	0	51	0	330	25	0	4	52	0
.....	0	51	0	330	25	0	4	59	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
31 Août.....	0	51	0	330	25	0	5	15	30
3 Août 1776.....	0	51	0	330	25	0	5	5	0
Cook et Bayli.									
31 Août 1776.....	0	51	0	330	25	0	5	54	0
.....	0	51	0	330	25	0	5	56	0
30 Août.....	1	14	0	331	33	0	4	56	40
.....	1	14	0	331	33	0	5	21	20
.....	1	14	0	331	33	0	3	17	10
.....	1	14	0	331	33	0	3	19	40
Cook.									
30 Août 1776.....	1	14	0	331	33	0	5	0	31
31 Août.....	1	14	0	331	33	0	5	34	40
30 Août.....	1	14	0	331	33	0	5	35	10
Cook et Bayli.									
30 Août 1776.....	1	14	0	331	33	0	5	46	50
Cook.									
30 Août 1776.....	1	14	0	331	33	0	6	12	40
Bougainville.									
En 1776.....	1	45	0	339	0	0	8	15	0
Carteret.									
8 Novembre 1769....	1	56	0	337	19	0	8	25	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	1	58	0	331	59	0	3	30	0
Bayli.									
30 Août 1776.....	2	5	0	332	5	0	6	24	0
Cook et Bayli.									
30 Août 1776.....	2	5	0	332	5	0	6	45	0
.....	2	5	0	332	5	0	6	56	0
Cook.									
30 Août 1776.....	2	5	0	332	5	0	6	10	0
.....	2	5	0	332	5	0	6	33	45
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	2	10	0	331	30	0	5	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
29 Août 1776.....	2	17	0	332	45	0	6	49	0
Cook.									
29 Août 1776.....	2	28	30	332	59	0	7	38	0
Carteret.									
10 Février 1769.....	2	39	0	328	37	0	7	2	0
Cook.									
29 Août 1776.....	2	40	0	333	25	0	7	42	0
Bayli.									
19 Août 1776.....	2	40	0	333	25	0	7	56	30
Cook et Bayli.									
29 Août 1776.....	2	40	0	334	25	0	8	7	0
Bougainville.									
En 1766.....	3	0	0	338	58	0	8	0	0
Cook.									
27 Août 1780.....	3	30	0	334	15	0	7	58	30
Bayli.									
12 Juin 1780.....	3	31	0	331	19	0	6	21	0
Cook.									
26 Août 1776.....	3	37	0	334	15	0	8	13	0
Cook et Bayli.									
27 Août 1776.....	3	37	0	334	15	0	8	28	20
Cook.									
27 Août 1776.....	3	37	0	334	15	0	8	30	15
.....	3	37	0	334	15	0	8	34	0
Cook et Bayli.									
27 Août 1776.....	3	37	0	334	15	0	8	40	40
Bayli.									
27 Août 1776.....	3	37	0	334	15	0	9	13	15
26 Août 1776.....	3	45	0	335	1	0	8	5	0
Cook.									
26 Août 1776.....	3	45	0	335	1	0	8	15	0
.....	3	45	0	335	1	0	8	27	0
.....	3	45	0	335	1	0	8	36	0
Carteret.									
8 Novembre 1769.....	3	45	0	338	11	0	8	37	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
26 Août 1776.....	3	45	0	335	1	0	8	52	0
.....	3	45	0	335	1	0	8	58	0
.....	3	45	0	335	1	0	9	2	0
Rosnevet.									
En 1773.....	3	45	0	340	35	0	11	15	0
Cook.									
27 Août 1776.....	3	59	0	335	9	0	8	30	0
.....	3	59	0	335	9	0	8	31	0
26 Août 1776.....	3	59	0	335	9	0	8	35	0
.....	3	59	0	335	9	0	9	10	0
Cook et Bayli.									
26 Août 1776.....	3	59	0	335	9	0	8	2	0
.....	3	59	0	332	9	0	8	30	0
Bayli.									
13 Juin 1780.....	4	12	0	331	35	0	7	18	0
8 Septembre 1776	4	17	0	343	45	0	13	21	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	4	23	0	333	6	0	5	0	0
Bayli.									
25 Août 1776.....	4	23	0	336	33	0	8	15	0
....	4	23	0	336	33	0	9	15	30
Cook.									
25 Août 1776.....	4	23	0	336	33	0	8	20	28
26 Août	4	23	0	336	33	0	9	5	8
Bayli et Cook.									
25 Août 1776.....	4	23	0	336	33	0	9	1	45
.....	4	23	0	336	33	0	9	2	17
Rosnevet.									
En 1773.....	4	30	0	340	36	0	11	0	0
Cook.									
5 Juin 1780.....	5	10	0	331	55	0	7	58	30
Bayli.									
15 Juin 1780.....	5	11	0	331	9	0	8	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	5	27	0	339	59	0	10	25	0
Cook et Bayli.									
11 Août 1776.....	6	9	0	388	25	0	9	51	40
Cook.									
22 Août 1776.....	6	9	0	338	25	0	10	19	6
Carteret.									
15 Février 1779.....	6	28	0	324	55	0	4	35	0
Cook et Bayli.									
14 Août 1776.....	6	29	0	337	30	0	9	44	0
Cook.									
22 Août 1776.....	6	29	0	337	30	0	11	13	7
Bayli.									
22 Août 1776.....	6	29	0	337	30	0	11	42	0
Cook.									
22 Août 1776.....	6	29	0	337	30	0	11	57	0
.....	6	29	0	337	30	0	12	12	0
Cook et Bayli.									
22 Août 1776.....	6	29	0	337	30	0	12	33	0
Cook.									
21 Août 1776.....	6	33	0	338	33	0	9	31	15
.....	6	33	0	338	33	0	10	19	19
Carteret.									
10 Octobre 1766.....	6	34	0	335	54	0	5	36	0
11 Octobre.....	6	41	0	336	0	0	6	40	0
Cook et Bayli.									
18 Juin 1780.....	7	19	0	329	45	0	8	51	0
8 Octobre 1768.....	7	58	0	335	22	0	8	39	0
Carteret.									
16 Février 1769.....	8	3	0	333	17	0	6	9	0
Cook.									
18 Août 1776.....	8	55	0	334	45	0	9	17	33
.....	8	55	0	334	45	0	9	25	40
Cook et Bayli.									
14 Août 1776.....	8	55	0	334	45	0	9	39	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
21 Août	8	55	0	334	45	0	9	52	5
.....	8	55	0	334	45	0	9	53	20
.....	8	55	0	334	45	0	9	55	10
18 Août	8	55	0	334	45	0	9	56	0
21 Août 1776.....	8	55	0	334	45	0	11	24	40
18 Août 1776.....	8	55	0	334	45	0	12	24	20
Bayli.									
20 Juin 1780.....	9	4	0	330	5	0	17	10	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	9	22	0	334	51	0	8	0	0
Bayli.									
22 Juin 1780.....	9	37	0	328	49	0	8	5	0
Rosnevet.									
En 1773.....	10	13	0	336	47	0	11	0	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	11	6	0	334	57	0	8	0	0
Cook.									
15 Août 1776.....	11	51	0	333	30	0	8	9	27
Carteret.									
19 Février 1769.....	12	6	0	333	1	0	6	48	0
Bayli.									
29 Août 1776.....	12	8	0	333	45	0	9	26	0
13 Août.....	12	21	0	333	41	0	9	16	0
Cook et Bayli.									
22 Août 1776.....	12	21	0	333	41	0	9	48	0
Cook.									
4 Août 1776.....	12	21	30	333	45	30	9	35	23
Bayli.									
13 Août 1776.....	12	22	0	333	50	0	9	16	20
Cook et Bayli.									
18 Août 1776.....	12	22	0	333	50	0	9	43	0
14 Août.....	12	22	0	333	50	0	9	52	40
Bayli.									
25 Juin 1780.....	12	41	0	325	49	0	7	59	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	13	10	0	332	2	0	5	55	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	13	25	0	323	56	0	3	30	0
.....	13	31	0	334	55	0	8	30	0
.....	13	31	0	334	55	0	9	30	0
Cook.									
13 Août 1776.....	13	32	0	333	50	0	9	28	0
.....	13	32	0	333	50	0	9	31	0
Cook.									
1 Octobre 1768.....	14	6	0	335	25	0	10	37	0
De Fleurieu.									
10 Avril 1769.....	14	26	0	337	35	0	12	0	0
Carteret.									
21 Février 1769.....	14	39	0	331	20	0	6	12	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	14	40	0	309	15	0	0	50	0
De Fleurieu.									
4 Avril 1769, à l'Isle de Gorée.....	14	40	0	340	11	0	12	15	0
27 Avril.....	14	42	0	310	40	0	0	42	0
28 Avril.....	14	44	0	309	25	0	0	21	0
.....	14	45	0	309	55	0	0	0	0
26 Avril.....	14	45	0	313	49	0	1	15	0
25 Avril.....	14	47	0	316	3	0	1	58	0
18 Avril.....	14	48	0	317	20	0	2	15	0
Chappe.									
8 Février 1769.....	14	53	0	295	10	0	4	7	0
Wallis.									
24 Septembre 1776.....	14	53	0	333	45	0	8	20	0
Bougainville.									
En 1766.....	14	54	0	331	20	0	4	50	0
Carteret.									
En Septembre 1766.....	15	0	0	334	35	0	8	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Wallis.									
8 Avril 1768.....	15	4	0	323	5	0	4	48	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	15	11	0	311	38	0	1	30	0
Bayli.									
27 Juin 1780.....	15	11	0	323	35	0	7	8	0
Chappe.									
1 Février 1769.....	15	12	0	302	22	0	2	31	0
2 Février.....	15	12	0	300	35	0	4	20	0
Bayli.									
11 Août 1776.....	15	25	0	333	59	0	9	15	0
Cook et Bayli.									
14 Août 1776	15	25	0	333	59	0	9	50	0
22 Août	15	25	0	333	59	0	9	52	0
11 Août.....	15	25	0	333	59	0	9	54	0
....	15	25	0	333	59	0	10	11	0
Cook.									
11 Août 1776.....	15	25	0	333	59	0	10	38	22
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	15	33	0	334	39	0	9	0	0
Cook et Bayli.									
11 Août 1776.....	15	42	0	334	13	0	11	1	0
11 Août	15	42	0	334	13	0	12	25	0
Cook.									
11 Août 1776.....	15	42	0	334	13	0	12	39	0
Carteret.									
22 Septembre 1766	16	34	0	335	6	0	8	20	0
Cook.									
10 Août 1776.....	16	37	0	334	45	0	10	47	20
.....	16	37	0	334	45	0	10	33	0
Cook et Bayli.									
10 Août 1776.....	16	37	0	334	45	0	11	37	0
Chappe.									
En Février 1769.....	16	45	0	288	51	0	17	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	17	8	0	330	18	0	5	50	0
Carteret.									
21 Septembre 1766.....	17	19	0	335	16	0	11	14	0
Chappe.									
En Février 1769.....	17	22	0	285	24	10	18	0	0
De Fleurieu.									
3 Avril 1769.....	17	33	0	339	45	0	10	55	0
Bayli.									
25 Août 1776.....	17	48	0	333	29	0	11	40	0
Chappe.									
23 Janvier 1769.....	18	4	0	315	17	0	1	15	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	18	7	0	322	50	0	3	0	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	18	52	3	317	2	0	5	45	0
Bougainville.									
En 1766.....	19	16	0	329	37	0	5	45	0
Cook et Bayli.									
10 Août 1776.....	19	35	0	336	56	0	10	12	0
Cook.									
8 Août 1776.....	19	35	0	336	56	0	13	36	0
.....	19	42	0	336	56	0	13	20	20
Bayli.									
30 Juin 1780.....	19	44	0	329	55	0	6	8	0
Cook.									
18 Août 1776.....	19	45	0	326	56	0	13	11	0
.....	19	46	0	337	32	0	13	14	0
.....	20	30	0	337	32	0	14	19	0
.....	20	30	0	337	32	0	14	35	0
.....	20	30	0	337	32	0	14	30	0
Cook et Bayli.									
8 Août 1776.....	20	30	0	337	32	0	13	52	0
Bayli.									
1 Juillet 1780.....	21	4	0	319	20	0	6	19	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Wallis.									
11 Août 1768.....	21	28	0	320	58	0	4	30	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	21	46	0	317	48	0	7	30	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	22	41	0	321	38	0	5	0	0
En 1763.....	22	41	0	321	38	0	5	0	0
Chappe.									
13 Janvier 1769.....	23	12	0	330	0	0	8	27	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	23	24	0	324	11	0	8	30	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	23	45	0	336	45	0	10	30	0
Carteret.									
26 Février 1769.....	23	54	0	329	20	0	6	0	0
Cook et Bayli.									
6 Août 1776.....	23	54	0	339	15	0	15	4	0
Cook.									
6 Août 1776.....	23	54	0	339	15	0	15	12	0
.....	23	54	0	339	15	0	15	20	0
Bougainville.									
En 1766.....	24	13	0	329	19	0	6	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	24	25	0	325	33	0	10	0	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	24	25	0	337	34	0	13	0	0
Carteret.									
17 Septembre 1766....	24	33	0	338	13	0	13	0	0
Rosnevet.									
En 1773.....	25	0	0	338	37	0	17	18	0
Bayli.									
4 Juillet 1780.....	25	18	0	317	21	0	7	55	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	25	48	0	327	33	0	11	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Duclos Guyot.									
En 1763.....	26	5	0	320	56	0	5	30	0
.....	26	5	0	320	56	0	7	30	0
.....	26	12	0	337	25	0	13	0	0
Chappe.									
8 Janvier 1769.....	26	26	0	339	0	0	15	57	0
Bayli.									
19 Août 1766.....	26	26	0	336	33	0	17	11	0
Bougainville.									
En 1766.....	27	18	0	327	12	0	8	45	0
Chappe.									
7 Janvier 1766.....	27	27	0	342	13	0	14	13	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	27	30	0	329	38	0	12	30	0
Bayli.									
19 Août 1776.....	27	43	0	336	35	0	16	52	0
Chappe.									
5 Janvier 1769.....	27	46	0	342	54	0	14	7	0
Bayli.									
6 Juillet 1780.....	27	48	0	316	33	0	8	5	0
Cook.									
6 Juillet 1780.....	27	48	0	316	35	0	10	5	6
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	28	10	0	330	30	0	7	0	0
Cook et Bayli.									
3 Août 1776.....	28	30	0	340	35	0	14	0	0
Wallis.									
3 Août.....	28	30	0	340	35	0	14	23	0
Cook.									
3 Août.....	2	30	0	340	35	0	14	41	20
De Fleurieu.									
12 Juillet 1769.....	28	33	0	341	29	0	15	43	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	28	50	0	331	55	0	13	30	0
.....	28	50	0	331	55	0	15	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	29	0	0	341	20	0	17	15	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	29	9	0	297	24	0	0	30	0
Bayli.									
8 Juillet 1780.....	29	24	0	315	55	0	7	18	0
Chappe.									
1 Janvier 1769.....	29	29	0	343	22	0	14	25	0
31 Décembre 1768....	30	12	0	344	14	0	13	0	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	30	14	0	337	3	0	11	0	0
Bayli.									
10 Juillet 1780.....	30	28	0	315	39	0	9	11	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	30	32	0	298	57	0	1	15	0
.....	30	37	0	334	11	0	14	0	0
De Fleurieu.									
1 Septembre 1768.....	31	7	0	344	53	0	15	28	0
Cook et Bayli.									
30 Juillet 1776.....	31	8	0	342	5	0	17	43	0
.....	31	8	0	342	5	0	17	47	0
Cook.									
30 Juillet 1776.....	31	8	0	342	5	0	18	17	0
.....	31	8	0	342	5	0	19	21	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	31	10	0	335	9	0	12	30	0
Cook et Bayli.									
20 Septembre 1768, près les Salvages.....	31	11	0				17	50	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	31	12	0	335	48	0	12	15	0
.....	31	13	0	336	30	0	11	45	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	31	38	0	302	3	0	4	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
28 Août 1769.....	31	41	0	340	21	0	14	23	0
Chappe.									
29 Décembre 1768.....	31	56	0	344	0	0	11	20	0
Cook.									
29 Juillet 1776.....	32	4	0	342	45	0	18	38	0
.....	32	4	0	342	45	0	18	39	48
Cook et Bayli.									
29 Juillet.....	32	4	0	342	45	0	18	11	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	32	24	0	335	31	0	12	0	0
Carteret.									
3 Mars 1769.....	32	33	0	334	0	0	13	26	0
De Fleurieu.									
12 Août 1769.....	32	33	0	340	24	0	15	0	0
Cook.									
En Septembre 1768.....	32	33	0	340	46	0	15	30	0
.....	32	33	0	340	46	0	16	30	0
Carteret.									
4 Septembre 1766.....	32	34	0	340	0	0	16	0	0
Wallis.									
8 Septembre 1776.....	32	35	0	340	55	0	14	10	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	32	38	0	336	15	0	15	0	0
De Fleurieu.									
4 Septembre 1769.....	32	43	0	342	52	0	15	56	0
Cook.									
29 Juillet 1769.....	33	4	0	342	45	0	19	29	0
29 Juillet 1769.....	33	4	0	342	45	0	19	29	0
Bayli.									
13 Août 1776.....	33	19	0	341	33	0	20	38	0
De Fleurieu.									
7 Septembre 1769....	33	40	0	345	50	0	15	36	0
Cook et Bayli.									
28 Juillet 1776.....	33	45	0	342	45	0	18	7	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
28 Juillet 1776.....	33	45	0	342	45	0	18	55	0
Cook.									
28 Juillet 1776.....	33	45	0	342	45	0	18	33	0
.....	33	45	0	342	45	0	18	35	0
Bougainville.									
En 1766.....	33	46	0	333	10	0	11	30	0
Wallis.									
21 Avril 1768.....	33	55	0	325	35	0	11	34	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	33	56	0	336	34	0	14	0	0
Carteret.									
Entre les Isles Ténériffe & S. Michel, 4 Mars 1769.	34	2	0	335	3	0	13	43	0
De Fleurieu.									
27 Juin 1769.....	34	6	0	289	54	0	2	0	0
8 Septembre 1769	34	21	0	345	48	0	16	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	34	33	0	305	9	0	5	15	0
De Fleurieu.									
8 Août 1769.....	34	55	0	337	43	0	14	38	0
Bayli.									
14 Juillet 1780.....	35	25	0	315	59	0	10	1	0
De Fleurieu.									
5 Août.....	35	26	0	335	15	0	16	20	0
Carteret.									
5 Mars 1769.....	35	30	0	335	39	0	14	53	0
De Fleurieu.									
11 Septembre 1769....	35	30	0	349	33	0	16	22	0
Gérard de Brahm.									
28 Juillet 1771.....	35	38	0	284	51	24	0	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	35	42	0	341	2	0	15	0	0
Bougainville.									
En 1766.....	35	46	0	335	22	0	12	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
12 Septembre 1769.....	35	49	0	351	5	0	18	26	0
Bayli.									
11 Août 1776.....	35	51	0	343	35	0	21	42	0
16 Juillet 1780.....	36	5	0	316	35	0	11	10	0
Bougainville.									
En 1766.....	36	7	0	338	14	0	13	15	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	36	15	0	307	18	0	6	0	0
Bayli.									
12 Juillet 1780.....	36	15	0	315	35	0	10	16	0
Wallis.									
8 Septembre 1776.....	36	15	0	329	4	0	14	30	0
De Fleurieu.									
En Mars 1769, (à Cadix.)	36	31	0	351	17	0	17	15	0
Chappe.									
28 Octobre 1766, (à Cadix.).....	36	31	0	351	17	0	19	12	0
De Fleurieu.									
12 Octobre 1769.....	36	34	0	350	50	0	18	40	0
29 Juin.....	36	34	0	293	55	0	3	37	0
Carteret.									
6 Mars 1769.....	36	46	0	336	12	0	14	58	0
.....	36	46	0	336	22	0	15	15	0
.....	36	46	0	336	12	0	15	6	30
Gérard de Brahm.									
29 Juillet 1771.....	37	6	0	286	39	11	3	0	0
.....	37	7	0	284	35	0	3	0	0
De Fleurieu.									
3 Août.....	37	14	0	331	52	0	17	2	0
30 Juin 1769.....	37	27	0	293	46	0	4	53	0
Carteret.									
4 Septembre 1766....	37	27	0	343	23	0	20	17	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	37	35	0	339	2	0	18	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
2 Août.....	37	40	0	331	27	0	16	5	0
29 Mars 1769.....	37	42	0	341	35	0	16	49	0
Gérard de Brahm.									
30 Juillet.....	37	44	0	287	27	28	3	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	37	58	0	317	8	0	10	0	0
De Fleurieu.									
20 Juillet 1769.....	38	10	0	329	6	0	13	0	0
Cook.									
21 Juillet 1776.....	38	10	0	330	33	0	18	44	32
Bayli.									
21 Juillet 1780.....	38	10	0	320	15	0	15	9	0
De Fleurieu.									
21 Juillet 1769.....	38	20	0	329	22	0	13	19	0
Bayli.									
22 Juillet 1780.....	38	25	0	320	16	0	15	11	0
Gérard de Brahm.									
En 1771.....	38	30	0	286	5	0	5	0	0
1 Août.....	38	34	0	289	36	0	5	0	0
2 Août.....	38	34	0	291	15	44	5	0	0
31 Juillet.....	38	36	0	288	3	9	5	0	0
Carteret.									
3 Septembre 1766.....	38	36	0	343	55	0	19	4	0
Bayli.									
23 Juillet 1780.....	38	41	0	320	19	0	15	7	0
Gérard de Brahm.									
4 Août 1771.....	38	48	0	294	46	31	5	0	0
.....	39	0	0	290	53	0	8	30	0
3 Août.....	39	8	0	293	9	34	8	30	0
Carteret.									
28 Mars 1769.....	39	9	0	318	33	0	16	46	6
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	39	18	0	318	29	0	13	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Felurieu.									
18 Juillet 1769.....	39	25	0	326	11	0	15	36	0
Gérard de Brahm.									
5 Août 1771.....	39	36	0	296	13	51	8	30	0
6 Août.....	39	37	0	297	22	35	8	30	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	39	47	0	344	21	0	16	0	0
Gérard de Brahm.									
7 Août 1771.....	40	14	0	298	59	32	8	30	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	40	37	0	314	26	0	15	0	0
Cook.									
25 Juillet 1776.....	40	41	0	346	25	0	22	27	0
.....	40	41	0	346	25	0	22	56	0
17 Juillet.....	40	41	0	346	25	0	23	25	0
Gérard de Brahm.									
8 Août 1771.....	40	43	0	300	46	52	8	52	0
Cook.									
8 Août 1776.....	40	45	0	346	15	0	22	56	0
Gérard de Brahm.									
En Août 1771.....	41	0	0	300	35	0	9	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	41	7	0	344	44	0	17	0	0
Gérard de Brahm.									
9 Août 1771.....	41	13	0	302	29	35	9	0	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	41	25	0	341	48	0	18	0	0
Gérard de Brahm.									
10 Août 1771.....	41	27	0	304	30	13	9	0	0
11 Août.....	41	27	0	305	20	53	9	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	41	30	0	317	11	0	17	8	0
Gérard de Brahm.									
15 Août 1771.....	41	37	0	311	0	53	10	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
De Fleurieu.									
20 Janvier 1769.....	41	56	0	348	17	0	20	0	0
Gérard de Brahm.									
15 Août 1771.....	42	0	0	304	5	0	10	0	0
De Fleurieu.									
9 Juillet 1769.....	42	17	0	314	35	0	16	30	0
Gérard de Brahm.									
16 Août 1771.....	42	20	0	311	5	0	11	0	0
.....	42	22	0	313	23	54	11	0	0
Carteret.									
30 Août 1766.....	42	22	0	354	18	0	20	25	0
Bayli.									
29 Juillet 1780	42	33	0	328	35	0	17	55	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	42	50	0	339	59	0	19	0	0
Cook.									
5 Septembre 1768.....	42	50	0	348	49	0	21	4	0
6 Août 1774.....	43	17	0	347	14	0	20	14	0
Bayli.									
30 Juillet 1780.....	43	20	0	330	15	0	18	28	0
6 Août 1776.....	43	36	30	347	19	30	20	59	30
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	43	39	0	323	38	0	17	30	0
Gérard de Brahm.									
17 Août 1771.....	43	40	0	314	25	0	12	0	0
.....	43	45	0	316	2	47	12	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	43	46	0	345	15	0	18	15	0
Cook.									
6 Août 1780.....	43	56	0	347	25	0	21	45	0
De Fleurieu.									
18 Février 1769.....	44	15	0	349	15	0	20	22	0
Bayli.									
27 Juillet 1780.....	44	24	0	323	45	0	16	43	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Gérard de Brahm.									
18 Août 1771.....	44	30	0	319	30	38	13	0	0
.....	44	30	0	317	5	0	13	0	0
Bayli.									
2 Août 1780.....	44	45	0	344	20	0	20	23	0
Cook.									
2 Août 1780.....	44	50	0	334	5	0	21	43	26
Gérard de Brahm.									
19 Août.....	44	52	0	321	47	46	13	0	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	44	53	0	325	38	0	18	0	0
.....	45	23	0	347	7	0	19	13	0
Gérard de Brahm.									
22 Août 1771.....	45	30	0	327	35	0	14	0	0
.....	45	34	0	326	51	0	14	0	0
Bayli.									
5 Août 1780.....	45	59	0	338	15	0	21	17	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	46	21	0	332	50	0	20	30	0
Bayli.									
5 Août 1780.....	46	25	0	338	35	0	21	18	0
Gérard de Brahm.									
23 Août 1771.....	46	28	0	328	10	51	15	0	0
.....	46	28	0	324	45	0	15	0	0
En Septembre 1771....	46	36	0	348	17	6	18	30	0
De Fleurieu.									
17 Octobre 1769.....	46	43	0	350	33	0	17	38	0
A bord de l'Ecureuil,									
en 1774.....	47	7	0	350	6	0	20	0	0
De Fleurieu.									
28 Octobre 1769.....	47	11	0	338	44	0	16	58	0
Gérard de Brahm.									
24 Août 1771	47	29	0	330	16	1	16	0	0
.....	47	29	0	327	55	0	16	0	0

Duclos-Guyot.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	47	43	0	346	3	0	16	0	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	47	47	0	338	9	0	21	0	0
Gérard de Brahm.									
26 Août 1771.....	48	0	0	328	55	0	17	6	0
Carteret.									
En Août 1766.....	48	18	0	339	5	0	22	30	0
Bayli.									
6 Août 1780.....	48	18	0	339	5	0	22	9	0
A bord de l'Ecureuil, en 1774.....	48	27	0	346	43	0	21	0	0
.....	48	29	0	349	43	0	19	30	0
.....	48	31	0	350	5	0	20	49	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	48	33	0	349	28	0	20	36	0
Bayli.									
17 Juillet 1776.....	48	35	0	352	18	0	24	50	0
.....	48	35	0	352	18	0	25	18	0
Cook et Bayli.									
17 Juillet 1776.....	48	44	0	352	35	0	22	38	20
Bayli.									
17 Juillet 1776.....	48	44	0	347	25	0	21	36	20
Kerguelen.									
En 1767.....	48	46	0	349	21	0	20	0	0
Gérard de Brahm.									
26 Août 1771.....	48	49	0	333	52	17	17	10	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	48	54	0	353	37	0	18	0	0
.....	48	54	0	351	20	0	19	0	0
Gérard de Brahm.									
5 Septembre 1771....	49	0	0	349	44	47	18	30	0
.....	49	0	0	351	3	14	18	30	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	49	3	0	352	6	0	19	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Gérard de Brahm.									
En 1771.....	49	5	0	352	34	0	18	30	0
.....	49	14	0	355	1	45	18	30	0
.....	49	15	0	350	36	14	18	30	0
19 Août.....	49	22	0	337	56	0	18	0	0
.....	49	28	0	340	56	33	18	0	0
Courtanvaux.									
(Au Havre de Grace.)									
15 Mai 1767.....	49	29	0	359	0	0	19	15	0
Chappe.									
(Au Havre de Grace,)									
26 Septembre 1768.....	49	29	0	359	0	0	19	42	0
Kerguelen.									
En 1767.....	49	30	0	353	24	0	19	45	0
Wallis.									
10 Mai 1768.....	49	33	0	349	43	0	22	30	0
Gérard de Brahm.									
En Septembre 1771.....	49	36	0	344	50	57	18	30	0
28 Août.....	49	36	0	345	3	36	18	0	0
Septembre 1771.....	49	40	0	345	5	0	18	30	0
.....	49	52	0	356	5	20	18	30	0
Wallis.									
13 Mai 1768.....	49	58	0	350	27	0	20	0	0
22 Août 1766.....	50	0	0	348	49	0	21	0	0
Kerguelen.									
En 1767.....	50	0	0	347	24	0	22	30	0
Cook.									
13 Juillet 1766.....	50	8	0	352	55	0	20	18	25
.....	50	8	0	352	55	0	19	49	0
.....	50	8	0	352	55	0	20	36	30
Courtanvaux.									
5 Juin 1767, à Calais..	50	57	0	359	56	0	19	36	0
9 Juin 1767, à Dunkerque.....	51	2	0	0	2	0	18	33	0
28 Juin 1767, à Rotterdam.	51	55	0	0	8	0	19	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Déclinaison Ouest.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Phipps.			
6 Juin 1773.....	52 20 0	356 35 0	16 22 0
.....	52 20 0	356 35 0	16 38 30
.....	52 20 0	356 35 0	16 55 0
Courtanvaux.			
20 Juillet 1767, Amsterdam.....	52 22 0	0 10 0	17 30 0
Bayli.			
11 Août 1780.....	52 41 0	341 25 0	25 14 0
12 Août.....	52 48 0	341 41 0	25 50 0
13 Août.....	52 51 0	341 56 0	25 26 0
Phipps.			
20 Septembre 1773.....	52 57 0	359 5 0	20 47 0
Kerguelen.			
En 1767.....	54 39 0	352 24 0	19 0 0
Bayli.			
15 Août 1780.....	55 3 0	342 25 0	24 30 0
17 Août.....	56 6 0	344 9 0	24 45 0
18 Août.....	56 8 0	345 45 0	24 12 0
Chevalier de l'Angle.			
En Août 1782.....	57 30 0	285 20 0	4 45 0
24 Septembre.....	58 0 0	305 0 0	33 0 0
Bayli.			
20 Août 1780.....	58 44 0	352 55 0	23 10 0
25 Août.....	58 57 0	354 4 0	24 31 0
Chevalier de l'Angle.			
8 Août 1782.....	59 13 0	A la vue du Cap Churchil.	10 30 0
Kerguelen.			
En 1767.....	59 30 0	355 55 0	19 0 0
Chevalier de l'Angle.			
14 Juillet 1782, matin..	59 41 51	296 44 6	41 53 0
14 Juillet, soir.....	59 41 51	296 44 6	42 40 0
12 Juillet, matin.....	59 42 57	297 16 16	42 40 0
12 Juillet, soir.....	59 42 57	297 16 16	42 45 0
7 Août 1782.....	59 48 0	A la vue du Cap Churchil.	10 0 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Kerguelen.									
En 1767.....	60	3	0	354	54	0	18	30	0
.....	60	10	0	2	24	0	21	0	0
Phipps.									
14 Juin 1773.....	60	20	0	356	28	0	21	53	0
.....	60	20	0	356	56	0	22	58	0
15 Juin.....	60	20	0	357	16	0	24	2	0
.....	60	20	0	356	56	0	26	16	0
17 Juin.....	60	30	0	357	31	0	19	22	0
Kerguelen.									
En 1767.....	60	44	0	354	24	0	18	42	0
.....	60	44	0	354	24	0	19	42	0
.....	60	58	0	339	54	0	23	30	0
Chevalier de l'Angle.									
3 Août 1782.....	61	46	0	273	52	0	35	0	0
La Pérouse.									
3 Août 1782.....	61	46	0	273	52	0	37	0	0
Chevalier de l'Angle.									
21 Juillet.....	62	14	0	A environ 3 lieues de l'Isle de Sadlebach, à peu de degrés près en avançant vers l'Oueſt.			44	0	0
Phipps.									
19 Juin 1773	62	30	0	357	31	0	19	11	0
Chevalier de l'Angle.									
30 Juillet 1782.....	62	41	0	275	57	10	41	0	0
.....	62	43	6				42	15	0
Phipps.									
5 Septembre 1773....	63	45	0	359	51	0	25	46	0
Kerguelen.									
En 1767.....	64	30	0	333	14	0	31	0	0
Phipps.									
4 Septembre 1773.....	65	4	0	359	56	0	22	14	0
Kerguelen.									
En 1767.....	65	11	0	330	54	0	32	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Phipps.									
3 Septembre.....	65	47	0	0	2	0	26	55	0
21 Juin 1773.....	68	12	0	356	58	0	23	18	0
31 Août.....	68	46	0	0	59	0	19	33	0
.....	68	47	0	0	59	0	24	17	0
25 Juin.....	73	55	0	4	50	0	17	11	0
2 Juin.....	74	20	0	7	18	0	17	15	0
27 Juin.....	74	20	0	7	18	0	16	50	0
27 Juillet.....	74	20	0	7	18	0	19	0	0
27 Juin.....	74	20	0	7	18	0	21	11	0
.....	74	20	0	7	18	0	23	8	0
.....	74	20	0	7	18	0	17	22	0
29 Juin 1773.....	78	2	0	5	25	0	9	34	0
.....	78	2	0	5	25	0	10	10	0
.....	78	2	0	5	25	0	12	16	0
.....	78	2	0	5	25	0	12	36	0
2 Juillet 1773.....	78	22	0	6	43	0	14	55	0
31 Juillet.....	79	44	0	7	26	0	12	24	0
.....	79	44	0	7	26	0	18	57	0
2 Juillet.....	79	50	0	7	37	0	20	38	0
26 Juillet.....	80	18	0	9	47	0	12	47	0
28 Juin.....	80	30	0	12	49	0	11	56	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER ATLANTIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

NOMS DES VOYAGEURS ET DATES DES OBSERVATIONS.	LATITUDES.			LONGITUDES.			DÉCLINAISON EST.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
COOK ET BAYLI.									
5 Septembre.....	6	45	0	324	5	0	0	6	0
.....	6	45	0	324	5	0	0	36	20
.....	6	45	0	324	5	0	1	0	3
.....	6	45	0	324	5	0	1	7	0
.....	6	45	0	324	5	0	1	14	40
.....	6	45	0	324	5	0	1	40	0
.....	6	47	0	324	5	0	1	16	0
6 Septembre.....	7	18	0	323	28	0	0	7	0
.....	7	18	0	323	28	0	0	32	15
.....	7	18	0	323	15	0	0	51	0
DUCLOS-GUYOT.									
En 1763.....	7	29	0	328	42	0	1	30	0
COOK ET BAYLI.									
7 Septembre.....	7	50	0	323	15	0	0	1	20
.....	8	43	0	323	15	0	0	5	0
.....	8	43	0	323	15	0	0	8	0
.....	8	43	0	323	15	0	0	8	45
.....	8	43	0	323	15	0	0	13	0
10 Septembre.....	9	1	0	322	45	0	0	15	20
10 Septembre.....	9	1	0	322	45	0	0	15	20
8 Septembre.....	9	1	0	322	45	0	0	30	44
.....	9	1	0	322	45	0	0	44	40
.....	9	1	0	322	45	0	0	44	0
.....	9	1	0	322	45	0	0	45	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	9	20	0	328	9	0	0	0	0
.....	9	20	0	328	9	0	1	0	0
Cook et Bayli.									
9 Septembre 1776.....	9	35	0	322	43	0	0	0	20
8 Septembre.....	9	35	0	322	43	0	0	5	0
.....	9	35	0	322	43	0	0	8	0
.....	9	35	0	325	43	0	0	20	4
.....	9	35	0	322	43	0	0	29	0
.....	9	35	0	322	43	0	0	58	0
9 Septembre.....	10	4	0	322	46	0	1	3	40
2 Novembre.....	10	38	0	325	22	0	0	34	0
9 Septembre.....	11	1	0	322	46	0	0	24	45
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	11	7	0	327	4	0	2	0	0
Cook et Bayli.									
10 Septembre.....	12	40	0	322	46	0	0	6	0
.....	12	40	0	322	46	0	0	27	20
.....	12	40	0	322	46	0	0	33	30
.....	12	40	0	322	46	0	0	44	10
10 Septembre 1776	12	40	0	322	46	0	0	59	0
.....	12	40	0	322	46	0	0	59	40
.....	12	40	0	322	46	0	1	12	0
Cook.									
10 Septembre 1776.....	12	40	0	322	46	0	1	19	40
Carteret.									
31 Octobre 1766.....	12	56	0	326	49	0	1	24	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	13	15	0	326	3	0	2	0	0
Cook et Bayli.									
11 Septembre 1776.....	13	23	0	322	46	0	0	16	0
.....	13	23	0	322	46	0	0	18	40
.....	13	23	0	322	46	0	0	38	0
.....	13	23	0	322	46	0	0	45	5
.....	13	23	0	322	46	0	0	48	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
11 Septembre 1776	13	23	0	322	46	0	1	1	20
.....	13	23	0	322	46	0	1	43	20
.....	14	11	0	322	46	0	0	0	0
.....	14	11	0	322	46	0	0	12	0
.....	14	11	0	322	46	0	0	22	20
.....	14	11	0	322	46	0	0	29	11
.....	14	11	0	322	46	0	0	40	0
.....	14	11	0	322	46	0	1	9	1
12 Septembre.....	15	33	0	322	55	0	0	50	0
12 Septembre.....	15	33	0	322	55	0	0	55	0
.....	15	33	0	322	55	0	0	57	30
.....	15	33	0	322	55	0	1	0	30
12 Septembre 1776.....	15	33	0	322	55	0	1	20	1
.....	15	33	0	322	55	0	1	42	45
.....	15	33	0	322	55	0	1	50	0
.....	15	33	0	322	55	0	1	51	30
13 Septembre.....	16	12	0	322	15	0	0	40	30
.....	16	12	0	322	15	0	0	48	30
.....	16	12	0	322	15	0	1	15	0
Cook.									
13 Septembre 1776.....	16	12	0	322	15	0	1	21	0
Cook et Bayli.									
13 Septembre 1776.....	16	12	0	322	15	0	1	43	30
.....	16	12	0	322	15	0	1	44	33
.....	16	12	0	322	15	0	1	48	0
.....	16	12	0	322	15	0	2	4	0
.....	16	12	0	322	15	0	2	4	45
.....	16	12	0	322	15	0	2	23	20
Cook.									
13 Septembre 1776.....	16	12	0	322	15	0	2	15	55
.....	16	13	0	322	15	0	2	45	20
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	16	57	0	324	12	0	4	0	0
Carteret.									
2 Novembre 1766....	17	22	0	325	26	0	1	40	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Déclinaison Est.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Cook et Bayli.			
14 Septembre 1776.....	17 40 0	321 47 0	1 30 0
.....	17 40 0	321 47 0	2 9 15
Cook.			
14 Septembre 1776.....	17 40 0	321 47 0	2 11 6
.....	17 40 0	321 47 0	2 38 20
Cook et Bayli.			
14 Septembre 1776.....	17 40 0	321 47 0	2 53 10
.....	17 40 0	321 47 0	2 55 50
Cook.			
14 Septembre.....	18 30 0	321 45 0	1 18 10
24 Septembre.....	18 30 0	321 45 0	1 38 10
Cook et Bayli.			
14 Septembre.....	18 30 0	321 45 0	1 34 5
.....	18 30 0	321 45 0	1 43 55
.....	18 30 0	321 45 0	2 52 55
.....	18 30 0	321 45 0	3 2 25
Cook.			
14 Septembre.....	18 30 0	321 45 0	2 16 15
.....	18 30 0	321 45 0	2 16 52
Duclos-Guyot.			
En 1763.....	18 44 0	323 12 0	5 0 0
Cook et Bayli.			
15 Septembre 1776.....	20 8 0	321 34 0	3 22 0
Cook.			
19 Septembre 1776.....	20 8 0	321 34 0	3 34 20
.....	20 8 0	321 34 0	3 27 20
.....	20 8 0	321 34 0	4 2 30
.....	20 8 0	321 34 0	5 26 10
Cook et Bayli.			
16 Septembre 1776.....	20 46 0	321 28 0	1 44 40
.....	20 46 0	321 28 0	1 47 20
Cook.			
16 Septembre 1776.....	20 46 0	321 28 0	2 20 0
.....	20 46 0	321 28 0	2 43 52

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
16 Septembre 1776.....	20	46	0	321	28	0	2	49	0
.....	20	46	0	321	28	0	2	52	40
.....	20	46	0	321	28	0	4	19	20
Cook & Bayli.									
16 Septembre.....	20	46	0	321	28	0	3	15	20
.....	21	37	0	321	26	0	2	23	45
.....	21	37	0	321	26	0	2	26	30
.....	21	37	0	321	26	0	3	6	0
.....	21	37	0	321	26	0	3	14	15
.....	21	37	0	321	26	0	2	7	30
Cook.									
16 Septembre.....	21	37	0	321	26	0	2	44	49
.....	21	37	0	321	26	0	2	49	15
.....	21	37	0	321	26	0	3	24	15
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	22	28	0	326	4	0	4	0	0
.....	23	41	0	315	10	0	7	0	0
Carteret.									
7 Novembre 1766....	23	54	0	329	25	0	4	46	0
.....	23	54	0	319	25	0	5	56	0
Cook et Bayli.									
17 Septembre..	24	17	0	321	27	0	2	7	0
.....	24	17	0	321	27	0	2	24	0
.....	24	17	0	321	27	0	2	28	0
.....	24	17	0	321	27	0	2	55	0
.....	24	17	0	321	27	0	3	16	0
Cook.									
17 Septembre 1776.....	24	17	0	321	27	0	2	43	30
.....	24	17	0	321	27	0	2	50	0
.....	24	17	0	321	27	0	3	24	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	25	12	0	323	17	0	6	0	0
Carteret.									
8 Novembre 1776.....	25	49	0	318	14	0	6	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
19 Septembre 1776.....	25	54	0	322	35	0	3	19	45
.....	25	54	0	322	35	0	3	32	31
.....	25	54	0	322	35	0	3	26	35
Duclos-Guyot.									
En 1763	25	56	0	311	53	0	10	0	0
.....	26	22	0	309	41	0	10	12	0
.....	26	32	0	309	17	0	11	0	0
.....	26	37	0	322	13	0	6	30	0
Cook.									
19 Septembre 1776.....	26	47	0	323	8	0	2	39	30
.....	26	47	0	323	8	0	2	49	45
.....	26	47	0	323	8	0	3	16	32
.....	26	47	0	323	8	0	3	19	10
.....	26	47	0	323	8	0	3	23	45
.....	26	47	0	323	8	0	4	2	20
Cook et Bayli.									
19 Septembre.....	26	47	0	323	8	0	2	59	25
.....	26	47	0	323	8	0	3	14	0
.....	27	14	0	324	21	0	2	57	15
.....	27	14	0	324	21	0	3	0	15
20 Septembre 1776.....	27	14	0	324	21	0	3	13	45
.....	27	14	0	324	20	0	3	25	15
.....	27	14	0	324	21	0	3	26	10
Cook.									
20 Septembre.....	27	14	0	324	21	0	2	44	0
.....	27	14	0	324	21	0	2	46	20
.....	27	14	0	324	21	0	3	17	15
Duclos-Guyot.									
En 1763	27	22	0	309	41	0	11	0	0
Cook.									
20 Septembre.....	27	29	0	323	45	30	2	50	2
Duclos-Guyot.									
En 1763	27	39	0	310	58	0	13	30	0
.....	27	44	0	324	28	0	2	15	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
En 1763.....	27	44	0	324	28	0	2	44	30
Cook et Bayli.									
20 Septembre.....	27	44	0	324	28	0	1	40	45
.....	27	44	0	324	28	0	1	56	13
.....	27	44	0	324	28	0	1	58	45
.....	27	44	0	324	28	0	2	25	15
.....	27	44	0	324	28	0	2	53	15
21 Septembre.....	28	19	0	325	15	0	1	31	14
.....	28	19	0	325	15	0	1	32	45
.....	28	19	0	324	39	0	2	1	47
.....	28	19	0	325	15	0	2	27	15
Cook.									
21 Septembre.....	28	19	0	325	15	0	2	11	45
.....	28	19	0	325	15	0	2	13	30
.....	28	19	0	325	15	0	2	28	15
Cook et Bayli.									
22 Septembre.....	28	36	0	326	35	0	1	43	10
.....	28	36	0	326	35	0	1	55	0
.....	28	36	0	326	35	0	2	4	30
.....	28	36	0	326	35	0	2	22	20
.....	28	36	0	327	35	0	3	12	15
.....	28	36	0	326	35	0	3	15	45
.....	28	36	0	326	35	0	3	27	50
Cook.									
22 Septembre.....	28	36	0	326	35	0	2	12	55
.....	28	36	0	326	35	0	2	31	43
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	28	57	0	320	30	0	7	0	0
Cook et Bayli.									
22 Septembre.....	29	12	0	327	4	0	0	58	5
.....	29	12	0	327	4	0	1	1	5
.....	29	12	0	327	4	0	1	2	35
27 Septembre.....	29	12	0	327	4	0	1	22	15
.....	29	12	0	327	4	0	1	53	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
22 Septembre.....	29	12	0	327	4	0	1	15	1
.....	29	12	0	327	4	0	1	20	45
.....	29	12	0	327	4	0	1	23	20
Cook & Bayli.									
22 Septembre.....	29	19	0	327	4	0	0	56	0
23 Septembre.....	29	29	0	328	23	0	0	40	40
.....	29	29	0	328	23	0	1	0	40
.....	29	29	0	328	23	0	1	5	20
.....	29	29	0	328	23	0	1	31	0
.....	29	29	0	328	23	0	1	33	5
.....	29	29	0	328	23	0	1	48	40
23 Septembre.....	29	29	0	328	23	0	2	1	0
Cook.									
23 Septembre.....	29	29	0	328	23	0	1	22	55
Carteret.									
11 Novembre 1766.....	29	57	0	315	8	0	8	50	0
24 Septembre.....	30	25	0	331	7	0	1	17	0
.....	30	25	0	331	7	0	1	39	21
.....	30	25	0	331	7	0	2	37	15
Cook et Bayli.									
24 Septembre.....	30	25	0	331	7	0	1	3	40
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	31	11	0	319	7	0	8	0	0
.....	32	10	0	309	9	0	12	0	0
.....	33	40	0	307	42	0	13	0	0
Carteret.									
15 Novembre 1766	34	12	0	310	54	0	12	0	0
Furneau.									
17 Mars 1773.....	34	13	0	15	40	0	21	0	0
Carteret.									
16 Novembre 1766.....	34	38	0	309	37	0	12	36	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	34	39	0	316	43	0	12	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
7 Décembre 1769.....	34	44	0	3	5	0	12	40	0
Carteret.									
17 Novembre 1766	34	46	0	309	7	0	13	3	0
.....	34	46	0	309	7	0	14	20	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	34	58	0	305	32	0	15	0	0
Cook.									
25 Décembre 1769....	35	10	0	5	55	0	11	35	0
Carteret.									
18 Novembre 1766.....	35	37	0	307	46	0	14	30	0
.....	35	37	0	306	46	0	15	45	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	36	30	0	314	58	0	14	0	0
Cook.									
26 Février 1774.....	36	37	0	351	42	0	5	53	0
.....	36	48	0	1	39	0	11	9	0
Carteret.									
20 Novembre 1766.....	36	57	0	305	47	0	15	33	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	37	13	0	304	33	0	15	0	0
Cook.									
24 Février 1774.....	37	25	0	349	25	0	8	10	0
Carteret.									
21 Novembre 1766....	37	40	0	306	30	0	15	52	0
Cook.									
25 Février 1774.....	37	52	0	350	57	0	6	38	0
9 Janvier 1770.....	38	4	0	2	17	0	14	15	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	38	22	0	313	21	0	17	30	0
Byron.									
.....	38	53	0	306	35	0	13	0	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	40	34	0	302	30	0	16	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
En Février 1770.....	41	0	0	2	20	0	13	5	0
Carteret.									
28 Novembre 1766....	41	14	0	300	47	0	19	0	0
Byron.									
10 Novembre 1764.....	41	16	0	302	18	0	18	20	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	41	39	0	303	59	0	17	0	0
Cook.									
13 Février 1770.....	42	2	0	3	35	0	15	4	0
Carteret.									
29 Novembre 1766.....	42	8	0	298	54	0	19	2	0
.....	42	8	0	298	54	0	19	45	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	42	28	0	304	13	0	19	0	0
Byron.									
11 Novembre 1764....	42	34	0	299	18	0	11	45	0
Duclos Guyot.									
En 1763.....	42	39	0	308	33	0	19	0	0
Byron.									
12 Novembre 1764.....	43	46	0	297	30	0	19	30	0
Cook.									
En Mars 1770.....	44	47	0	10	35	0	14	0	0
17 Février.....	45	16	0	4	5	0	15	30	0
Byron.									
15 Novembre 1764.....	45	21	0	294	33	0	19	41	0
Cook.									
4 Mars 1770.....	46	31	0	5	45	0	16	16	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	46	33	0	305	4	0	20	0	0
Carteret.									
4 Décembre 1766.....	47	0	0	296	44	0	20	20	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	47	5	0	300	1	0	21	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
6 Mars 1770.....	47	6	0	6	35	0	15	10	0
7 Mars.....	47	6	0	9	35	0	16	29	0
Carteret.									
7 Décembre 1766.....	47	14	0	293	58	0	19	40	0
6 Décembre	47	35	0	294	45	0	20	34	0
Cook.									
27 Février 1770.....	47	43	0	6	35	0	16	34	0
Wallis.									
8 Décembre 1766.....	47	56	0	291	11	0	23	15	0
Carteret.									
5 Décembre 1766.....	48	1	0	296	7	0	20	40	0
Furneau.									
7 Mars 1773.....	48	30	0	12	1	0	16	32	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	48	33	0	303	17	0	21	0	0
Carteret.									
8 Décembre 1766.....	48	54	0	293	31	0	20	30	0
9 Décembre	49	12	0	292	4	0	20	35	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	49	47	0	296	35	0	22	0	0
Byron.									
11 Janvier 1765	51	24	0	293	25	0	19	0	0
12 Janvier.....	51	27	0	293	41	0	23	30	0
Furneau.									
24 Février 1773.....	52	48	0	352	42	0	5	0	0
2 Février.....	53	12	0	344	35	0	1	26	0
25 Février.....	53	14	0	355	37	0	6	30	0
3 Mars.....	53	17	0	9	28	0	16	45	0
26 Février.....	53	29	0	357	54	0	9	20	0
27 Février.....	53	29	0	0	46	0	11	0	0
Cook.									
26 Janvier 1775	53	33	0	326	25	0	9	26	0
11 Janvier 1775.....	54	35	0	312	25	0	19	25	0
5 Février 1775.....	57	8	0	334	1	0	5	18	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
4 Janvier.....	57	9	0	298	49	0	21	28	0
1 Février.....	58	25	0	330	17	0	10	11	0
14 Décembre 1773.....	64	55	0	294	15	0	14	12	0
							Déclinaison Ouest.		
Cook.									
26 Octobre 1776.....	0	0	0	328	5	0	2	24	0
Carteret.									
6 Février 1768.....	0	20	0	329	8	0	8	32	0
Bougainville.									
En 1766.....	1	8	0	340	0	0	8	45	0
Rosnevet.									
En 1773.....	1	10	0	338	32	0	8	20	0
Bayli.									
1 Septembre 1776.....	1	13	0	328	37	0	2	56	0
Cook.									
1 Septembre 1776.....	1	13	0	328	57	0	3	1	0
Bayli.									
1 Septembre 1776.....	1	13	0	328	57	0	3	4	0
.....	1	13	0	329	7	0	3	12	0
.....	1	13	0	328	57	0	3	36	0
.....	1	13	0	328	57	0	3	39	0
Cook.									
1 Septembre.....	1	13	0	328	37	0	3	26	52
.....	1	13	0	328	37	0	4	22	0
Bayli.									
1 Septembre.....	1	13	0	328	57	0	3	45	0
9 Juin 1780.....	1	30	0	331	35	0	7	17	0
Cook.									
2 Septembre.....	1	50	0	327	25	0	3	14	0
Bayli.									
2 Septembre 1776.....	1	50	0	327	25	0	3	9	0
.....	1	50	0	327	25	0	3	27	55
.....	1	50	0	327	25	0	3	36	0
.....	1	50	0	327	25	0	3	43	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
2 Septembre 1776	1	50	0	327	25	0	3	47	0
Cook.									
2 Septembre.....	1	50	0	327	25	0	3	23	0
.....	1	50	0	327	25	0	3	26	40
Carteret.									
5 Février 1768.....	2	1	0	340	1	0	8	58	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	2	15	0	331	32	0	4	30	0
Cook.									
2 Septembre.....	2	48	0	327	58	0	2	20	0
.....	2	48	0	327	58	0	2	52	0
....	2	48	0	327	58	0	3	12	22
....	2	48	0	327	58	0	4	26	0
Bayli.									
2 Septembre.....	2	48	0	327	58	0	2	29	0
.....	2	48	0	327	58	0	2	50	0
Rosnevet.									
En 1763.....	3	9	0	337	51	0	9	10	0
Carteret.									
4 Février 1769.....	3	26	0	340	46	0	9	10	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	3	30	0	331	42	0	4	0	0
Bayli.									
3 Septembre 1776	3	37	0	327	21	0	3	9	0
.....	3	37	0	327	21	0	3	48	0
Cook.									
3 Septembre 1776	3	37	0	327	21	0	2	7	0
.....	3	37	0	327	21	0	2	14	0
.....	3	37	0	327	21	0	2	29	0
.....	3	37	0	327	21	0	2	55	7
.....	3	37	0	327	21	0	3	15	0
.....	3	37	0	327	21	0	3	23	0
Bougainville.									
En 1776.....	3	51	0	341	10	0	9	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
21 Septembre 1776.....	3	57	0	339	7	0	9	58	0
Carteret.									
25 Octobre 1766.....	4	14	0	330	12	0	4	30	0
Cook.									
3 Septembre 1776.....	4	22	0	327	6	0	1	48	0
.....	4	22	0	327	6	0	2	2	0
.....	4	22	0	327	6	0	2	3	0
.....	4	22	0	327	6	0	2	27	0
.....	4	22	0	327	6	0	2	54	0
.....	4	22	0	327	6	0	2	58	0
.....	4	22	0	327	6	0	4	3	0
Bayli.									
3 Septembre.....	4	22	0	327	6	0	2	36	52
.....	4	22	0	327	6	0	2	40	0
Le Gentil.									
22 Avril 1760.....	4	44	0	339	24	0	7	28	0
Cook.									
4 Septembre 1776.....	5	0	0	325	55	0	2	3	0
.....	5	0	0	325	55	0	2	11	0
Bayli.									
4 Septembre.....	5	0	0	325	55	0	2	31	0
Bougainville.									
11 Janvier 1767	5	0	0	328	10	0	3	17	0
Carteret.									
3 Février 1769.....	5	4	0	341	50	0	9	4	0
Bayli									
7 Juin 1780.....	5	12	0	333	47	0	8	26	0
Rosnevet.									
En 1773	5	17	0	336	40	0	8	0	0
Bayli.									
4 Septembre 1776	5	17	0	325	41	30	1	42	56
Cook.									
4 Septembre.....	5	34	0	325	28	0	1	12	0
.. ..	5	34	0	325	28	0	1	22	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
4 Septembre.....	5	34	0	325	28	0	1	24	0
5 Septembre.....	6	0	0	324	45	0	0	21	30
.....	6	0	0	324	45	0	0	44	0
Bayli et Cook.									
5 Septembre.....	6	0	0	324	45	0	0	6	0
.....	6	45	0	324	5	0	0	14	20
Cook.									
5 Septembre.....	6	45	0	324	5	0	0	46	30
.....	6	45	0	324	5	0	1	18	40
Carteret.									
2 Février 1769.....	6	45	0	342	53	0	9	34	0
27 Octobre 1766.....	7	3	0	328	46	0	3	52	0
Bayli.									
23 Septembre 1780.....	7	5	0	337	12	0	7	43	0
Cook et Bayli.									
6 Septembre 1776.....	7	18	0	323	28	0	0	3	0
Cook.									
6 Septembre.....	7	18	0	323	28	0	0	42	15
.....	7	18	0	323	28	0	0	52	15
.....	7	18	0	323	28	0	0	54	0
.....	7	18	0	323	28	0	1	52	0
Bougainville.									
En 1766.....	7	22	0	342	48	0	9	45	0
Wallis.									
24 Mars 1768.....	7	28	0	343	5	0	10	0	0
Bougainville.									
En 1766.....	7	37	0	344	17	0	10	25	0
Cook.									
5 Septembre 1776....	7	50	0	323	15	0	0	22	57
.....	7	50	0	323	15	0	0	26	50
.....	7	50	0	323	15	0	0	42	15
.....	7	50	0	323	15	0	1	20	0
Cook et Bayli.									
6 Septembre 1776....	7	50	0	323	15	0	0	6	40
.....	7	50	0	323	15	0	0	7	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
6 Septembre 1776	7	50	0	323	15	0	0	21	20
Wallis.									
23 Mars 1768	7	58	0	343	31	0	9	53	0
Duclos-Guyot.									
En 1763	8	10	0	330	53	0	3	0	0
Bougainville.									
En 1766	8	20	0	346	5	0	11	0	0
Cook.									
7 Septembre 1776	8	43	0	322	46	0	0	21	0
9 Septembre	8	43	0	323	15	0	0	34	0
.....	8	43	0	323	15	0	1	8	0
Cook et Bayli.									
6 Septembre	8	43	0	323	15	0	0	15	0
.....	8	43	0	323	15	0	0	21	22
.....	8	43	0	323	15	0	0	32	0
Carteret.									
28 Octobre 1766.....	8	46	0	328	21	0	1	50	0
Bayli.									
4 Juin 1780	9	0	0	337	5	0	9	8	0
Cook et Bayli.									
8 Septembre 1776.....	9	1	0	322	45	0	0	2	20
Cook.									
8 Septembre	9	1	0	322	45	0	0	26	0
.....	9	35	0	322	43	0	0	16	22
.....	9	35	0	322	43	0	0	23	0
Cook et Bayli.									
8 Septembre	9	35	0	322	43	0	0	3	0
Cook et Bayli.									
8 Septembre 1776....	9	35	0	322	43	0	0	9	52
.....	9	35	0	322	43	0	0	10	0
.....	9	35	0	322	43	0	0	11	0
Rosnevet.									
En 1773	9	52	0	325	18	0	6	20	0
Cook.									
9 Septembre.	10	4	0	322	46	0	0	38	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
9 Septembre.....	10	4	0	322	46	0	0	46	0
.....	10	4	0	322	46	0	0	50	33
.....	10	4	0	322	46	0	1	8	40
Cook et Bayli.									
9 Septembre.....	10	4	0	322	46	0	0	31	0
Bayli.									
9 Septembre.....	10	4	0	322	46	0	1	33	0
Bougainville.									
14 Janvier 1767.....	10	30	0	326	35	0	0	10	0
11 Janvier.....	10	30	0	327	0	0	10	0	0
Cook.									
9 Septembre.....	10	32	30	322	46	0	0	44	47
13 Septembre.....	10	38	0	325	22	0	0	18	0
9 Septembre.....	10	42	0	322	46	0	0	26	0
Bayli.									
2 Juin 1780.....	10	45	0	339	47	0	10	50	0
Carteret.									
30 Octobre 1766.....	10	57	0	327	26	0	0	30	0
Cook et Bayli.									
9 Septembre 1776.....	11	1	0	322	46	0	0	9	20
.....	11	1	0	322	46	0	0	11	20
Bayli.									
25 Septembre 1776.....	11	4	0	334	45	0	6	5	0
Bougainville.									
En 1766.....	11	11	0	349	7	0	11	50	0
Carteret.									
27 Janvier 1769.....	11	36	0	348	10	0	11	40	0
Duclos-Guyot.									
En 1763.....	11	39	0	330	25	0	3	0	0
Cook et Bayli.									
28 Mai 1780.....	12	0	0	341	43	0	8	32	10
30 Mai.....	12	0	0	341	43	0	10	13	30
.....	12	0	0	341	43	0	10	15	20
Cook.									
31 Mai 1780.....	12	0	0	341	43	0	9	56	10

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
31 Mai 1780.....	12	0	0	341	43	0	10	43	50
.....	12	4	0	341	17	0	10	40	0
Rosnevet.									
En 1773.....	12	15	0	334	45	0	4	8	0
Carteret.									
31 Octobre 1766.....	12	30	0	327	5	0	0	0	0
Cook.									
10 Septembre.....	12	40	0	322	46	0	0	44	10
Bayli.									
30 Mai 1780.....	12	54	0	341	55	0	10	57	0
Carteret.									
25 Janvier 1769.....	12	54	0	349	30	0	11	47	0
Cook et Bayli.									
14 Septembre 1776.....	13	23	0	322	46	0	0	30	0
Cook.									
11 Septembre.....	13	23	0	322	46	0	0	37	40
.....	13	23	0	322	46	0	0	44	10
Bayli.									
5 Septembre 1776....	13	34	0	343	41	0	5	6	0
30 Mai 1780.....	13	34	0	342	15	0	10	33	0
Rosnevet.									
En 1773.....	14	7	0	334	17	0	3	33	0
Cook.									
11 Septembre 1776.....	14	11	0	322	46	0	0	17	0
.....	14	11	0	322	46	0	0	19	40
.....	14	11	0	322	46	0	0	28	0
Bougainville.									
En 1766.....	14	21	0	351	29	0	12	0	0
Carteret.									
19 Janvier 1769.....	14	22	0	350	31	0	12	30	0
Cook et Bayli.									
28 Mai 1780.....	14	24	0	343	31	0	11	57	20
.....	14	24	0	343	31	0	12	1	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
28 Mai 1780.....	14	24	0	343	31	0	11	52	8
.....	14	24	0	343	31	0	12	52	0
Bayli.									
28 Mai 1780.....	14	24	0	343	31	0	11	8	20
.....	14	24	0	343	31	0	11	22	0
27 Mai	15	5	0	344	17	0	11	10	0
Cook.									
12 Septembre.....	15	33	0	322	55	0	1	20	1
Bayli.									
27 Mars 1780.....	15	45	0	344	35	0	11	3	0
Wallis.									
19 Mars 1768.....	15	57	0	351	46	0	12	47	0
Carteret.									
19 Janvier 1769.....	16	6	0	355	57	0	13	46	0
Rosnevet.									
En 1773.....	16	10	0	333	42	0	3	5	0
Cook.									
13 Septembre 1776....	16	12	0	322	15	0	1	44	33
Wallis.									
15 Mars.....	16	36	0	355	30	0	12	50	0
.....	16	44	0	355	35	0	13	0	0
Carteret.									
18 Janvier 1769.....	17	5	0	357	45	0	14	38	0
Bayli.									
29 Septembre.....	17	20	0	322	35	0	3	25	0
Bougainville.									
En 1766.....	17	26	0	4	46	0	13	50	0
Cook.									
14 Septembre 1776.....	17	40	0	321	47	0	2	11	6
Rosnevet.									
En 1773.....	18	10	0	322	47	0	2	0	0
Cook.									
14 Septembre 1776,....	18	30	0	321	45	0	2	16	52

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
30 Septembre 1776.....	18	33	0	332	33	0	3	34	0
Rosnevet.									
En 1773.....	19	41	0	333	13	0	1	9	0
Bayli.									
23 Mai 1780.....	19	46	0	351	35	0	12	29	0
30 Septembre 1776	20	0	0	332	15	0	3	30	0
1 Octobre 1776.....	20	17	0	322	18	0	3	1	0
Rosnevet.									
En 1773.....	20	20	0	333	17	0	1	0	0
Carteret.									
15 Janvier 1769.....	21	4	0	1	29	0	16	31	0
Rosnevet.									
En 1773.....	21	46	0	333	58	0	1	31	0
Carteret.									
14 Janvier 1769.....	22	16	0	2	27	0	16	19	0
Bayli.									
4 Octobre 1776.....	22	17	0	333	10	0	2	16	0
21 Mai.....	22	26	0	353	37	0	14	18	0
Rosnevet.									
En 1773.....	23	0	0	334	25	0	0	33	0
En 1773.....	24	30	0	335	42	0	1	6	0
Bayli.									
19 Mai 1780.....	24	37	0	357	17	0	15	43	0
.....	24	40	0	357	11	0	14	12	20
21 Mai.....	24	40	0	357	11	0	14	30	0
19 Mai.....	24	40	0	357	11	0	14	47	33
21 Mai.....	24	40	0	357	11	0	14	35	0
Cook et Bayli.									
19 Mai 1780.....	24	40	0	357	11	0	13	49	0
Cook.									
19 Mai 1780.....	24	40	0	357	11	0	17	13	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
6 Octobre 1776.....	24	58	0	333	27	0	2	54	0
Rosnevet.									
En 1773.....	25	30	0	337	9	0	1	39	0
Bougainville.									
En 1776.....	25	51	0	4	13	0	16	30	0
Rosnevet.									
En 1773.....	26	32	0	337	46	0	1	57	0
Bayli.									
17 Mai 1780.....	26	40	0	2	54	0	17	16	0
Rosnevet.									
En 1773.....	27	32	0	339	9	0	3	1	0
.....	28	31	0	341	21	0	2	55	0
Bayli.									
11 Octobre 1776.....	28	40	0	337	34	0	3	6	0
Bougainville.									
En 1776.....	28	49	0	11	22	0	18	50	0
.....	28	49	0	11	22	0	19	50	0
Bayli.									
9 Octobre 1776.....	28	58	0	336	28	0	2	30	0
.....	29	5	0	326	35	0	3	2	0
Rosnevet.									
En 1773.....	29	21	0	342	27	0	3	39	0
Bayli.									
14 Mai 1780.....	30	8	0	8	17	0	19	58	0
Cook.									
24 Septembre 1776	30	25	0	331	7	0	0	57	5
.....	30	25	0	331	17	0	0	23	20
.....	30	25	0	331	17	0	0	28	15
.....	30	25	0	331	7	0	0	42	58
Cook et Bayli.									
24 Septembre 1776	30	25	0	331	7	0	0	4	5
Bayli.									
24 Septembre 1776	30	25	0	330	57	0	1	42	5
13 Octobre.....	30	26	0	341	25	0	4	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
9 Janvier 1769.....	30	37	0	10	43	0	19	20	0
Rosnevet.									
En 1773.....	30	50	0	345	7	0	3	23	0
.....	31	39	0	347	53	0	4	53	0
Bayli.									
16 Octobre 1776.....	31	42	0	347	21	0	6	2	0
.....	31	47	0	346	45	0	6	20	0
Rosnevet.									
En 1773.....	31	54	0	355	1	0	9	52	0
En 1773.....	32	26	0	351	22	0	4	5	0
Bayli.									
12 Mai 1780.....	32	43	0	14	5	0	20	56	0
Bougainville.									
En 1776.....	32	47	0	14	27	0	20	40	0
Cook.									
29 Septembre 1776.....	32	52	0	341	13	0	4	45	28
Rosnevet.									
En 1773.....	33	26	0	358	4	0	10	10	0
Cook.									
28 Septembre 1776.....	33	43	0	341	8	0	3	20	50
.....	33	43	0	341	8	0	3	54	5
.....	33	43	0	341	8	0	4	26	40
.....	33	43	0	341	8	0	4	42	0
.....	33	43	0	341	8	0	4	43	40
Bayli.									
.....	33	43	0	341	8	0	2	46	25
28 Septembre.....	33	43	0	341	8	0	3	26	0
22 Septembre.....	33	46	0	0	5	0	13	56	0
29 Septembre.....	33	48	0	341	5	0	3	5	45
.....	33	48	0	340	5	0	3	40	45
.....	33	48	0	341	5	0	5	7	0
.....	33	48	0	341	5	0	5	34	30
.....	33	48	0	341	5	0	5	47	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
29 Septembre.....	33	48	0	341	5	0	4	24	0
Rosnevet.									
En 1773.....	33	52	0	5	3	0	13	11	0
Bayli.									
24 Octobre 1776.....	33	55	0	1	29	0	15	8	0
29 Septembre 1776.....	33	56	0	341	21	0	3	5	45
29 Septembre 1776.....	33	56	0	341	21	0	5	7	0
.....	33	56	0	341	21	0	5	47	45
.....	33	56	0	341	21	0	5	39	45
Cook.									
29 Septembre.....	33	56	0	341	21	0	4	24	0
.....	33	56	0	341	21	0	4	44	15
.....	33	56	0	341	21	0	4	44	15
Bayli.									
28 Octobre.....	33	57	0	8	53	0	17	16	0
Rosnevet.									
En 1773.....	34	4	0	16	39	0	19	15	0
.....	34	5	0	2	6	0	10	10	0
.....	34	8	0	15	7	0	17	37	0
Bayli.									
1 Octobre 1776.....	34	12	0	346	5	0	6	0	10
13 Octobre.....	34	12	0	346	5	0	6	27	50
1 Octobre.....	34	12	0	346	5	0	7	45	30
.....	34	12	0	346	5	0	7	50	15
.....	34	12	0	346	5	0	7	57	35
Cook et Bayli.									
1 Octobre 1776.....	34	12	0	346	5	0	6	36	55
.....	34	12	0	346	5	0	6	37	55
.....	34	12	0	346	5	0	7	10	36
Cook.									
7 Octobre.....	34	12	0	346	5	0	7	38	30
Bayli.									
7 Novembre 1776.....	34	13	0	14	25	0	21	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
10 Février 1775	34	15	0	335	50	0	22	0	0
Bayli.									
1 Octobre 1776.....	34	16	0	345	19	0	6	13	0
.....	34	16	0	345	19	0	7	21	30
.....	34	16	0	345	19	0	7	21	35
Rosnevet.									
En 1773.....	34	16	0	11	52	0	14	28	0
.....	34	16	0	17	58	0	20	15	0
Cook et Bayli.									
1 Octobre 1776.....	34	16	0	345	19	0	7	0	58
.....	34	16	0	345	19	0	6	49	30
.....	34	16	0	345	19	0	7	2	50
.....	34	16	0	345	19	0	7	41	0
Rosnevet.									
En 1773.....	34	20	0	19	23	0	20	45	0
Carteret.									
En Novembre 1768....	34	24	0	16	5	0	19	30	0
Bayli.									
3 Octobre 1776.....	34	43	0	347	55	0	5	53	0
Cook.									
3 Octobre 1767.....	34	43	0	347	55	0	6	32	0
Cook et Bayli.									
3 Octobre.....	34	43	0	347	55	0	7	11	0
Bougainville.									
En 1766.....	34	47	0	17	56	0	20	25	0
Cook.									
14 Octobre 1776.....	34	57	0	349	4	0	18	37	0
.....	34	57	0	349	4	0	18	51	0
.....	34	57	0	349	4	0	18	55	0
.....	34	57	0	6	6	0	19	28	30
Bayli.									
14 Octobre 1776.....	34	57	0	6	6	0	21	47	0
.....	34	59	0	349	4	0	19	14	0
7 Octobre.....	35	19	0	349	35	0	7	24	15

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
7 Octobre.....	35	19	0	349	35	0	8	33	30
.....	35	19	0	349	35	0	8	35	0
.....	35	19	0	349	35	0	8	42	30
.....	35	19	0	349	35	0	8	47	5
.....	35	19	0	349	35	0	9	19	30
.....	35	19	0	349	35	0	10	31	30
Cook.									
7 Octobre.....	35	19	0	349	35	0	8	20	29
Cook et Bayli.									
9 Octobre.....	35	25	0	354	11	0	10	2	0
.....	35	26	0	354	11	0	10	18	30
Cook.									
9 Octobre.....	35	26	0	354	11	0	10	35	41
.....	35	26	0	354	11	0	10	40	0
Bayli.									
.....	35	26	0	354	11	0	10	57	0
9 Octobre.....	35	26	0	354	11	0	11	5	0
.....	35	26	0	354	11	0	10	50	0
3 Octobre.....	35	27	0	348	5	0	5	26	30
Rosnevet.									
En 1773.....	35	27	0	15	31	0	22	0	0
Cook et Bayli.									
7 Octobre 1776.....	35	30	0	349	40	0	8	34	25
.....	35	30	0	349	40	0	8	43	15
.....	35	30	0	349	40	0	9	14	35
.....	35	30	0	349	40	0	9	18	10
.....	35	30	0	349	40	0	9	19	0
.....	35	30	0	349	40	0	9	23	35
.....	35	30	0	349	40	0	10	0	50
Cook.									
7 & 8 Octobre.....	35	30	0	350	10	0	9	1	40
.....	35	31	0	349	55	0	9	0	32
.....	35	32	0	350	10	0	9	1	0
9 Octobre.....	35	32	0	350	10	0	9	41	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
8 Octobre.....	35	32	0	350	10	0	9	23	0
.....	35	32	0	350	10	0	9	27	0
.....	35	32	0	350	10	0	8	49	0
.....	35	32	0	350	10	0	9	0	0
.....	35	32	0	350	10	0	7	9	0
Bayli.									
8 Octobre.....	35	32	0	350	10	0	8	16	0
3 Octobre.....	35	37	0	348	5	0	5	42	55
.....	35	37	0	348	5	0	5	44	30
.....	35	37	0	348	5	0	5	51	10
.....	35	37	0	348	5	0	6	27	15
.....	35	37	0	348	5	0	6	28	0
Cook et Bayli.									
3 Octobre 1776.....	35	37	0	348	5	0	6	38	30
.....	35	37	0	348	5	0	6	46	10
Cook.									
3 & 4 Octobre 1776..	35	41	15	348	10	0	6	29	23
.....	35	45	0	348	15	0	6	29	40
.....	35	45	0	348	15	0	6	34	5
Cook et Bayli.									
4 Octobre.....	35	45	0	348	15	0	6	40	0
.....	35	45	0	348	15	0	6	49	5
.....	35	45	0	348	15	0	7	5	50
Bayli.									
4 Octobre.....	35	45	0	348	15	0	5	46	15
.....	35	45	0	348	15	0	7	23	45
Cook et Bayli.									
4 Octobre.....	35	49	0	348	21	0	7	12	40
.....	35	49	0	348	21	0	7	16	0
Cook.									
4 Octobre.....	35	49	0	348	21	0	7	34	5
.....	35	49	0	348	21	0	7	35	15
.....	35	49	0	348	21	0	7	40	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
4 Octobre.....	35	45	0	348	21	0	7	19	50
.....	35	49	0	348	21	0	7	49	0
.....	35	49	0	348	21	0	7	55	55
Rosnevet.									
En 1773.....	36	2	0	17	34	0	22	10	0
Bayli.									
21 Juillet 1780.....	38	10	0	320	33	0	18	33	0
.....	38	10	0	320	33	0	18	55	0
.....	38	10	0	320	33	0	19	16	34
.....	38	10	0	320	33	0	19	17	45
.....	38	10	0	320	33	0	20	20	30
.....	40	4	0	14	27	0	18	30	0
Furneau.									
En 1773.....	41	48	0	15	40	0	17	15	0
Bayli.									
3 Décembre 1772.....	44	28	0	15	50	0	18	16	0
Bougainville.									
En 1776.....	44	30	0	302	51	0	18	15	0
Bayli.									
2 Août 1780.....	44	50	0	334	5	0	21	26	30
.....	44	50	0	334	5	0	21	30	0
.....	44	50	0	334	5	0	21	36	45
Cook.									
.....	44	50	0	334	5	0	22	20	30
Bougainville.									
En 1766.....	45	4	0	301	18	0	19	45	0
.....	45	33	0	300	13	0	19	56	0
Bayli.									
4 Décembre 1772.....	45	46	0	15	39	0	17	51	0
Bayli.									
5 Décembre 1772.....	47	10	0	15	19	0	15	15	30
6 Décembre.....	48	41	0	13	59	0	18	11	0
Cook.									
9 Décembre 1769.....	49	46	0	17	33	0	16	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Furneau.									
20 Février 1773.....	53	15	0	338	28	0	2	0	0
16 Janvier 1773.....	54	4	0	333	21	0	6	32	0
Cook.									
18 Février 1775.....	54	25	0	6	21	0	13	10	0
23 Décembre 1772.....	55	26	0	336	2	0	23	56	0
Cook et Bayli.									
16 Février 1775.....	55	26	0	3	27	0	12	15	0
Furneau.									
12 Février 1773.....	55	46	0	320	55	0	10	30	0
9 Février 1774.....	57	20	0	314	51	0	15	36	0
10 Février 1775.....	58	15	0	347	1	0	1	7	0
Cook.									
12 Février 1775.....	58	19	0	350	52	0	3	23	0
Cook et Bayli.									
2 Décembre 1772.....	59	12	0	7	20	0	12	8	0
Furneau.									
7 Février 1774.....	59	16	0	310	17	0	19	20	0
3 Février 1773.....	60	4	0	299	52	0	24	30	0
4 Février 1774.....	60	20	0	304	15	0	19	30	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER DES INDES.

DÉCLINAISON A L'EST.

NOMS DES VOYAGEURS ET DATES DES OBSERVATIONS.	LATITUDES.			LONGITUDES.			DÉCLINAISON EST.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
CARTERET.									
24 Septembre 1767	0	5	0	136	16	0	3	8	0
BOUGAINVILLE.									
En 1776.....	0	12	0	134	10	0	2	6	0
COOK.									
1 Février 1780.....	1	4	0	103	8	0	0	34	25
.....	1	4	0	103	8	0	0	42	20
.....	1	4	0	103	8	0	0	46	53
COOK ET BAYLI.									
1 Février 1780.....	1	4	0	103	8	0	0	25	40
BAYLI.									
1 Février.....	1	4	0	103	8	0	0	32	40
CARTERET.									
14 Novembre 1767.....	1	57	0	119	39	0	0	6	0
27 Novembre.....	2	13	0	134	16	0	2	9	0
27 Septembre.....	2	50	0	133	52	0	2	0	0
BAYLI.									
31 Janvier 1780.....	3	3	0	102	56	0	1	19	0
30 Janvier 1780.....	3	37	0	102	30	0	0	36	0
CARTERET.									
8 Octobre 1767.....	3	53	0	131	48	0	3	38	0
9 Octobre.....	4	3	0	131	39	0	3	11	0
6 Octobre.....	4	21	0	130	20	0	3	33	0
30 Septembre.....	4	25	0	132	12	0	1	41	0
24 Septembre.....	4	41	0	130	26	0	3	14	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
3 Octobre.....	4	41	0	130	26	0	3	9	0
Bayli.									
30 Janvier 1780.....	4	43	0	102	28	0	0	31	0
Carteret.									
12 Octobre 1767.....	4	49	0	131	17	0	2	19	0
13 Octobre.....	5	12	0	131	2	0	2	20	0
Cook.									
8 Novembre.....	5	30	0	122	16	0	0	50	0
1 Février 1780.....	5	34	0	123	15	0	0	49	0
Carteret.									
6 Novembre 1767.....	5	34	0	123	15	0	0	48	0
27 Octobre.....	5	34	0	124	0	0	1	20	0
7 Novembre.....	5	37	0	122	58	0	0	39	0
Bayli.									
16 Octobre 1779.....	5	54	0	130	45	0	2	34	0
Carteret.									
27 Octobre 1767.....	6	15	0	124	55	0	1	45	0
.....	6	15	0	124	55	0	2	10	0
Marion et Crozet.									
29 Novembre 1772.....	12	44	0	121	3	0	1	0	0
Bayli.									
14 Janvier 1780.....	19	25	0	111	25	0	0	2	0
28 Novembre 1779.....	20	49	0	114	11	0	1	0	0
21 Novembre.....	21	19	0	126	17	0	0	31	0
20 Novembre 1769.....	21	56	0	128	39	0	0	6	0
19 Novembre 1779.....	22	14	0	128	41	0	0	39	0
18 Novembre 1779.....	22	14	0	128	41	0	1	0	40
Cook.									
19 Novembre 1779.....	22	14	0	128	41	0	0	41	27
Cook et Bayli.									
19 Novembre 1779.....	22	14	0	128	41	0	0	24	40
Bayli.									
18 Novembre 1779.....	22	55	0	133	15	0	1	7	0
Cook.									
16 Novembre 1779.....	24	52	0	136	5	0	2	42	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
16 Novembre 1779	24	57	30	136	18	0	2	29	30
Cook.									
16 Novembre 1779	25	3	0	136	31	0	2	17	0
							Déclinaison Ouest.		
Carteret.									
26 Novembre 1767	0	4	0	115	50	0	0	19	0
Cook.									
1 Février 1780.....	1	4	0	103	8	0	0	16	40
.....	1	4	0	103	8	0	0	46	53
Bayli.									
31 Janvier 1780.....	1	36	0	102	54	0	0	3	0
30 Janvier.....	3	21	0	102	38	0	0	4	20
.....	3	21	0	102	38	0	0	11	40
Cook.									
30 Janvier 1780.....	3	21	0	102	38	0	0	29	55
30 Janvier.....	3	21	0	102	38	0	0	53	0
Cook et Bayli.									
30 Janvier 1780.....	3	21	0	102	38	0	0	50	40
Byron.									
7 Novembre 1765	3	54	0	100	55	0	0	38	0
Bayli.									
28 Janvier 1780.....	7	11	0	103	33	0	1	0	0
1 Janvier 1780	8	58	0	104	38	0	0	28	0
Cook.									
16 Janvier 1780.....	15	1	0	111	20	0	0	28	53
.....	15	1	0	111	20	0	0	34	40
.....	15	1	0	111	20	0	0	52	0
Cook et Bayli.									
16 Janvier 1780	15	1	0	111	20	0	0	0	0
Bayli.									
16 Janvier 1780.....	15	3	0	110	46	0	0	10	0
Cook.									
21 Novembre 1779.....	21	18	0	126	21	0	0	14	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
16 Janvier 1780.....	21	18	0	126	21	0	0	32	40
30 Janvier 1780.....	21	18	0	126	21	0	0	33	20
21 Novembre 1779....	21	18	0	126	21	0	0	42	51
.....	21	18	0	126	21	0	0	59	50
Bayli.									
21 Novembre 1779.....	21	18	0	126	21	0	0	29	0
.....	21	18	0	126	21	0	1	15	0
1 Décembre 1779.....	22	7	0	111	12	0	0	21	0
Cook.									
19 Novembre 1779.....	22	14	0	128	41	0	2	43	40

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER DES INDES.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
23 Septembre 1776.....	0	5	0	136	31	0	4	17	0
Bougainville.									
En 1766.....	0	17	0	131	58	0	1	55	0
Bayli.									
27 Septembre 1776	0	52	0	137	31	0	4	30	0
Bougainville.									
En 1766.....	1	16	0	137	22	0	3	5	0
.....	1	52	0	129	53	0	0	40	0
.....	2	10	0	138	39	0	4	28	0
.....	2	54	0	127	44	0	0	33	0
.....	4	29	0	124	53	0	0	22	0
Bayli.									
20 Février 1780.....	9	15	0	102	29	0	0	43	0
Cook.									
27 Août 1770.....	9	56	0	136	35	0	2	30	0
21 Août 1770.....	10	36	0	35	59	0	3	6	0
Bayli.									
17 Août 1769.....	12	38	0	34	20	0	4	9	0
23 Février 1780.....	12	46	0	101	11	0	1	3	0
5 Juin 1770.....	19	12	0	30	5	0	5	35	0
.....	19	12	0	30	5	0	9	0	0
18 Avril.....	25	34	0	24	20	0	8	36	0
13 Avril.....	29	23	0	21	35	0	12	27	0
11 Mai.....	32	2	0	25	5	0	9	10	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
10 Mai.....	33	2	0	25	5	0	8	0	0
7 Mai.....	33	22	0	25	35	0	7	56	0
6 Mai	33	50	0	22	35	0	8	0	0
30 Avril.....	34	0	0	26	2	0	11	3	0
25 Avril.....	34	29	0	25	39	0	8	48	0
24 Avril.....	35	19	0	27	17	0	7	54	0
20 Avril.....	36	18	0	27	30	0	10	42	0
11 Avril.....	38	30	0	20	35	0	13	48	0
10 Avril.....	38	51	0	20	18	0	11	25	0
14 Avril.....	39	30	0	21	37	0	11	30	0
Furneau.									
6 Mars 1773.....	43	56	0	136	17	0	0	55	0
Bayli.									
18 Janvier 1777.....	44	12	0	129	30	0	4	8	0
4 Février 1774.....	65	42	0	97	19	0	25	42	0
29 Janvier 1774.....	70	0	0	105	2	0	23	35	0
							Déclinaison Ouest.		
Carteret.									
27 Novembre 1767	0	14	0	115	20	0	0	12	0
Bayli.									
2 Février 1780.....	0	46	0	103	5	0	0	5	0
1 Février.....	1	0	0	103	0	0	0	19	0
2 Février.....	1	40	0	103	7	0	0	7	0
Cook.									
5 Février 1780.....	3	27	0	104	0	0	1	11	0
Wallis.									
26 Novembre 1767.....	4	10	0	172	49	0	0	0	0
Carteret.									
29 Mai 1768.....	5	29	0	107	58	0	0	56	0
En Décembre 1767.....	5	30	0	115	28	0	1	16	0
En 1768.....	5	31	0	114	52	0	1	0	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	48	0	121	50	0	0	45	0
.....	6	8	0	120	36	0	1	10	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Wallis.									
1 Décembre 1767.....	6	8	0	103	5	0	1	25	0
Bougainville.									
En 1766.....	6	25	0	114	52	0	1	28	0
.....	6	26	0	111	58	0	1	17	0
Bayli.									
16 Février 1780.....	6	36	0	102	46	0	0	54	0
Cook.									
16 Février 1780.....	6	36	0	102	46	0	0	31	0
.....	6	36	0	102	46	0	1	14	15
.....	6	36	0	102	46	0	1	31	20
Wallis.									
16 Décembre 1767.....	6	41	0	101	5	0	1	0	0
Cook.									
En Mars 1771.....	6	49	0	70	47	0	3	0	0
Bayli.									
18 Février 1780.....	7	22	0	102	46	0	0	35	0
Carteret.									
30 Septembre 1768.....	7	41	0	99	11	0	0	51	0
Bougainville.									
En 1766.....	8	35	0	98	9	0	2	3	0
Cook.									
13 Septembre 1770.....	9	45	0	123	18	0	1	10	0
Bayli.									
8 Septembre 1770.....	9	46	0	119	42	0	5	0	0
Carteret.									
2 Octobre 1768.....	10	37	0	94	54	0	2	6	0
Cook.									
26 Septembre 1770.....	10	47	0	107	43	0	3	10	0
22 Septembre.....	11	10	0	107	57	0	2	44	0
Carteret.									
4 Octobre 1768.....	12	13	0	91	31	0	3	12	0
Bayli.									
25 Février 1780.....	13	40	0	98	56	0	0	18	0
26 Février.....	13	46	0	97	25	0	0	52	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	14	40	0	91	59	0	2	50	0
Bayli.									
28 Février.....	15	45	0	95	8	0	1	51	0
Cook.									
29 Février 1780.....	15	58	0	92	35	0	2	37	10
.....	15	58	0	92	35	0	3	26	0
Cook et Bayli.									
29 Février 1780.....	15	58	0	92	35	0	3	36	40
Rosnevet.									
En 1773.....	17	28	0	47	36	0	18	31	0
Bayli.									
2 Mars 1780.....	17	53	0	87	0	0	1	34	0
3 Mars.....	18	19	0	84	58	0	2	3	0
Cook.									
3 Mars 1780.....	18	25	0	81	49	0	3	11	0
.....	18	25	0	81	49	0	3	15	40
.....	18	25	0	81	49	0	3	16	0
.....	18	25	0	81	49	0	3	22	0
Furneau.									
3 Mars 1773.....	18	25	0	81	49	0	3	51	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	34	0	79	2	0	3	55	0
Rosnevet.									
En 1773.....	18	48	0	47	53	0	19	3	0
.....	19	8	0	49	24	0	18	45	0
Bayli.									
6 Mars 1773.....	19	33	0	76	15	0	4	3	0
Bougainville.									
En 1766.....	19	45	0	59	59	0	9	40	0
.....	19	46	0	64	7	0	8	55	0
.....	19	48	0	67	48	0	4	45	0
.....	19	48	0	67	48	0	6	43	0
Carteret.									
12 Octobre 1768.....	19	50	0	74	15	0	3	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	19	52	0	54	38	0	13	22	0
.....	19	54	0	65	55	0	7	10	0
.....	20	4	0	57	8	0	11	48	0
Rosnevet.									
En 1773.....	20	21	0	53	41	0	15	30	0
.....	20	21	0	48	23	0	19	40	0
.....	20	25	0	54	9	0	13	40	0
Bayli.									
9 Mars 1780.....	20	36	0	70	5	0	5	45	0
Cook.									
12 Mars 1780.....	21	0	0	65	55	0	9	49	0
Bayli.									
11 Mars 1780.....	21	4	0	66	55	0	7	52	0
Furneau.									
12 Mars 1780.....	21	10	0	65	55	0	7	38	0
Bayli.									
12 Mars.....	21	10	0	65	55	0	8	26	20
Cook.									
12 Mars 1779.....	21	10	0	65	55	0	8	57	13
12 Mars 1780.....	21	10	0	65	55	0	9	5	0
.....	21	10	0	65	55	0	9	19	0
.....	21	10	0	65	55	0	9	26	0
Bayli.									
13 Mars 1780.....	21	31	0	62	35	0	10	11	0
Rosnevet.									
En 1773.....	21	35	0	53	54	0	17	0	0
Cook.									
14 Octobre 1768	21	47	0	70	22	0	6	26	0
Rosnevet.									
En 1773.....	21	58	0	47	12	0	19	5	0
.....	22	58	0	52	2	0	19	8	0
Cook.									
En 1771.....	23	0	0	62	35	0	10	20	0
.....	23	0	0	112	35	0	10	20	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	23	1	0	49	44	0	19	30	0
Bayli.									
15 Mars 1780.....	23	9	0	58	55	0	12	45	0
Bougainville.									
En 1766.....	23	10	0	51	58	0	17	0	0
Carterèt.									
25 Octobre 1768.....	23	23	0	61	10	0	12	29	0
24 Octobre.....	23	31	0	62	6	0	12	54	0
26 Octobre.....	23	32	0	60	18	0	13	42	0
Cook.									
En Mars 1771.....	24	0	0	119	35	0	12	20	0
.....	24	0	0	119	35	0	17	0	0
Bougainville.									
En 1766.....	24	12	0	51	0	0	18	40	0
Carteret.									
17 Octobre 1768.....	24	23	0	65	37	0	11	20	0
Rosnevet.									
En 1773.....	24	25	0	47	37	0	20	53	0
Carteret.									
28 Octobre 1768.....	24	52	0	57	49	0	16	10	0
20 Octobre.....	24	59	0	64	10	0	11	48	0
.....	24	59	0	64	10	0	12	54	0
Cook.									
17 Mars 1780.....	25	0	0	56	20	0	14	43	0
Carteret.									
18 Octobre 1768.....	25	8	0	64	56	0	11	50	0
19 Octobre.....	25	8	0	64	43	0	12	49	0
Cook.									
18 Mars 1780.....	25	9	0	56	15	0	18	59	40
.....	25	9	0	56	15	0	19	4	0
.....	25	9	0	56	15	0	18	22	20
.....	25	9	0	56	15	0	19	29	20
.....	25	9	0	56	15	0	19	36	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	25	9	0	53	28	0	18	43	0
Bayli.									
13 Janvier 1777.....	25	9	0	56	15	0	17	40	0
18 Mars 1780.....	25	9	0	56	15	0	18	8	20
.....	25	9	0	56	15	0	18	17	40
Carteret.									
30 Octobre 1768.....	25	40	0	54	25	0	18	18	0
Rosnevet.									
En 1773.....	25	56	0	46	18	0	23	30	0
.....	26	0	0	59	38	0	16	20	0
.....	26	25	0	45	16	0	24	56	0
Bayli.									
19 Mars 1780.....	26	29	0	52	23	0	17	35	0
Cook.									
31 Octobre 1777.....	26	31	0	52	24	0	18	24	0
Carteret.									
1 Novembre 1768.....	27	5	0	50	27	0	20	12	0
.....	27	5	0	50	27	0	20	20	0
Bougainville.									
En 1766.....	27	16	0	44	30	0	21	40	0
Rosnevet.									
En 1773.....	27	28	0	44	39	0	22	15	0
Carteret.									
3 Novembre 1768.....	27	40	0	48	30	0	20	58	0
.....	27	40	0	48	30	0	21	33	0
4 Novembre.....	27	42	0	47	55	0	21	15	0
5 Novembre.....	27	44	0	46	36	0	21	9	0
Bayli.									
21 Mars 1780.....	27	51	0	48	24	0	21	28	0
Cook.									
En Mars 1771.....	28	0	0	133	55	0	24	20	0
Rosnevet.									
En 1773.....	28	15	0	47	10	0	26	28	0
.....	28	30	0	59	55	0	17	16	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
6 Novembre 1768....	28	58	0	43	58	0	22	38	0
Cook.									
En 1771.....	29	0	0	40	35	0	26	0	0
Cook et Bayli.									
En Mars 1771.....	29	0	0	134	35	0	26	10	0
Bayli.									
23 Mars 1780.....	29	3	0	41	21	0	26	2	0
24 Mars.....	29	33	0	38	29	0	25	35	0
.....	29	40	0	41	5	0	26	34	0
.....	29	40	0	41	5	0	30	28	0
Cook.									
24 Mars 1780.....	29	40	0	41	5	0	25	35	40
28 Mars.....	29	40	0	41	5	0	26	16	0
24 Mars.....	29	40	0	41	5	0	27	21	42
.....	29	40	0	41	5	0	27	38	40
.....	29	40	0	41	5	0	31	24	40
Cook et Bayli.									
24 Mars 1780.....	29	40	0	41	5	0	25	17	0
Rosnevet.									
En 1773.....	29	42	0	40	45	0	25	30	0
Carteret.									
7 Novembre 1768.....	29	59	0	41	30	0	24	40	0
.....	29	59	0	41	30	0	24	55	0
10 Novembre.....	30	12	0	40	26	0	25	39	0
Bayli.									
24 Mars 1780.....	30	12	0	40	26	0	25	39	0
Carteret.									
9 Novembre 1768.....	30	19	0	39	12	0	25	50	0
Rosnevet.									
En 1773.....	30	31	0	40	14	0	26	10	0
Carteret.									
10 Novembre 1768.....	30	37	0	38	23	0	25	32	0
Bougainville.									
En 1766.....	30	41	0	35	30	0	25	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	30	44	0	61	40	0	20	40	0
Bayli.									
26 Mars 1780.....	30	56	0	34	55	0	26	28	0
30 Mars.....	31	12	0	29	35	0	27	8	0
.....	31	12	0	29	35	0	27	12	40
.....	31	12	0	29	35	0	27	16	0
Cook.									
30 Mars 1780.....	31	12	0	29	35	0	25	34	20
.....	31	12	0	29	35	0	26	15	50
Cook et Bayli.									
30 Mars 1780.....	31	12	0	29	35	0	25	40	0
.....	31	12	0	29	35	0	26	14	0
Bayli.									
20 Mars 1780.....	31	18	0	29	54	0	24	53	0
28 Mars.....	31	34	0	31	55	0	26	18	0
Carteret.									
13 Novembre 1768....	32	2	0	36	22	0	25	8	0
Rosnevet.									
En 1773.....	32	8	0	38	30	0	25	57	0
Carteret.									
12 Novembre 1768....	32	29	0	34	52	0	25	2	0
Bougainville.									
En 1766.....	32	41	0	29	14	0	23	41	0
Bayli.									
1 Avril 1780.....	33	18	0	26	29	0	25	44	0
Carteret.									
13 Novembre 1768.....	33	21	0	33	2	0	25	5	0
Bayli.									
2 Avril 1780.....	33	41	0	26	1	0	24	50	0
Rosnevet.									
En 1773.....	33	54	0	39	59	0	29	0	0
Cook.									
En 1771.....	34	0	0	24	35	0	28	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	34	6	0	41	42	0	27	30	0
.....	34	28	0	37	7	0	23	15	0
Bougainville.									
En 1766.....	34	32	0	22	18	0	21	30	0
Rosnevet.									
En 1773.....	34	46	0	39	53	0	27	5	0
Carteret.									
24 Novembre 1768....	34	52	0	22	35	0	21	44	0
.....	34	57	0	23	21	0	21	39	0
Rosnevet.									
En 1773.....	35	0	0	33	11	0	27	7	0
.....	35	4	0	35	3	0	27	18	0
Carteret.									
22 Novembre 1768.....	35	4	0	24	4	0	22	50	0
Rosnevet.									
En 1773.....	35	6	0	36	43	0	27	40	0
Carteret.									
19 Novembre 1768.....	35	17	0	26	13	0	22	32	0
Rosnevet.									
En 1773.....	35	19	0	22	15	0	23	0	0
Bayli.									
3 Avril 1780.....	35	19	0	21	46	0	24	21	0
Bougainville.									
En 1766.....	35	27	0	19	55	0	21	10	0
Cook.									
En 1771.....	35	30	0	20	35	0	24	0	0
Bougainville.									
En 1766.....	34	31	0	24	38	0	22	20	0
Carteret.									
20 Novembre 1768....	35	42	0	24	57	0	22	46	0
21 Novembre 1768....	35	46	0	24	35	0	22	18	0
Bayli.									
5 Avril 1780.....	35	56	0	19	21	0	23	58	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Rosnevet.									
En 1773.....	36	4	0	21	10	0	23	30	0
.....	36	8	0	62	1	0	24	0	0
.....	36	25	0	21	44	0	24	30	0
.....	37	58	0	39	18	0	26	15	0
Cook.									
1 Janvier 1773	38	14	0	61	47	0	24	14	0
5 Décembre 1776.....	38	52	0	20	55	0	23	32	30
.....	38	52	0	20	55	0	24	9	15
.....	38	52	0	20	55	0	23	36	0
.....	38	52	0	20	55	0	21	42	0
.....	38	52	0	20	55	0	22	12	45
Cook et Bayli.									
5 Décembre 1776.....	38	52	0	20	45	0	26	2	30
Bayli.									
5 Décembre 1776.....	39	10	0	21	4	0	23	14	0
Rosnevet.									
En 1773.....	39	24	0	62	40	0	25	0	0
.....	40	25	0	38	36	0	26	30	0
.....	40	28	0	64	36	0	24	30	0
.....	40	40	0	66	12	0	24	22	0
Cook.									
11 Mars 1775.....	40	56	0	21	22	0	20	48	0
10 Mars.....	42	6	0	22	15	0	21	33	0
Rosnevet.									
En 1773.....	43	43	0	66	4	0	27	30	0
.....	43	58	0	38	11	0	26	30	0
Bayli,									
16 Mars 1773.....	44	1	0	132	50	0	0	47	30
Furneau.									
1 Mars 1773.....	44	1	0	132	50	0	1	30	0
Cook.									
10 Décembre 1776.....	44	8	0	30	15	0	23	35	0
.....	44	8	0	30	15	0	23	56	0
.....	44	8	0	30	15	0	24	44	47

10 Décembre

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
10 Décembre 1776.....	44	8	0	30	15	0	24	46	0
Cook et Bayli.									
10 Décembre 1776.....	44	8	0	30	15	0	25	30	0
.....	44	8	0	30	15	0	25	56	0
Bayli.									
10 Décembre 1776.....	44	8	0	30	15	0	24	30	30
.....	44	8	0	30	15	0	24	54	0
Cook & Bayli.									
17 Janvier 1777.....	44	14	0	126	14	0	6	32	0
Furneau.									
17 Janvier 1777	44	18	0	125	23	0	6	51	15
18 Janvier.....	44	18	0	129	55	0	7	21	0
Cook.									
18 Janvier 1777.....	44	18	0	129	55	0	6	20	30
.....	44	18	0	129	55	0	5	36	3
.....	44	18	0	125	23	0	8	41	36
.....	44	18	0	125	23	0	9	23	50
.....	44	18	0	125	23	0	9	26	45
.....	44	18	0	125	23	0	10	2	20
Bayli.									
18 Janvier 1777.....	44	18	0	129	55	0	4	7	40
.....	44	18	0	129	55	0	5	34	10
.....	44	18	0	125	23	0	7	41	36
10 Décembre 1776.....	44	23	0	29	57	0	26	35	0
Furneau.									
4 Mars 1773.....	44	50	0	129	55	0	3	50	0
Cook.									
3 Mars 1775.....	45	8	0	28	25	0	22	26	0
Rosnevet.									
En 1773.....	46	12	0	41	39	0	29	5	0
Cook.									
14 Janvier 1777.....	46	15	0	112	25	0	14	48	30
.....	46	15	0	112	25	0	15	51	30
.....	46	15	0	112	25	0	15	54	20
14 Janvier 1771.....	46	15	0	112	25	0	16	50	18

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
14 Janvier 1777.....	46	15	0	112	25	0	17	12	10
14 Janvier 1771.....	46	15	0	112	25	0	18	55	0
Furneau.									
3 Mars 1773.....	46	22	0	127	56	0	6	35	0
Cook.									
12 Décembre 1776.....	46	37	0	35	25	0	22	30	0
.....	46	37	0	35	25	0	26	0	29
.....	46	37	0	35	25	0	26	18	0
13 Octobre.....	46	37	0	35	25	0	27	19	0
.....	46	37	0	35	25	0	28	27	0
Cook et Bayli.									
12 Décembre 1776.....	46	37	0	35	25	0	25	24	30
.....	46	37	0	35	25	0	25	43	0
.....	46	37	0	35	25	0	26	9	30
.....	46	37	0	35	25	0	26	12	0
Cook.									
1 Mars 1775	46	44	0	29	55	0	23	36	0
8 Janvier 1777.....	47	18	0	97	51	0	25	30	0
Cook et Bayli.									
8 Janvier 1777	47	18	0	97	51	0	25	10	0
.....	47	18	0	97	51	0	25	29	0
Bayli.									
8 Janvier 1777.....	47	18	0	97	51	0	25	45	0
Rosnevet.									
En 1773.....	47	21	0	65	11	0	31	0	0
Bayli.									
13 Janvier 1777.....	47	25	0	110	40	0	17	21	0
.....	47	29	0	107	55	0	18	16	30
Cook.									
13 Janvier 1779.....	47	29	0	107	55	0	18	18	21
.....	47	29	0	107	55	0	18	30	20
.....	47	29	0	107	55	0	18	46	35
14 Octobre 1777.....	47	56	0	42	2	0	30	36	45
14 Décembre 1776.....	47	56	0	42	2	0	31	7	45
.....	47	56	0	42	2	0	31	40	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
14 Décembre 1776.....	47	56	0	42	2	0	31	31	0
Furneau.									
14 Octobre 1776.....	47	56	0	42	2	0	30	48	15
.....	47	56	0	42	2	0	30	59	45
Bayli.									
14 Octobre 1776.....	47	56	0	42	2	0	30	23	0
14 Décembre.....	47	56	0	42	2	0	32	18	15
Cook et Bayli.									
14 Octobre 1776.....	47	56	0	42	4	0	30	45	0
Rosnevet.									
En 1773.....	47	58	0	64	33	0	30	53	0
Bayli.									
14 Décembre 1776.....	48	0	0	42	19	0	29	11	0
Rosnevet.									
En 1773.....	48	6	0	64	57	0	31	0	0
Bayli.									
6 Février 1773.....	48	6	0	56	18	0	32	24	0
Cook.									
9 Janvier 1777.....	48	13	0	100	48	0	24	7	20
Cook.									
3 Janvier 1777.....	48	16	0	83	5	0	30	33	49
.....	48	16	0	83	5	0	31	44	0
Bayli.									
31 Décembre 1776.....	48	16	0	83	5	0	32	17	0
3 Janvier 1777.....	48	16	0	83	5	0	29	37	0
.....	48	16	0	83	5	0	29	59	0
.....	48	16	0	83	5	0	30	8	15
.....	48	16	0	83	5	0	31	44	0
10 Janvier 1771.....	48	17	0	103	54	0	20	59	0
Rosnevet.									
En 1773.....	48	18	0	65	5	0	31	30	0
Bayli.									
1 Janvier 1777.....	48	20	0	77	35	0	28	52	0
Cook.									
10 Janvier 1777.....	48	26	0	104	35	0	23	26	25

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
10 Janvier 1777.....	48	26	0	104	35	0	23	38	40
Rosnevet.									
En 1773.....	48	29	0	65	9	0	31	30	0
Cook et Bayli.									
1 Janvier 1777.....	48	30	0	76	44	0	26	9	0
Bayli.									
4 Janvier 1777.....	48	30	0	81	55	0	28	2	0
1 Février 1773.....	48	30	0	55	42	0	29	3	0
.....	48	31	0	76	44	0	29	26	0
Furneau.									
1 Janvier 1777.....	48	31	0	76	44	0	30	53	0
Cook.									
1 Janvier 1777.....	48	31	0	76	44	0	28	49	0
2 Février 1773.....	48	36	0	57	10	0	27	50	0
Bayli.									
24 Décembre 1776.....	48	37	0	66	27	0	31	51	0
27 Octobre 1776.....	48	41	0	66	45	0	27	15	0
27 Décembre.....	48	41	0	66	28	0	29	32	0
31 Octobre.....	48	41	0	74	34	0	29	45	0
27 Octobre.....	48	41	0	66	28	0	30	28	0
27 Décembre.....	48	41	0	66	28	0	30	34	30
Cook.									
27 Octobre 1776.....	48	41	0	66	45	0	27	39	0
.....	48	41	0	66	45	0	27	40	0
27 Décembre.....	48	41	0	66	45	0	27	43	50
31 Décembre.....	48	41	0	74	34	0	30	39	0
.....	48	41	0	74	34	0	31	33	0
Cook et Bayli.									
28 Octobre 1776.....	48	41	0	66	45	0	28	4	0
.....	48	41	0	66	45	0	28	5	0
27 Octobre.....	48	41	0	66	28	0	30	43	0
Cook.									
7 Février 1773.....	48	51	0	48	51	0	31	28	0
Rosnevet.									
En 1773.....	48	53	0	59	43	0	32	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Furneau.									
1 Mars 1773.....	49	4	0	122	35	0	10	20	0
Bayli.									
5 Février 1773.....	49	8	0	55	53	0	30	26	0
Rosnevet.									
En 1773.....	49	11	0	43	52	0	30	0	0
Cook.									
4 Février 1777.....	49	16	0	56	29	0	28	50	0
Rosnevet.									
En 1773.....	49	36	0	55	4	0	31	0	0
Bayli.									
10 Février 1773.....	50	7	0	62	28	0	29	4	0
Furneau.									
28 Février 1773.....	50	20	0	119	24	0	15	47	0
31 Janvier.....	50	50	0	54	23	0	30	49	0
Cook.									
10 Décembre 1772.....	51	4	0	17	58	0	16	29	0
Furneau.									
13 Février 1773.....	51	5	0	68	58	0	32	30	0
26 Février.....	51	22	0	113	7	0	21	30	0
13 Février.....	51	40	0	72	27	0	34	14	0
Cook.									
11 Décembre 1772.....	51	51	0	18	38	0	17	9	0
Furneau.									
15 Février 1773.....	52	12	0	76	11	0	35	0	7
23 Février.....	52	18	0	101	49	0	25	2	0
21 Février.....	52	20	0	107	35	0	29	5	0
20 Février.....	52	22	0	94	43	0	30	46	0
Bayli.									
12 Février 1773.....	52	48	0	68	10	0	32	5	0
Cook.									
21 Décembre 1772.....	53	50	0	26	59	0	21	47	0
13 Février 1773.....	53	54	0	69	59	0	33	8	0
19 Décembre 1772.....	54	17	0	22	54	0	21	26	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
23 Janvier 1773.....	54	28	0	49	21	0	30	0	0
Cook.									
17 Décembre 1772.....	55	16	0	20	49	0	20	50	0
14 Février 1773	55	23	0	72	23	0	34	18	0
Bayli.									
27 Janvier 1773.....	56	28	0	48	22	0	32	23	0
Cook.									
15 Février 1773	56	52	0	76	23	0	38	19	0
18 Février.....	57	57	0	81	19	0	38	21	0
11 Mars.....	58	7	0	127	55	0	11	57	0
24 Janvier.....	58	24	0	46	40	0	33	52	0
28 Décembre 1772.....	58	44	0	19	30	0	19	30	0
20 Février.....	58	47	0	89	19	0	40	11	30
12 Mars 1773.....	58	56	0	129	16	0	9	49	0
22 Février.....	59	35	0	91	11	0	40	51	0
8 Mars.....	59	44	0	118	42	0	28	35	0
6 Mars.....	60	4	0	115	35	0	31	30	0
23 Janvier.....	60	4	0	44	20	0	33	28	0
3 Mars.....	60	17	0	107	34	0	39	4	0
25 Février.....	60	49	0	92	50	0	43	6	0
Cook.									
9 Janvier 1773	61	36	0	32	38	0	27	42	0
21 Janvier.....	62	48	0	39	0	0	31	16	0
Bayli.									
11 Janvier 1773.....	63	12	0	35	4	0	27	15	0
Cook.									
14 Janvier 1773.....	63	57	0	37	13	0	28	27	0
Bayli.									
17 Janvier 1773.....	67	15	0	37	10	0	29	30	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER PACIFIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
22 Décembre 1777.....	0	24	0	200	35	0	6	8	0
.....	0	29	0	200	9	0	6	10	45
Cook.									
22 Décembre 1777.....	0	29	0	200	9	0	6	31	20
.....	0	29	0	200	9	0	6	31	30
.....	0	29	0	200	9	0	6	39	11
Cook et Bayli.									
22 Décembre 1777.....	0	29	0	200	9	0	6	47	0
.....	0	29	0	200	9	0	7	8	20
Cook.									
23 Décembre 1777.....	1	1	0	200	6	0	6	20	0
.....	1	1	0	200	16	0	6	20	15
.....	1	1	0	200	6	0	7	11	20
Bayli.									
23 Décembre 1777.....	1	1	0	200	6	0	4	42	40
.....	1	1	0	200	6	0	6	55	10
.....	1	1	0	200	6	0	6	59	30
24 Décembre 1777.....	1	52	0	200	0	0	5	18	0
27 Décembre	1	55	0	200	1	0	6	26	0
.....	1	55	0	200	1	0	7	32	40
Cook.									
23 Décembre.....	1	55	0	200	1	0	6	21	40
27 Décembre	1	55	0	200	1	0	6	27	20
.....	1	55	0	200	1	0	7	11	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
27 Décembre	1	55	0	200	1	0	7	29	40
Bayli.									
En Décembre 1777.....	1	56	0	200	2	30	5	34	48
Cook.									
27 Décembre 1777.....	1	56	45	200	2	30	6	19	22
26 Décembre.....	1	57	0	200	5	0	5	50	0
.....	1	57	0	200	5	0	6	6	0
Bayli.									
25 Décembre.....	1	57	0	200	0	0	5	18	0
26 Décembre	1	57	0	200	5	0	5	22	0
27 Décembre	1	58	0	200	4	0	4	58	0
.....	1	58	0	200	4	0	6	29	0
Cook.									
27 Décembre 1777.....	1	58	0	200	4	0	5	36	10
.....	1	58	0	155	6	0	5	44	40
17 Octobre 1779	1	58	0	200	4	0	6	18	40
Cook & Bayli.									
27 Décembre 1777.....	1	58	0	200	4	0	5	17	0
Bayli.									
5 Janvier 1778.....	5	35	0	200	35	0	5	24	40
Cook.									
5 Janvier 1778	5	35	0	200	35	0	6	11	30
.....	5	35	0	200	35	0	5	48	20
.....	5	35	0	200	35	0	6	8	30
.....	5	35	0	200	10	0	6	22	0
.....	5	35	0	200	35	0	5	46	40
Bayli.									
5 Janvier 1779.....	5	36	0	200	15	0	6	25	0
7 Janvier 1778.....	7	33	0	202	5	0	5	51	0
.....	7	40	0	202	25	0	6	38	50
.....	7	40	0	202	25	0	6	39	10
.....	7	40	0	202	25	0	6	53	0
Cook.									
7 Janvier 1778.....	7	40	0	202	25	0	6	31	50
.....	7	40	0	202	15	0	6	46	17

7 Janvier

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
7 Janvier 1778.....	7	40	0	202	25	0	6	50	10
8 Janvier.....	7	48	0	202	49	0	6	33	0
.....	7	48	0	202	49	0	6	34	50
.....	7	48	0	202	39	0	6	47	33
.....	7	48	0	202	49	0	6	49	50
Bayli.									
8 Janvier 1778.....	7	48	0	202	59	0	5	54	0
.....	7	48	0	202	49	0	6	38	50
.....	7	48	0	202	39	0	7	55	10
.....	7	59	0	202	20	0	5	26	0
10 Janvier.....	9	42	0	202	15	0	5	10	0
.....	9	42	0	202	15	0	5	25	30
Cook.									
10 Janvier 1778.....	9	42	0	202	15	0	5	41	0
11 Janvier 1779.....	12	0	0	201	56	0	6	24	40
.....	12	0	0	201	56	0	7	0	7
.....	12	0	0	201	56	0	7	27	0
Cook et Bayli.									
11 Janvier 1778.....	12	0	0	201	56	0	7	18	13
Bayli.									
11 Janvier 1778.....	12	0	0	201	56	0	6	56	0
.....	12	0	0	201	56	0	7	36	0
Marion et Crozet.									
En Septembre 1772.....	13	26	0	141	30	0	7	0	0
Cook et Bayli.									
12 Janvier 1778.....	13	55	0	200	41	0	7	3	0
Cook.									
12 Janvier 1778.....	13	55	0	200	41	0	5	56	40
.....	13	55	0	200	41	0	6	27	2
Bayli.									
12 Janvier 1778.....	13	55	0	200	41	0	5	55	0
.....	13	55	0	200	41	0	6	53	30
Wallis.									
17 Octobre 1767.....	16	10	0	141	10	0	5	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Marion et Crozet.									
En 1772.....	18	0	0	176	43	0	10	0	0
Cook.									
15 Janvier 1778.....	18	1	0	198	50	0	8	33	40
.....	18	1	0	198	50	0	8	47	30
.....	18	1	0	198	50	0	10	10	20
.....	18	1	0	198	50	0	10	29	10
.....	18	1	0	198	50	0	10	37	0
Cook et Bayli.									
15 Janvier 1778.....	18	1	0	198	50	0	8	54	20
Bayli.									
15 Janvier 1778.....	18	1	0	198	40	0	6	59	0
.....	18	1	0	198	40	0	9	0	0
Cook.									
15 Janvier 1778.....	18	19	30	198	48	0	9	21	27
18 Juin 1779.....	18	38	0	198	46	0	8	28	30
7 Avril.....	18	38	0	198	46	0	8	55	30
.....	18	38	0	198	46	0	8	56	30
15 Janvier 1778.....	18	38	0	198	46	0	9	59	20
Bayli.									
15 Janvier 1778.....	18	38	0	198	46	0	9	26	0
.....	18	42	0	198	31	0	8	17	0
.....	18	42	0	198	33	0	8	22	30
.....	18	42	0	198	35	0	8	28	0
10 Janvier 1779.....	18	46	0	202	2	0	7	34	0
Cook.									
6 Janvier 1779.....	18	57	0	201	50	0	10	11	0
Bayli.									
6 & 8 Janvier 1779.....	18	58	0	201	35	30	9	44	30
13 Janvier 1779.....	19	3	0	201	47	0	10	16	0
5 Janvier 1778.....	19	5	0	202	36	0	7	47	0
27 Décembre.....	19	15	0	202	26	0	7	16	55
....	19	15	0	202	26	0	7	49	10
Cook et Bayli.									
27 Décembre.....	19	15	0	202	26	0	7	1	10

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
27 Décembre.....	19	15	0	202	26	0	7	20	15
Cook.									
27 Décembre 1778.....	19	15	0	202	26	0	7	31	5
.....	19	15	0	202	26	0	7	31	15
1 Janvier 1779.....	19	20	30	202	27	0	7	10	52
Bayli.									
4 Janvier 1778.....	19	25	0	203	33	0	7	47	0
6 Janvier 1779.....	19	25	0	201	25	0	10	3	0
1 Janvier.....	19	26	0	202	28	0	6	37	0
.....	19	26	0	202	28	0	7	17	5
.....	19	26	0	202	28	0	7	36	15
.....	19	26	0	202	28	0	7	49	15
Cook et Bayli.									
1 Janvier 1779.....	19	26	0	202	28	0	5	31	0
Cook.									
1 Janvier 1779.....	19	26	0	202	28	0	6	50	10
Bayli.									
4 Janvier 1778.....	19	29	0	203	35	0	7	45	0
.....	19	29	30	203	15	0	7	46	20
26 Mars 1779.....	19	49	0	180	24	0	12	22	0
.....	19	49	0	180	24	0	12	52	0
.....	19	49	0	180	24	0	12	56	0
Cook.									
26 Mars 1779.....	19	49	0	180	24	0	12	44	0
.....	19	50	0	180	10	0	12	7	40
27 Mars.....	19	51	0	179	56	0	10	59	0
Cook et Bayli.									
27 Mars.....	19	51	0	179	56	0	11	54	0
Bayli.									
27 Mars 1779.....	19	51	0	179	56	0	11	33	0
23 Mars.....	19	52	0	186	17	0	11	32	0
25 Mars.....	19	52	0	179	2	0	11	49	0
Cook.									
24 Mars 1779.....	19	54	0	183	20	0	10	51	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
24 Mars.....	19	57	0	183	20	0	11	17	0
23 Mars.....	19	57	0	183	31	0	11	37	30
.....	19	57	0	183	31	0	12	32	0
24 Mars.....	19	57	0	183	20	0	10	46	0
Cook.									
28 Mars 1779.....	19	57	0	183	31	0	11	9	0
23 Mars.....	19	57	0	183	25	0	11	33	12
24 Mars.....	19	57	0	183	20	0	11	23	0
.....	19	57	0	183	20	0	11	35	0
23 Mars.....	19	57	0	193	31	0	11	57	0
.....	19	57	0	193	31	0	12	1	0
Bayli.									
24 Mars 1779.....	19	59	0	183	45	0	11	48	0
1 Janvier 1779.....	20	0	0	204	20	0	8	27	0
27 Mars.....	20	2	0	178	24	0	12	3	0
3 Janvier 1778.....	20	3	0	204	11	0	7	57	0
16 Janvier.....	20	4	0	198	25	0	9	1	0
Cook.									
29 Novembre 1778.....	20	4	0	201	56	0	8	32	0
Bayli.									
3 & 29 Novembre 1778	20	4	30	202	4	0	8	22	30
Cook et Bayli.									
30 Novembre 1778....	20	5	0	202	12	0	8	13	0
Bayli.									
1, 2 & 3 Janvier 1779.	20	6	15	204	16	30	8	13	30
1 Janvier.....	20	9	0	204	20	0	8	18	0
Cook et Bayli.									
2 Janvier 1779.....	20	13	0	204	11	0	8	12	0
Bayli.									
28 Mars 1778.....	20	15	0	178	5	0	11	28	0
21 Mars 1779.....	20	32	0	189	47	0	10	41	0
.....	20	34	0	189	33	0	11	43	0
Cook.									
21 Mars 1779.....	20	34	0	189	33	0	10	54	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
21 Mars 1779.....	20	34	0	189	33	0	11	12	0
.....	20	34	0	189	33	0	11	25	25
Cook et Bayli.									
21 Mars 1779.....	20	34	0	189	33	0	11	20	0
.....	20	34	0	189	33	0	11	54	0
Bayli.									
24 Février 1779.....	20	36	0	200	43	0	9	13	0
31 Mars.....	20	38	0	177	35	0	12	22	0
2 Mars.....	20	41	0	190	23	0	10	41	0
Cook.									
20 Mars 1779.....	20	41	0	190	23	0	10	59	0
20 Mars.....	20	41	0	190	23	0	11	0	20
.....	20	41	0	190	23	0	11	15	0
Bayli.									
19 Mars 1779.....	20	56	0	191	47	0	10	37	0
25 Février.....	21	3	0	200	33	0	8	59	0
Cook et Bayli.									
27 Janvier 1778.....	21	7	0	198	10	0	9	24	0
Cook.									
17 Janvier 1778.....	21	8	0	198	24	0	9	41	40
.....	21	8	0	198	24	0	9	51	38
.....	21	8	0	198	24	0	10	9	50
.....	21	8	0	198	24	0	10	10	30
Bayli.									
17 Janvier 1778.....	21	8	0	198	24	0	9	1	5
17 Juin.....	21	8	0	198	24	0	9	39	5
17 Janvier 1778.....	21	8	0	199	24	0	10	27	40
18 Mars 1779.....	21	12	0	192	43	0	9	26	0
18 Avril.....	21	12	0	192	43	0	9	32	0
Cook et Bayli.									
18 Mars 1779.....	21	12	0	192	43	0	8	12	0
.....	21	12	0	192	43	0	8	53	0
.....	21	12	0	192	43	0	10	19	0
Cook.									
18 Mars 1779.....	21	12	0	192	43	0	8	36	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
18 Mars 1779.....	21	12	0	192	43	0	9	9	40
17 Mars.....	21	13	0	194	17	0	10	3	40
Bayli et Cook.									
17 Mars 1779.....	21	13	0	194	17	0	10	20	0
.....	21	13	0	194	17	0	10	24	0
Bayli.									
17 Mars 1779.....	21	13	0	194	17	0	9	20	0
.....	21	13	0	156	43	0	9	45	0
18 Mars.....	21	13	0	192	45	0	9	51	0
17 Mars.....	21	13	0	194	17	0	10	16	0
29 Novembre 1778.....	21	16	0	201	55	0	8	4	40
.....	21	16	0	201	55	0	9	12	0
.....	21	16	0	201	55	0	9	18	35
.....	21	16	0	201	55	0	10	0	0
17 Mars 1779.....	21	16	0	194	23	0	10	39	0
14 Novembre 1778.....	21	16	0	201	55	0	12	23	0
.....	21	16	0	201	55	0	12	52	0
.....	21	16	0	201	55	0	13	30	0
.....	21	16	0	201	55	0	13	34	40
Cook.									
29 Novembre 1778	21	16	0	201	55	0	8	44	10
.....	21	16	0	201	55	0	9	14	42
.....	21	16	0	201	55	0	10	7	40
14 Novembre 1778	21	16	0	201	55	0	13	3	58
Bayli.									
17 & 18 Janvier 1778...	21	20	30	198	10	0	9	29	30
27 Janvier.....	21	22	0	197	39	0	9	13	0
.....	21	22	0	197	39	0	10	16	0
Cook et Bayli.									
27 Janvier 1778	21	22	0	197	39	0	9	23	10
.....	21	22	0	197	39	0	10	20	0
Cook.									
27 Janvier 1778	21	22	0	197	49	0	8	39	30
.....	21	22	0	197	39	0	8	49	50

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
25 Janvier 1778.....	21	26	0	197	35	0	9	21	0
16 Mars 1779	21	26	0	196	16	0	10	3	0
Cook.									
27 & 28 Janvier 1778...	21	29	0	197	35	0	10	9	53
Bayli.									
18 Janvier 1778.....	21	34	0	197	50	0	9	35	0
25, 26 & 28 Janvier 1778.	21	35	20	197	35	0	9	16	40
26 Janvier.....	21	36	0	197	35	0	9	37	0
28 Janvier.....	21	36	0	197	32	0	10	40	0
.....	21	36	0	197	32	0	11	38	10
.....	21	36	0	197	32	0	12	6	10
Cook.									
28 Janvier 1778.....	21	36	0	197	32	0	11	4	20
17 Août 1779.....	21	42	0	165	39	0	9	47	0
20 Janvier.....	21	44	0	197	35	0	8	52	0
12 Mars 1779.....	21	49	0	197	3	0	10	54	0
.....	21	49	0	197	3	0	10	59	0
.....	21	49	0	197	7	0	11	24	0
Cook.									
12 Mars 1779.....	21	49	0	197	3	0	11	10	0
20 Mars.....	21	49	0	197	3	0	11	22	0
12 Mars.....	21	49	0	197	3	0	12	7	0
Bayli.									
12 Mars 1779.....	21	49	0	197	3	0	10	50	0
Cook.									
12 Mars 1779.....	21	49	30	197	3	0	11	14	0
19 Janvier 1778.....	21	54	0	197	47	0	8	46	0
23 Janvier 1779.....	21	56	0	197	47	0	8	28	30
19 Janvier 1778.....	21	56	0	197	45	0	8	52	0
23 Janvier.....	21	56	0	197	57	0	11	35	40
Cook et Bayli.									
13 Janvier 1778.....	21	56	0	197	47	0	8	11	0
Bayli.									
23 Janvier 1778.....	21	56	0	197	47	0	8	20	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
19 & 23 Janvier 1778...	21	56	30	197	55	0	9	53	9
19 Janvier.....	21	57	0	198	3	0	10	11	40
5 Mars 1779.....	21	57	0	197	36	0	10	14	0
19 Janvier 1778.....	21	57	0	198	3	0	11	9	0
.....	21	57	0	198	3	0	11	16	0
Bayli.									
5 Mars 1779.....	21	57	0	197	36	0	10	26	0
19 Janvier 1778.....	21	57	0	198	3	0	10	11	40
5 Mars 1779.....	21	57	0	197	36	0	10	15	0
.....	21	57	0	197	36	0	10	32	0
.....	21	57	0	197	36	0	10	28	10
.....	21	57	0	197	36	0	10	40	0
.....	21	57	0	197	36	0	10	42	0
28 Février.....	21	59	0	198	9	0	10	25	0
27 Février 1779.....	22	13	0	199	29	0	10	46	0
Cook.									
19 Novembre 1779....	22	14	0	128	41	0	0	41	27
1 Avril 1779.....	22	23	0	177	6	0	11	9	0
.....	22	23	0	177	6	0	11	21	30
.....	22	23	0	177	6	0	11	33	40
15 & 16 Novembre 1778	22	25	0	201	55	0	11	56	30
Bayli.									
3 Février 1778.....	22	47	0	197	35	0	9	26	0
Cook et Bayli.									
15 Novembre 1778....	22	55	0	201	55	0	11	53	0
Cook.									
15 Novembre 1778.....	22	55	0	201	55	0	12	0	0
3 Février 1778.....	24	13	0	197	25	0	11	4	7
.....	24	13	0	197	25	0	11	35	40
Bayli.									
3 Février 1778.....	24	13	0	196	45	0	9	44	0
.....	24	13	0	197	25	0	10	14	0
.....	24	13	0	197	12	0	11	30	50
.....	24	13	0	197	25	0	10	18	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
3 Février 1778.....	24	13	0	197	25	0	11	20	50
Bayli.									
3 & 4 Février 1778....	24	30	30	196	44	30	9	35	0
14 Novembre 1779....	24	34	0	139	37	0	3	14	0
Cook.									
13 Novembre 1779....	24	42	0	140	42	0	2	26	0
.....	24	42	0	140	42	0	2	36	0
.....	24	42	0	140	42	0	3	9	50
.....	24	42	0	140	42	0	3	12	0
Bayli.									
13 Novembre 1779.....	24	42	0	140	42	0	2	29	0
.....	24	42	0	140	42	0	2	31	0
.....	24	42	0	140	42	0	2	51	33
.....	24	42	0	140	42	0	3	36	20
.....	24	43	0	140	5	0	3	25	0
Bayli.									
4 Février 1778.....	24	48	0	196	44	0	9	26	0
Cook et Bayli.									
4 Février 1778.....	24	50	0	197	12	0	11	49	50
Cook.									
4 Février 1778.....	24	50	0	197	12	0	12	17	30
.....	24	50	0	197	12	0	12	41	52
.....	24	50	0	197	12	0	13	15	10
Bayli.									
17 Février 1778.....	24	50	0	197	12	0	12	49	40
6 Février.....	24	50	0	197	12	0	13	34	30
14 Novembre 1779.....	24	51	0	139	13	0	3	49	0
3 Avril.....	24	51	0	173	1	0	12	55	0
16 Novembre.....	24	57	30	136	18	0	2	29	30
15 Novembre.....	25	6	0	138	41	0	2	35	0
13 Novembre.....	25	35	0	140	42	0	4	39	0
12 Novembre.....	26	17	0	141	46	0	3	16	20
.....	26	17	0	141	46	0	4	12	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
5 Novembre 1779.....	26	17	0	141	46	0	3	40	0
12 Novembre.....	26	17	0	141	45	0	3	44	10
Bayli.									
6 Février 1778.....	28	35	0	197	26	0	11	39	0
.....	28	39	0	197	44	0	11	29	40
.....	28	39	0	197	44	0	13	40	0
Cook et Bayli.									
6 Février 1778.....	28	39	0	197	44	0	11	50	0
Cook.									
6 Février 1778.....	28	39	0	197	44	0	12	1	45
.....	28	39	0	197	44	0	12	10	19
.....	28	39	0	197	44	0	12	13	10
Bayli.									
7 Avril 1779.....	30	8	0	165	56	0	10	15	0
.....	30	8	0	165	56	0	10	16	0
9 Avril.....	30	27	0	165	54	0	11	0	0
7 Avril.....	30	30	0	165	51	0	8	3	20
.....	30	30	0	165	51	0	9	2	0
.....	30	30	0	165	51	0	9	5	0
Cook.									
7 Avril 1779.....	30	30	0	165	51	0	8	52	0
.....	30	30	0	165	51	0	8	56	50
.....	30	30	0	165	51	0	9	16	4
Cook et Bayli.									
7 Avril 1779.....	30	30	0	165	51	0	9	22	0
Bayli.									
8 Avril 1779.....	30	51	0	164	36	0	10	3	0
8 Février.....	30	53	0	199	8	0	12	28	0
27 Juin.....	30	55	0	199	52	0	13	29	0
8 Février 1778.....	30	55	0	199	42	0	14	39	40
.....	30	55	0	199	42	0	14	13	50
Cook.									
8 Février 1778.....	30	55	0	199	52	0	13	29	0
8 & 9 Février	30	55	0	199	42	0	14	25	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
8 & 9 Février	30	59	45	199	51	0	14	1	18
9 Février.....	31	4	0	200	0	0	13	22	10
.....	31	4	0	200	0	0	14	32	5
.....	31	4	0	200	0	0	14	36	45
Bayli.									
9 Février.....	31	4	0	200	0	0	13	30	30
.....	31	4	0	200	0	0	13	48	55
.....	31	4	0	200	0	0	14	43	10
.....	31	6	0	199	15	0	12	3	0
13 Février.....	31	30	0	203	39	0	12	41	0
.....	31	33	30	203	44	0	12	20	30
Cook.									
13 Février 1778.....	31	37	0	203	39	0	12	0	0
14 Février.....	31	39	0	203	38	0	11	3	51
Bayli.									
14 Février 1778	31	39	0	203	38	0	10	31	35
.....	31	39	0	203	34	0	11	17	0
.....	31	39	0	203	28	0	11	41	50
Cook et Bayli.									
14 Février 1778.....	31	39	0	203	38	0	10	22	0
Bayli.									
14 Novembre 1778.....	33	46	0	205	1	0	12	39	0
5 Novembre 1779.....	35	3	0	141	25	0	2	55	0
.....	35	3	0	141	25	0	3	29	0
.....	35	3	0	141	25	0	3	35	0
.....	35	3	0	141	25	0	3	38	0
.....	35	3	0	144	39	0	3	48	0
.....	35	3	0	141	25	0	4	13	0
.....	35	3	0	141	25	0	4	32	0
Cook.									
5 Novembre 1779.....	35	3	0	141	25	0	3	23	0
.....	35	3	0	141	25	0	3	40	43
19 Novembre.....	35	24	0	139	35	0	1	7	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
31 Octobre.....	35	24	0	139	35	0	1	31	43
Bayli.									
31 Octobre 1779.....	35	24	0	139	35	0	0	48	0
.....	35	24	0	139	35	0	1	21	0
.....	35	24	0	139	35	0	1	29	0
.....	35	24	0	139	35	0	1	36	0
.....	35	34	0	139	35	0	2	17	0
Cook.									
31 Octobre 1779.....	35	34	0	139	35	0	2	3	0
Bayli.									
31 Octobre 1779.....	35	40	0	139	39	0	2	28	0
4 Novembre.....	35	42	0	144	31	0	3	18	0
17 Février 1778.....	36	6	0	203	31	0	13	46	0
Cook.									
17 Février 1778.....	36	10	0	204	20	0	11	2	46
.....	36	10	0	204	20	0	12	43	20
.....	36	10	0	204	20	0	13	32	49
Bayli.									
17 Février 1778.....	36	10	0	204	20	0	13	42	40
.....	36	10	0	204	20	0	16	42	30
30 Octobre 1779.....	36	32	0	139	25	0	2	29	0
Cook et Bayli.									
30 Octobre 1779.....	36	32	0	139	25	0	2	18	0
.....	36	32	0	139	25	0	2	23	30
Bayli.									
18 Février 1778.....	37	15	0	203	37	0	14	52	0
.....	37	15	0	203	50	0	16	10	40
.....	37	15	0	203	50	0	16	48	40
.....	37	15	0	203	50	0	16	56	40
.....	37	15	0	203	50	0	16	59	20
Cook.									
18 Février 1778.....	37	15	0	203	50	0	17	4	40
.....	37	22	30	204	52	0	16	42	21
Bayli.									
19 Février 1777.....	37	30	0	204	38	0	14	38	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
19 Février 1777.....	37	30	0	199	55	0	15	38	20
20 Février.....	37	30	0	203	55	0	16	20	50
.....	37	30	0	203	55	0	16	31	15
19 Février	37	30	0	203	55	0	16	53	40
.....	37	30	0	203	55	0	17	6	50
29 Octobre 1779.....	37	42	0	139	0	0	1	42	0
Cook.									
20 Février 1778.....	38	16	0	205	35	0	17	2	33
.....	28	16	0	205	35	0	17	56	50
Bayli.									
20 Février 1778.....	38	16	0	205	35	0	17	8	0
27 Octobre 1779.....	38	17	0	140	34	0	1	23	0
21 Février 1778.....	39	14	0	209	29	0	16	47	40
.....	39	14	0	209	29	0	16	51	45
.....	39	14	0	209	29	0	17	17	45
24 Février.....	39	14	0	209	29	0	18	29	0
.....	39	14	0	209	29	0	18	34	35
Cook.									
21 Février 1778.....	39	14	0	209	29	0	17	36	20
.....	39	14	0	209	29	0	17	37	15
1 Février.....	39	14	0	209	29	0	18	21	0
21 Février.....	39	14	0	209	29	0	18	53	50
26 Octobre 1779.....	39	28	0	140	23	0	1	48	0
26 Octobre.....	39	28	0	146	23	0	2	15	0
Bayli.									
26 Octobre 1779.....	39	28	0	140	23	0	1	21	0
25 Octobre 1779.....	40	2	0	140	35	0	0	23	0
21 Février 1777	40	2	0	207	44	0	15	10	0
25 Octobre 1779.....	40	9	0	141	29	0	1	8	0
8 Novembre 1779.....	40	20	0	199	50	0	16	22	0
22 Février.....	40	25	0	210	5	0	19	10	35
Cook.									
22 Février 1778	40	25	0	210	5	0	18	58	37
.....	40	25	0	210	5	0	19	29	5

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
22 Février 1777	40	27	0	209	42	0	15	42	0
22 Octobre 1779.....	40	29	0	145	44	0	1	30	0
.....	40	29	0	145	44	0	2	16	0
.....	40	29	0	145	44	0	3	35	0
.....	40	29	0	145	44	0	4	15	0
8 Novembre 1778	40	29	0	198	59	0	15	29	40
.....	40	29	0	198	59	0	15	41	10
.....	40	29	0	198	59	0	16	14	40
.....	40	29	0	198	59	0	16	33	40
Cook.									
22 Octobre 1779	40	29	0	145	35	0	1	38	0
.....	40	29	0	145	44	0	2	11	0
.....	40	29	0	145	44	0	2	34	10
8 Novembre 1778.....	40	29	0	198	59	0	16	1	35
.....	40	29	0	198	59	0	16	3	40
.....	40	29	0	198	59	0	16	6	40
Bayli.									
7 & 8 Novembre 1778.	40	33	30	199	47	0	16	40	30
7 Novembre.....	40	47	0	199	44	0	16	59	0
22 Février 1778	41	2	0	213	15	0	16	22	0
21 Octobre 1779.....	41	11	0	146	25	0	4	12	0
Cook.									
21 Octobre 1779	41	11	0	146	25	0	3	4	0
.....	41	11	0	146	25	0	3	6	0
.....	41	11	0	146	25	0	3	21	30
Bayli.									
24 Février 1778.....	41	46	0	215	19	0	16	44	0
Cook.									
15 Avril 1779.....	42	10	0	157	51	0	5	42	15
.....	42	10	0	157	51	0	6	24	41
.....	42	10	0	157	51	0	6	51	0
Bayli.									
15 Avril 1779.....	42	10	0	157	51	0	6	36	30
6 Novembre 1778.....	42	13	0	208	52	0	17	12	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
21 Octobre 1779.....	42	20	0	147	16	0	4	0	0
16 Avril.....	42	50	0	157	46	0	7	52	0
16 Avril.....	42	50	0	157	46	0	7	52	0
Cook et Bayli.									
17 Avril 1779.....	43	43	0	157	39	0	5	17	0
Cook.									
17 Avril 1779.....	43	43	0	157	39	0	6	31	30
Bayli.									
27 Mars 1779.....	43	43	0	157	39	0	7	46	0
11 Mars 1778.....	43	37	0	232	39	0	15	47	0
8 Mars.....	43	50	0	232	52	0	16	38	0
4 Mars.....	43	57	0	229	15	0	17	42	0
Bayli.									
7 Mars 1778.....	44	26	0	232	49	0	16	26	0
28 Février.....	44	27	0	224	50	0	17	5	0
17 Octobre 1779.....	44	29	0	150	55	0	3	53	0
.....	44	29	0	150	55	0	4	18	0
.....	44	29	0	150	55	0	4	37	0
.....	44	29	0	150	55	0	4	51	0
.....	44	29	0	150	55	0	5	10	0
.....	44	29	0	150	55	0	5	12	0
Cook et Bayli.									
17 Octobre 1779.....	44	29	0	150	55	0	5	7	0
Cook.									
17 Octobre 1779.....	44	29	0	150	55	0	4	55	45
Bayli.									
15 Octobre 1777.....	44	30	0	153	9	0	4	50	0
6 Mars 1778.....	44	30	0	232	30	0	17	22	0
18 Mars.....	44	44	0	231	51	0	16	8	0
28 Février.....	44	46	0	225	15	0	17	33	0
.....	44	46	0	225	53	0	19	12	7
.....	44	46	0	225	45	0	20	17	50
.....	44	46	0	225	45	0	20	17	55
28 Février 1778.....	44	46	0	225	45	0	20	48	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
28 Février 1778.....	44	46	0	225	45	0	20	21	25
.....	44	46	0	225	45	0	20	36	30
2 Mars.....	44	47	0	226	24	0	19	6	0
28 Février 1778.....	44	49	0	225	49	0	19	52	18
Bayli.									
1 & 2 Mars 1778.....	44	50	40	226	23	20	18	20	40
.....	44	51	0	226	25	0	18	26	0
.....	44	52	0	225	53	0	18	31	30
Cook.									
1 Mars 1778.....	44	52	0	225	53	0	17	38	20
.....	44	52	0	225	53	0	19	19	10
.....	44	52	0	225	53	0	19	48	55
Bayli.									
1 Mars 1778.....	44	54	0	226	21	0	17	30	0
Cook et Bayli.									
17 Octobre 1779.....	45	2	0	153	13	0	5	0	0
Bayli.									
19 Mars 1778.....	45	3	0	231	35	0	16	13	0
.....	45	5	0	231	50	0	17	22	40
Cook.									
19 Mars 1778.....	45	5	0	231	50	0	17	51	44
.....	45	5	0	231	50	0	17	54	45
.....	45	5	0	231	50	0	17	58	10
Cook et Bayli.									
19 Mars 1778.....	45	5	0	231	50	0	18	11	20
Bayli.									
15 & 17 Octobre 1779.	45	15	30	153	12	0	5	7	30
15 Octobre.....	45	29	0	152	20	0	4	21	0
.....	45	29	0	153	11	0	5	15	0
.....	45	29	0	152	20	0	5	55	0
.....	45	29	0	152	20	0	5	51	0
Cook et Bayli.									
.....	45	29	0	152	20	0	5	1	0
15 Octobre 1779.....	45	29	0	152	20	0	5	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
15 Octobre 1779.....	45	29	0	152	20	0	5	24	40
.....	45	29	0	152	20	0	6	20	0
Bayli.									
15 Octobre 1779.....	46	16	0	153	5	0	4	20	0
.....	46	16	0	153	5	0	4	36	0
.....	46	16	0	153	5	0	4	44	0
.....	46	16	0	153	5	0	5	0	0
Cook.									
15 Octobre 1779.....	46	16	0	153	5	0	4	40	0
14 Octobre.....	46	44	0	153	5	0	4	42	0
Bayli.									
14 Octobre 1779.....	46	44	0	153	5	0	4	42	0
14 Avril.....	46	48	0	154	5	0	5	26	0
14 Octobre.....	46	48	0	154	5	0	6	15	0
Cook.									
14 Octobre 1779.....	46	48	0	154	5	0	5	56	0
.....	46	48	0	154	5	0	6	7	0
22 Mars 1778.....	47	36	0	233	10	0	16	38	0
Bayli.									
22 Février 1778.....	47	36	0	233	10	0	16	34	30
24 Mars.....	47	47	0	232	9	0	17	15	0
14 Octobre 1779.....	47	57	0	153	0	0	4	30	0
27 Mars 1778.....	48	8	0	229	44	0	17	17	0
Cook.									
27 Mars 1778.....	48	15	0	230	5	0	19	17	0
27 Août.....	48	15	0	230	5	0	19	36	0
Bayli.									
18 Avril 1779.....	48	18	0	158	5	0	7	24	0
Cook.									
18 Avril 1779.....	48	20	0	158	56	0	7	27	30
Bayli.									
18 Avril 1779.....	48	20	0	158	56	0	6	29	0
.....	48	20	0	158	56	0	7	43	0
.....	48	20	0	158	56	0	8	10	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
13 Octobre.....	49	37	0	154	22	0	4	10	0
19 Avril.....	49	40	0	158	36	0	7	58	0
18 Juin.....	49	54	0	158	38	0	9	26	0
20 Avril.....	49	54	0	158	37	0	9	41	0
Cook et Bayli.									
20 Avril 1779.....	49	54	0	158	37	0	9	22	0
.....	49	54	0	158	37	0	10	24	0
Cook.									
20 Avril 1779.....	49	54	0	158	37	0	9	10	0
2 Avril.....	49	54	0	158	37	0	9	43	30
12 Octobre.....	50	3	0	154	37	0	5	37	20
Cook et Bayli.									
12 Octobre 1779.....	50	3	0	154	37	0	5	6	0
Bayli.									
12 Octobre 1779.....	50	3	0	154	37	0	5	20	0
24, 25 & 26 Décembre 1777.....	50	3	0	154	37	0	5	34	0
.....	50	3	0	154	37	0	5	35	0
12 Octobre 1779.....	50	3	0	154	37	0	6	14	0
21 Avril.....	50	39	0	159	42	0	6	52	0
12 Octobre.....	50	50	0	154	55	0	5	10	0
.....	50	52	30	154	45	0	5	17	30
Cook.									
12 Octobre 1779.....	50	55	0	154	35	0	5	25	0
.....	50	57	0	154	55	0	5	41	0
.....	50	57	0	154	55	0	6	3	10
.....	50	57	0	154	55	0	6	21	0
.....	50	57	0	154	55	0	6	42	0
.....	50	57	0	154	55	0	6	40	0
Cook et Bayli.									
12 Octobre 1779.....	50	57	0	154	55	0	5	33	0
Bayli.									
12 Octobre 1779.....	50	57	0	154	55	0	5	22	0
Cook et Bayli.									
11 Octobre 1779.....	51	3	0	155	55	0	6	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes			Longitudes			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
11 Octobre 1779.....	51	30	0	156	0	0	6	28	0
.....	51	57	0	156	5	0	6	56	0
27 Avril.....	52	22	0	157	58	0	6	9	0
28 Avril.....	52	28	0	156	50	0	6	10	0
18 Mai.....	52	28	0	156	20	0	6	16	0
Du 21 au 31 Mai.....	52	28	0	156	20	0	6	22	0
16 Mai.....	52	28	0	156	20	0	6	28	0
18 Mai.....	52	28	0	156	20	0	6	30	0
Cook et Bayli.									
20 Mai 1779.....	52	28	0	156	20	0	6	3	0
Bayli.									
30 Avril 1779.....	52	38	0	156	25	0	6	9	0
29 Avril.....	52	41	0	157	5	0	6	0	0
3 Mai.....	52	41	0	157	5	0	6	36	0
15 Mai.....	52	41	0	157	5	0	6	47	0
18 Juin 1777.....	52	43	0	156	34	0	4	43	0
.....	52	43	0	156	34	0	5	11	30
18 Juin 1779.....	52	43	0	156	34	0	9	2	30
.....	52	43	0	156	34	0	9	6	0
18 Juin 1778.....	52	43	0	156	34	0	9	33	0
.....	52	43	0	156	34	0	9	41	0
.....	52	43	0	156	34	0	9	36	0
Cook et Bayli.									
18 Juin 1779.....	52	43	0	156	34	0	8	53	0
Cook.									
15 Juin 1779.....	52	43	0	156	34	0	8	29	30
.....	52	43	0	156	34	0	8	40	30
.....	52	43	0	156	34	0	8	46	0
.....	52	43	0	156	34	0	8	59	0
.....	52	43	0	156	34	0	9	42	30
Bayli.									
17 Juin 1779.....	52	44	0	157	21	0	7	24	0
.....	52	45	0	156	46	0	8	13	0
29 Avril.....	52	46	0	156	50	0	6	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
3 Mai	52	57	0	156	25	0	5	27	0
.....	52	57	0	156	25	0	6	39	0
Cook et Bayli.									
3 Mai 1779.....	52	57	0	156	25	0	6	1	0
Cook.									
21 Août	52	56	0	156	25	0	6	7	0
30 Août	52	57	0	156	34	0	6	28	0
Bayli.									
30 Avril & 3 Mai 1770..	52	57	30	156	25	0	5	57	0
30 Avril 1779.....	52	58	0	156	25	0	4	14	0
.....	52	58	0	156	25	0	6	27	0
Cook et Bayli.									
30 Avril 1779.....	52	58	0	156	25	0	6	3	0
Cook.									
21 Mai 1779.....	52	58	0	156	20	0	6	6	0
30 Avril	52	58	0	156	25	0	6	7	0
Bayli.									
29 Avril 1778.....	53	6	0	230	55	0	21	3	0
21 Août	53	14	0	159	25	0	5	8	0
.....	53	14	0	159	25	0	5	53	0
.....	53	14	0	159	25	0	6	53	0
.....	53	14	0	159	25	0	6	52	0
.....	53	14	0	159	25	0	7	13	0
Cook.									
21 Août 1779.....	53	14	0	159	25	0	5	48	0
.....	53	14	0	159	25	0	6	16	50
Bayli.									
30 Avril.....	53	37	0	222	42	0	21	52	0
Cook.									
30 Avril 1778.....	53	37	0	222	42	0	20	30	0
.....	53	37	0	222	42	0	21	12	0
Bayli.									
30 Avril 1778	53	38	0	224	30	0	20	15	0
17 Août 1779.....	53	42	0	166	46	0	10	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
17 Août 1779.....	53	42	0	165	39	0	9	55	30
.....	53	42	0	165	39	0	10	30	0
Bayli.									
21 Juin 1778.....	53	49	0	195	16	0	20	15	0
21 Août 1779.....	53	50	0	159	25	0	7	14	0
26 Juin 1778.....	53	51	0	191	28	0	20	25	0
16 Août 1779.....	53	54	0	168	7	0	9	29	0
12 Octobre 1778.....	53	54	0	191	5	0	20	24	0
10 Octobre.....	53	55	0	191	5	0	20	22	0
11 Octobre.....	53	55	0	191	5	0	20	25	0
Cook.									
11 Octobre 1779.....	53	55	0	191	5	0	20	28	0
2 Août 1779.....	54	5	0	187	52	0	24	43	40
Bayli.									
21 Juin 1778.....	54	11	0	195	28	0	20	46	0
2 Juillet.....	54	34	0	191	25	0	20	4	0
18 Juin.....	55	12	0	199	14	0	20	17	0
22 Mai.....	55	12	0	222	35	0	22	20	50
1 Mai.....	55	12	0	222	35	0	24	52	0
2 Mai.....	55	12	0	222	35	0	24	52	40
Cook et Bayli.									
1 Mai 1778.....	55	12	0	222	35	0	23	29	30
.....	55	12	0	222	35	0	24	12	50
Cook.									
1 Mai 1778.....	55	12	0	222	35	0	24	9	26
.....	55	12	0	222	35	0	25	8	45
20 Juin 1779.....	55	13	0	160	41	0	9	15	0
.....	55	13	0	160	41	0	9	45	40
.....	55	13	0	160	41	0	10	36	0
Bayli.									
20 Juin 1779.....	55	13	0	160	41	0	9	1	0
.....	51	13	0	160	41	0	9	24	0
.....	55	13	0	160	41	0	9	35	0
.....	55	13	0	160	41	0	10	43	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
9 Juillet 1778.	55	18	0	199	12	0	22	20	45
.....	55	18	0	199	12	0	22	45	0
.....	55	18	0	199	12	0	23	9	15
Cook.									
9 Juillet 1778.....	55	18	0	199	12	0	22	47	30
.....	55	18	0	199	12	0	22	48	33
.....	55	18	0	199	12	0	22	53	50
.....	55	18	0	199	12	0	22	55	0
17 Juin.....	55	25	0	198	13	0	22	24	40
.....	55	25	0	198	13	0	22	32	23
.....	55	25	0	198	13	0	22	46	5
.....	55	25	0	198	13	0	22	59	15
Cook et Bayli.									
17 Juin 1778.....	55	25	0	198	13	0	21	37	30
Bayli.									
17 Juin 1778	55	25	0	199	13	0	22	7	50
.....	55	25	0	198	13	0	23	19	0
.....	55	27	0	199	15	0	21	50	0
12 Août	55	32	0	168	15	0	11	27	0
20 Juin 1779.....	55	34	30	161	5	0	9	20	0
16 Juin 1778.....	55	37	0	199	14	0	20	16	40
12 Juin.....	55	37	0	199	14	0	20	18	0
16 Juin.....	55	37	0	199	14	0	22	6	30
Cook et Bayli.									
16 Juin 1778..	55	37	0	199	14	0	19	13	35
.....	55	37	0	199	14	0	21	42	15
Cook.									
16 Juin 1778.....	55	37	0	199	14	0	18	44	5
.....	55	37	0	199	14	0	20	23	22
Bayli.									
16 Juin 1778.....	55	47	0	200	5	0	22	21	0
Cook.									
20 Juin,.....	55	49	0	161	25	0	9	15	0
Bayli.									
10 & 11 Octobre 1778..	55	55	0	191	5	0	20	25	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
21 Juin 1779.....	56	1	0	161	47	0	9	21	0
.....	56	1	0	161	47	0	9	37	0
Cook.									
21 Juin 1779.....	56	1	0	161	47	0	9	52	0
.....	56	1	0	161	47	0	9	56	0
17 Août.....	56	1	0	161	47	0	9	58	0
21 Juin.....	56	1	0	161	47	0	10	8	0
Bayli.									
21 Juin 1779.....	56	6	0	161	38	0	10	11	0
12 Août.....	56	12	0	172	35	0	10	42	0
.....	56	12	0	172	35	0	11	43	0
Cook.									
12 Août 1779.....	56	12	0	172	35	0	10	51	0
12 Avril.....	56	12	0	172	35	0	11	8	0
Bayli.									
12 Août 1779.....	56	17	0	169	21	0	11	37	0
12 Juin 1778.....	56	20	0	203	35	0	20	21	50
Cook.									
12 Juin 1778.....	56	20	0	203	35	0	20	30	55
.....	56	20	0	203	35	0	20	40	30
Bayli.									
1 Mai 1778.....	56	26	0	221	57	0	23	9	0
30 Septembre 1779.....	56	29	0	190	35	0	22	0	0
29 Septembre.....	56	37	0	189	57	0	22	15	0
13 Juin.....	56	40	0	203	25	0	21	52	0
Cook.									
6 Juillet 1778.....	56	56	0	197	24	0	22	34	0
Bayli.									
5 & 6 Juillet 1778.....	56	57	30	197	6	0	22	19	0
.....	56	59	0	196	46	0	22	4	0
12 Juin 1778.....	57	1	0	204	0	0	23	45	0
7 Juillet.....	57	7	0	197	47	0	26	22	40
.....	57	7	0	197	47	0	26	23	45
.....	57	7	0	197	47	0	26	29	40
7 Juillet.....	57	7	1	197	47	0	26	36	55

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
7 Juillet 1778.....	57	7	0	197	47	0	26	2	10
.....	57	7	0	197	47	0	26	13	39
Bayli.									
7 Juillet 1778.....	57	13	0	197	58	0	23	49	0
11 Juillet 1779.....	57	14	0	170	8	0	10	43	0
2 Mai 1778.....	57	17	0	221	45	0	23	11	0
10 Août 1779.....	57	32	0	171	53	0	11	39	0
10 Août 1779.....	57	33	0	173	27	0	11	0	0
Cook.									
10 Août 1779.....	57	33	0	173	27	0	11	34	0
.....	57	33	0	173	27	0	12	8	0
Bayli.									
28 Septembre 1779.....	57	55	0	188	15	0	21	49	0
Cook.									
3 Mai 1778.....	57	57	0	156	25	0	5	50	0
23 Juin 1778.....	58	6	0	164	35	0	12	5	0
.....	58	6	0	164	35	0	13	38	0
.....	58	6	0	164	35	0	13	49	0
23 Juin 1778.....	58	6	0	164	35	0	12	12	0
.....	58	6	0	164	35	0	13	3	10
.....	58	6	0	164	35	0	13	17	0
.....	58	6	0	164	35	0	13	18	0
13 Juillet 1779.....	58	8	0	196	9	0	20	25	35
.....	58	8	0	196	9	0	20	37	50
.....	58	8	0	196	9	0	20	39	13
30 Avril 1778.....	58	8	0	196	9	0	21	28	20
13 Juillet.....	58	8	0	196	9	0	21	13	30
.....	58	8	0	196	9	0	19	2	15
Bayli.									
13 Juillet 1778.....	58	8	0	196	9	0	21	7	50
23 Juin 1779	58	9	0	163	21	0	11	16	0
9 Juillet 1778.....	58	11	0	199	33	0	23	37	0
3 Mai.....	58	11	0	219	55	0	26	21	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
3 Mai.....	58	14	0	218	16	0	24	29	10
23 Mai.....	58	14	0	202	32	0	25	37	0
.....	58	14	0	218	16	0	23	27	40
Cook et Bayli.									
3 Mai 1778.....	58	14	0	218	16	0	23	31	10
.....	58	14	0	218	16	0	24	17	50
Cook.									
3 Mai.....	58	14	0	218	16	0	24	40	20
2 Août 1779.....	58	14	0	218	16	0	24	42	40
24 Mai 1778.....	58	16	0	205	47	0	22	49	15
Bayli.									
24 Mai.....	58	16	0	206	19	0	26	16	0
9 & 10 Juillet.....	58	16	0	199	24	40	24	8	40
Cook.									
10 Juillet 1779.....	58	17	0	199	6	0	24	44	0
Cook et Bayli.									
14 Juillet 1778.....	58	18	0	196	15	0	23	28	0
Bayli.									
12 Juillet 1778.....	58	20	0	198	15	0	23	45	0
.....	58	23	30	198	12	0	23	58	0
Cook.									
12 Juillet 1778.....	58	27	0	198	10	0	24	11	0
3, 4 & 5 Mai.....	58	27	20	218	20	0	24	30	55
Bayli.									
15 Juillet 1778	58	29	0	196	15	0	23	14	0
4 Mai 1779.....	58	30	0	218	5	0	26	22	0
14, 15 & 16 Juillet 1778.	58	31	0	196	12	20	23	9	40
12 Juillet.....	58	31	0	197	38	0	23	22	45
.....	58	31	0	197	38	0	21	58	45
Cook.									
25 Juillet 1778.....	58	31	0	189	35	0	19	6	0
12 Juillet.....	58	31	0	197	38	0	21	14	15
.....	58	31	0	197	38	0	22	32	23
.....	58	31	0	197	38	0	23	4	15
.....	58	31	0	197	38	0	23	8	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
12 Juillet.....	58	31	0	197	38	0	22	25	35
Bayli.									
4 Mai 1778.....	58	32	0	218	20	0	26	35	0
24 Juin 1779.....	58	34	0	164	51	0	12	3	0
4 Mai 1778.....	58	35	0	218	27	0	25	38	30
.....	58	35	0	218	27	0	26	25	0
.....	58	35	0	218	27	0	26	34	0
.....	58	35	0	218	27	0	26	40	40
Cook et Bayli.									
4 Mai 1778.....	58	35	0	218	27	0	25	54	0
.....	58	35	0	218	27	0	25	55	10
Cook.									
24 Juin.....	58	37	0	165	45	0	12	12	0
24 Juin 1779.....	58	37	0	165	45	0	13	3	0
.....	58	37	0	165	45	0	13	10	20
.....	58	37	0	165	45	0	13	13	0
.....	58	37	0	165	45	0	13	22	0
Bayli.									
24 Juin 1779.....	58	37	0	165	45	0	13	32	0
.....	58	37	0	165	45	0	13	40	0
27 Septembre 1778....	58	38	0	186	51	0	20	20	0
Cook.									
27 & 26 Septembre 1778.	58	39	30	187	5	0	20	29	0
Bayli.									
25 & 26 Juillet 1778...	58	40	0	189	35	0	19	8	30
27 Octobre.....	58	41	0	186	51	0	20	38	0
Cook.									
16 Juillet.....	58	46	0	195	47	0	22	47	0
Bayli.									
26 Juillet 1778.....	58	49	0	189	35	0	19	11	0
5 Mai.....	58	49	0	218	31	0	26	51	0
.....	58	53	0	218	19	0	23	9	10
.....	58	53	0	218	19	0	23	14	45
.....	58	53	0	218	19	0	24	55	40
3 Mai,.....	58	58	0	218	19	0	22	43	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook et Bayli.									
5 Mai 1778.....	58	58	0	218	29	0	22	23	55
Cook.									
5 Mai 1778.....	58	58	0	218	19	0	22	32	15
Bayli.									
5 Juin 1778.....	59	0	0	204	49	0	27	41	0
24 Juin 1779	59	1	0	165	37	0	12	22	0
6 Mai 1778.....	59	9	0	217	42	0	23	55	20
.....	59	9	0	217	42	0	24	49	30
.....	59	9	0	219	42	0	24	50	20
Cook et Bayli.									
6 Mai 1778.....	59	9	0	217	42	0	24	13	20
.....	59	9	0	197	42	0	24	59	0
Cook.									
6 Mai 1778.....	59	9	0	217	42	0	24	29	32
.....	59	9	0	217	42	0	24	29	40
.....	59	9	0	217	42	0	24	36	12
Bayli.									
7 Août 1779.....	59	16	0	178	23	0	17	12	0
20 Mai 1778.....	59	22	0	207	13	0	23	57	50
Cook et Bayli.									
21 Mai 1778.....	59	22	0	207	27	0	24	22	45
Cook.									
21 Mai 1778.....	59	22	0	207	27	0	24	36	55
.....	59	22	0	207	27	0	24	37	48
.....	59	22	0	207	27	0	24	39	30
.....	59	22	0	207	27	0	25	3	50
.....	59	22	0	207	27	0	25	6	0
Bayli.									
6 Mai 1778.....	59	23	0	218	32	0	26	59	0
8 Mai.....	59	26	0	224	56	0	22	4	10
.....	59	26	0	224	56	0	22	15	45
Cook.									
8 Mai 1778.....	59	26	0	224	56	0	22	25	50
8 Juillet.....	59	26	0	224	56	0	22	27	10

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
8 Mai.....	59	26	0	224	56	0	22	34	30
7 Août 1779.....	59	27	0	182	12	0	17	56	0
.....	59	27	0	182	12	0	18	5	0
.....	59	27	0	182	12	0	18	55	0
.....	59	27	0	182	12	0	19	1	0
.....	59	27	0	182	12	0	19	31	0
.....	59	27	0	182	12	0	19	50	0
Bayli.									
7 Mai 1778.....	59	28	0	217	3	0	26	42	0
Bayli.									
7 Août 1779.....	59	30	0	180	55	0	18	26	0
9 Mai 1778.....	59	31	0	214	50	0	26	48	0
8 Mai.....	59	33	0	215	58	0	26	35	0
Cook.									
8 Mai 1778.....	59	36	0	224	56	0	22	55	8
6 & 7 Août 1779.....	59	37	0	182	5	0	18	25	15
19 Juillet.....	59	37	0	195	2	0	21	30	0
20 Juillet 1778.....	59	37	0	195	2	0	22	45	20
.....	59	37	0	195	2	0	22	46	40
19 Juillet.....	59	37	0	194	58	0	22	47	40
19 Juillet 1778.....	59	37	0	194	58	0	23	34	36
.....	59	37	0	194	58	0	25	7	40
Cook et Bayli.									
20 Juillet 1778.....	59	37	0	195	2	0	22	23	20
.....	59	37	0	195	2	0	22	47	40
19 Juillet.....	59	37	0	194	58	0	23	32	20
.....	59	37	0	194	58	0	24	12	20
20 Juillet.....	59	37	0	195	2	0	24	12	20
Bayli.									
19 Juillet.....	59	37	0	194	58	0	22	25	30
20 Juillet 1778.....	59	37	0	195	2	0	22	9	0
.....	59	37	0	195	2	0	22	13	0
19 Juillet.....	59	37	0	194	58	0	23	22	20
.....	59	37	45	195	5	0	22	2	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
20 Juillet.....	59	38	0	195	8	0	22	45	0
27 Juillet	59	39	0	187	57	0	17	30	10
.....	59	39	0	187	58	0	18	31	40
.....	59	39	0	187	57	0	18	34	20
20 Mai	59	39	0	208	27	0	23	25	10
.....	59	39	0	208	27	0	23	46	40
.....	59	39	0	208	27	0	23	48	20
.....	59	39	0	208	27	0	24	2	42
Cook.									
20 Mai 1778.....	59	39	0	208	27	0	22	54	50
27 Juillet 1778.....	59	39	0	187	57	0	18	40	23
.....	59	39	0	187	57	0	18	52	35
.....	59	39	0	187	57	0	18	56	25
.....	59	39	0	187	57	0	19	37	10
20 Mai 1778.....	59	39	0	208	27	0	23	41	34
Cook et Bayli.									
20 Mai 1778.....	59	39	0	208	27	0	24	11	40
6 Août 1779.....	59	47	0	181	58	0	18	16	0
Cook.									
6 Août 1779.....	59	47	0	181	58	0	17	40	0
.....	59	47	0	181	58	0	18	6	0
Bayli.									
6 Août 1779.....	59	47	0	181	58	0	17	42	0
1 & 2 Mars 1778.....	59	47	0	181	58	0	18	20	0
4 Juin.....	60	1	0	205	1	0	26	39	0
Cook et Bayli.									
19 Mai 1778.....	60	12	0	209	47	0	27	15	0
Bayli.									
29 Juillet 1778.....	60	18	0	195	13	0	22	41	0
27 Juin 1779.....	60	28	0	173	4	0	13	37	0
2 Juin 1778.....	60	43	0	205	57	0	30	21	0
1 Juin.....	61	1	0	206	4	0	30	20	0
Cook.									
1 Juin 1778.....	61	1	0	206	3	0	30	6	0
.....	61	1	0	206	5	0	30	14	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
3 Juillet 1778.....	61	11	0	205	35	0	29	25	0
Bayli.									
22 Septembre 1778.....	61	34	0	186	49	0	20	17	0
29 Juin.....	61	50	0	176	1	0	17	12	0
31 Juillet.....	61	54	0	187	5	0	22	48	0
28 Juin 1779.....	62	5	0	173	19	0	18	31	0
.....	62	10	0	174	31	0	20	5	30
.....	62	10	0	174	31	0	20	30	55
.....	62	10	0	174	31	0	20	48	0
Cook.									
28 Juin 1779.....	62	10	0	174	31	0	19	37	40
.....	62	10	0	174	31	0	19	55	40
.....	62	10	0	174	31	0	20	25	6
.....	62	10	0	174	31	0	21	32	55
Bayli.									
18 Septembre 1778.....	63	34	0	195	23	0	28	18	0
3 Juillet 1779.....	63	42	0	184	30	0	23	27	0
19 Septembre.....	63	47	0	193	13	0	25	17	0
19 Septembre 1778.....	63	49	0	190	58	0	22	20	0
Cook.									
19 Septembre 1778.....	63	49	0	190	58	0	22	23	0
Bayli.									
5 Septembre 1778.....	63	55	0	187	14	0	25	26	0
6 Septembre 1779.....	63	58	0	181	45	0	25	45	0
6 Septembre 1778.....	63	58	0	191	47	0	26	25	45
.....	63	58	0	191	47	0	26	42	50
.....	63	58	0	191	47	0	26	58	50
12 Juillet 1779.....	63	58	0	191	47	0	27	6	0
.....	63	58	0	191	47	0	27	5	20
Cook.									
6 Septembre 1779.....	63	58	0	191	47	0	25	12	31
.....	63	58	0	191	47	0	27	29	20
Bayli.									
2 Août 1779.....	64	4	0	187	18	0	23	59	0
.....	64	5	0	200	5	0	22	44	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
2 Août 1779.....	64	5	0	187	52	0	23	47	0
.....	64	5	0	187	52	0	25	40	0
.....	64	5	0	187	52	0	25	50	0
Cook et Bayli.									
2 Août 1779.....	64	5	0	187	52	0	24	22	0
Cook.									
2 Août 1779.....	64	5	0	187	52	0	25	59	0
Bayli.									
17 Septembre 1778.....	64	11	0	195	1	0	28	50	0
Cook.									
1 Août 1779.....	64	12	0	187	13	0	19	8	10
.....	64	12	0	187	13	0	19	34	50
.....	64	12	0	187	13	0	19	42	50
.....	64	12	0	187	13	0	19	46	51
.....	64	12	0	187	13	0	20	2	15
Cook et Bayli.									
1 Août 1779.....	64	12	0	187	13	0	19	14	40
Bayli.									
6 Septembre 1779.....	64	13	0	192	15	0	24	50	40
.....	64	13	0	192	15	0	26	42	58
Cook.									
6 Septembre 1779.....	64	13	0	192	15	0	25	6	55
.....	64	13	0	192	15	0	25	57	53
.....	64	13	0	192	15	0	25	58	0
.....	64	13	0	192	15	0	26	3	20
11 Septembre 1778.....	64	20	0	196	42	0	26	16	12
15 Septembre.....	64	20	0	194	25	0	27	23	40
.....	64	20	0	194	25	0	27	28	40
.....	64	20	0	194	3	30	29	24	3
.....	64	20	0	193	42	0	31	4	45
17 Juillet 1779.....	64	20	0	193	42	0	31	10	20
Cook et Bayli.									
15 Septembre 1778....	64	20	0	193	42	0	31	24	0
.....	64	20	0	193	42	0	31	50	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
11 Septembre 1778.....	64	20	0	196	42	0	23	15	5
.....	64	20	0	196	42	0	23	57	45
.....	64	20	0	196	42	0	23	46	20
.....	64	20	0	194	25	0	24	3	45
15 Septembre.....	64	20	0	194	25	0	26	50	0
.....	64	20	0	194	25	0	27	4	50
.....	64	20	0	194	25	0	28	18	40
.....	64	20	0	194	25	0	28	31	0
.....	64	20	0	193	42	0	30	47	5
13 Septembre.....	64	20	0	193	42	0	30	55	10
7 Septembre.....	64	21	0	181	35	0	25	1	0
8 Septembre.....	64	21	0	193	25	0	27	22	0
15 Septembre.....	64	22	0	195	1	0	27	21	0
Cook.									
16 Septembre 1778....	64	22	0	195	1	0	27	25	0
Bayli.									
4 Septembre 1778....	64	26	0	186	11	0	23	55	15
.....	64	26	0	186	11	0	25	37	0
.....	64	26	0	186	11	0	25	38	55
Cook.									
4 Septembre 1778.....	64	26	30	187	11	0	25	1	30
10 Septembre.....	64	27	0	195	18	0	27	30	0
Bayli.									
4 Septembre 1778.....	64	29	0	185	22	0	24	11	0
12 Septembre.....	64	34	0	195	18	0	27	0	0
31 Juillet 1779.....	64	35	0	187	11	0	22	32	0
9 Septembre.....	64	40	0	195	18	0	28	22	0
10, 12, 15, 16 & 17 Juillet 1778.....	64	52	0	195	1	0	27	37	12
3 Septembre 1779.....	64	55	0	185	45	0	24	47	0
31 Juillet.....	64	56	0	176	53	0	22	22	45
Cook.									
31 Juillet 1779.....	64	56	0	187	52	0	22	34	20
.....	64	56	0	186	53	0	22	46	35

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
31 Juillet 1779.....	64	56	0	186	53	0	22	52	25
.....	64	56	0	186	53	0	22	56	45
2 Août.....	64	56	0	186	53	0	23	0	5
31 Juillet.....	64	56	0	186	53	0	23	34	0
Bayli.									
31 Juillet 1779.....	65	1	0	187	2	0	23	57	0
3 Septembre.....	65	24	0	186	25	0	25	12	0
9 Août 1779.....	65	35	0	188	55	0	24	27	0
30 Juillet 1779.....	65	36	0	188	55	0	23	37	0
9 Août.....	65	36	0	187	50	0	24	45	0
2 Septembre.....	65	40	0	187	5	0	25	32	0
10 Août.....	65	43	0	187	1	0	26	33	50
.....	65	43	0	187	1	0	27	0	50
.....	65	43	0	187	1	0	27	39	10
Cook.									
10 Août 1778.....	65	43	0	187	1	0	27	22	27
.....	65	43	0	187	1	0	27	31	55
.....	65	43	0	187	1	0	27	58	45
Bayli.									
10 Août 1778.....	66	0	0	207	45	0	25	36	0
12 Août.....	66	17	0	208	24	0	35	24	0
2 Septembre.....	66	30	0	186	47	0	26	24	0
13 Août.....	66	33	0	189	24	0	26	22	0
.....	66	36	0	189	40	0	16	27	20
.....	66	36	0	189	40	0	26	37	40
.....	66	36	0	189	40	0	27	11	0
.....	66	36	0	189	40	0	27	50	0
.....	66	36	0	189	40	0	27	50	5
Cook et Bayli.									
12 Août 1778.....	66	36	0	189	40	0	27	16	0
Cook.									
13 Août 1778.....	66	36	0	189	40	0	25	32	8
1 Septembre.....	66	47	0	187	8	0	27	32	10
.....	66	47	0	187	10	0	27	53	40
.....	66	47	0	187	10	0	28	15	10

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
1 Septembre.....	66	50	0	184	44	0	26	48	0
27 Juillet 1779.....	67	11	0	186	10	0	26	24	0
20 Juillet.....	67	58	0	186	38	0	25	14	0
11 Juillet.....	68	6	0	187	20	0	26	50	0
.....	68	6	0	187	20	0	27	8	0
.....	68	6	0	187	20	0	27	42	0
.....	68	6	0	187	20	0	27	46	30
.....	68	6	0	187	20	0	27	53	0
.....	68	6	0	187	0	0	28	27	0
Cook.									
11 Juillet 1779.....	68	6	0	187	20	0	27	32	25
1 Septembre 1778.....	68	6	0	187	20	0	27	55	0
24 Juillet 1779.....	68	43	0	184	37	0	21	12	55
.....	68	43	0	185	37	0	21	47	52
.....	68	43	0	184	37	0	22	27	45
Cook et Bayli.									
24 Juillet 1779.....	68	43	0	184	37	0	21	37	0
.....	68	43	0	184	37	0	21	37	25
.....	68	43	0	184	37	0	21	38	45
Bayli.									
24 Juillet 1779.....	68	43	0	184	37	0	22	7	25
Cook & Bayli.									
14 Juillet 1779.....	68	51	0	186	10	0	25	54	0
12 Juillet 1779.....	69	2	0	186	55	0	26	34	0
Bayli.									
12 Juillet.....	69	2	0	187	55	0	25	45	0
12 Juillet 1779.....	69	2	0	186	55	0	26	34	0
.....	69	2	0	187	55	0	26	22	0
Cook.									
12 Juillet 1779.....	69	2	0	207	55	0	25	33	0
.....	69	2	0	187	55	0	26	14	0
.....	69	2	0	187	55	0	26	10	30
9 Juillet 1779.....	69	5	0	185	53	0	28	17	55
.....	69	5	0	185	53	0	29	27	34

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
9 Juillet 1779.....	69	5	0	185	53	0	30	20	55
.....	69	5	0	185	53	0	30	37	40
Bayli.									
9 Juillet 1779.....	69	5	0	185	53	0	25	39	0
.....	69	5	0	185	53	0	30	47	40
.....	69	6	0	186	10	0	28	42	0
24 Août.....	69	17	0	187	23	0	27	17	0
27 Août 1778.....	69	20	0	180	35	0	25	29	0
29 Août 1778.....	69	20	0	180	30	0	26	55	0
27 Août.....	69	20	0	180	35	0	26	23	0
Cook.									
27 Août 1778.....	69	20	0	180	35	0	25	56	0
Bayli.									
21 Août 1778.....	69	31	0	192	57	0	32	45	0
.....	69	31	0	193	8	0	33	0	0
21 Juillet 1779.....	69	32	0	195	44	0	26	35	0
12 Juillet.....	69	33	0	186	45	0	27	46	0
Cook.									
20 Juillet 1778	69	38	0	193	24	0	30	28	0
20 Août.....	69	38	0	193	24	0	31	3	10
.....	69	38	0	193	24	0	31	4	40
Cook et Bayli.									
20 Août 1778.....	69	38	0	193	24	0	31	20	40
.....	69	38	0	193	24	0	31	37	0
Bayli.									
18 Août 1778.....	69	53	0	194	55	0	33	28	0
17 Juillet 1779.....	70	0	0	190	54	0	33	40	0
.....	70	4	0	193	26	0	35	39	0
....	70	4	0	193	26	0	35	40	0
Cook.									
17 Juillet 1779.....	70	4	0	193	26	0	35	57	0
.....	70	4	0	193	26	0	36	10	0
.....	70	4	0	193	26	0	36	19	0
19 Juillet.....	70	5	0	194	5	0	28	11	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
9 Juillet.....	70	5	0	194	5	0	28	59	0
.....	70	5	0	194	5	0	29	19	0
.....	70	5	0	194	5	0	29	29	0
Bayli.									
19 Août 1778.....	70	15	0	193	53	0	32	24	0
17 Juillet 1779.....	70	16	0	190	59	0	33	37	0
Cook et Bayli.									
17 Juillet 1779.....	70	17	0	194	11	0	31	28	20
.....	70	17	0	194	11	0	31	32	45
15 Juillet.....	70	17	0	194	11	0	31	56	30
Cook.									
9 Juillet 1779.....	70	17	0	194	11	0	30	21	45
17 Juillet.....	70	17	30	194	11	0	31	19	47
Bayli.									
18 Juillet 1779.....	70	20	0	193	43	0	35	30	0
16 Août 1778.....	70	21	0	191	11	0	34	55	0
18 Août.....	70	25	0	195	39	0	33	3	0
							Déclinaison Ouest.		
Byron.									
30 Octobre 1765.....	7	14	0	253	14	0	0	30	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER PACIFIQUE.

DÉCLINAISON A L'EST.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Surville.									
23 Septembre 1769.....	0	0	0	146	0	0	6	0	0
Byron.									
En Juillet 1765.....	1	18	0	183	49	0	11	15	0
Carteret.									
21 Septembre 1776.....	1	20	0	139	4	0	4	54	0
Bayli.									
20 Septembre 1776....	1	33	0	139	57	0	4	40	0
19 Septembre.....	1	45	0	140	37	0	4	40	0
21 Décembre 1777.....	1	48	0	200	15	0	5	31	0
Carteret.									
19 Septembre 1767.....	1	57	0	141	3	0	5	26	0
16 Septembre.....	2	19	0	143	6	0	6	30	0
Bougainville.									
En 1766.....	2	32	0	148	8	0	6	45	0
.....	3	10	0	149	44	0	7	15	0
Cook.									
20 Décembre 1776.....	3	13	0	201	7	0	4	57	40
.....	3	13	0	201	7	0	5	25	0
.....	3	13	0	201	7	0	5	42	53
20 Décembre 1777.....	3	13	0	201	7	0	5	49	50
.....	3	13	0	201	42	0	5	50	10
.....	3	13	0	201	7	0	6	5	30
.....	3	13	0	201	7	0	6	9	10
19 Décembre.....	3	31	0	201	16	0	5	28	55

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
19 Décembre.....	3	51	0	201	16	0	5	19	40
.....	3	51	0	201	16	0	5	22	20
.....	3	51	0	201	16	0	5	24	50
.....	3	51	0	201	16	0	6	4	40
.....	3	51	0	201	16	0	5	11	40
Bougainville.									
En 1766.....	4	5	0	151	31	0	7	10	0
Bayli.									
19 Décembre 1777.....	4	39	0	202	2	0	5	7	0
Carteret.									
26 Août 1767.....	4	46	0	150	52	0	7	14	0
.....	5	0	0	149	54	0	5	20	0
Bougainville.									
En 1766.....	5	0	0	152	30	0	7	15	0
Carteret.									
24 Août 1767.....	5	7	0	152	43	0	6	25	0
.....	5	7	0	152	43	0	6	30	0
Bayli.									
18 Décembre 1777.....	5	13	0	201	45	0	4	38	0
Carteret.									
22 Août 1777.....	6	24	0	155	7	0	7	42	0
Surville.									
7 Septembre 1769	6	36	0	151	27	0	9	0	0
Cook.									
17 Décembre 1776.....	7	21	0	201	56	0	4	49	5
.....	7	21	0	201	56	0	5	0	0
.....	7	21	0	201	56	0	5	15	0
.....	7	21	0	201	56	0	5	20	56
.....	7	21	0	201	56	0	5	28	0
.....	7	21	0	201	56	0	5	39	0
.....	7	21	0	201	56	0	5	54	30
Bougainville.									
En 1766.....	7	36	0	153	15	0	7	34	0
Carteret.									
20 Août 1767.....	7	53	0	156	31	0	8	31	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
20 Août	7	56	0	156	31	0	8	20	0
Cook.									
2 Août 1777.....	8	1	0	202	10	0	3	50	0
16 Décembre 1767.....	8	1	0	202	10	0	4	14	45
.....	8	1	0	202	10	0	4	15	0
.....	8	1	0	202	10	0	4	53	42
.....	8	1	0	202	10	0	5	35	30
Cook et Bayli.									
16 Décembre 1777.....	8	1	0	202	10	0	5	43	0
.....	8	1	0	202	10	0	5	43	40
Byron.									
29 Juin 1765.....	8	13	0	181	15	0	10	10	0
Carteret.									
19 Août 1767.....	8	52	0	158	16	0	8	30	0
Bayli.									
15 Décembre 1777.....	9	10	0	202	55	0	5	50	0
Cook.									
30 Mars 1774.....	9	24	0	231	34	0	1	27	0
1 Avril 1774.....	9	30	0	227	39	0	4	3	0
5 Mars.....	9	32	0	220	57	0	4	27	0
Bayli.									
3 Avril 1774.....	9	32	0	224	17	0	4	40	0
Carteret.									
28 Juillet 1767.....	9	50	0	186	9	0	9	4	0
30 Juillet.....	9	50	0	182	7	0	9	32	0
1 Août	9	53	0	178	2	0	10	4	0
18 Août	9	58	0	160	32	0	8	30	0
26 Juillet.....	10	1	0	190	33	0	9	0	0
Cook.									
14 Décembre 1776.....	10	9	0	203	3	0	4	6	30
.....	10	9	0	203	3	0	4	46	40
.....	10	9	0	203	33	0	5	13	0
.....	10	9	0	203	3	0	6	8	50
Bayli.									
14 Décembre	10	9	0	203	3	0	5	8	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Carteret.									
2 Août 1767.....	10	9	0	176	33	0	10	30	0
Cook.									
29 Mars 1774.....	10	10	0	240	35	0	1	57	0
Carteret.									
4 Août 1767.....	10	22	0	174	45	0	10	54	0
Cook.									
14 Décembre 1777.....	10	29	0	203	18	0	5	38	26
Carteret.									
5 Août 1767.....	10	35	0	173	25	0	10	52	0
.....	10	35	0	173	25	0	11	14	0
Cook.									
21 Août 1770.....	10	36	0	140	11	0	3	6	0
Carteret.									
5 Août 1767.....	10	40	0	162	24	0	11	0	0
Bayli.									
14 Décembre 1777.....	10	46	0	203	2	0	5	45	0
Cook.									
14 Décembre 1777.....	10	49	0	203	33	0	5	10	0
14 Décembre 1774.....	10	49	0	203	33	0	5	52	40
14 Décembre 1777.....	10	49	0	203	33	0	6	26	30
.....	10	49	0	203	33	0	6	28	50
.....	10	49	0	203	33	0	6	29	40
Bayli.									
14 Décembre 1777.....	10	49	0	203	33	0	5	32	30
.....	10	49	0	203	33	0	6	20	0
Carteret.									
11 Août 1767.....	10	49	0	164	35	0	10	38	0
7 Août.....	10	52	0	169	58	0	11	17	0
9 Août.....	10	56	0	168	35	0	10	2	0
.....	11	2	0	168	50	0	10	27	0
Bayli.									
13 Décembre 1777.....	11	20	0	203	25	0	6	15	0
Bougainville.									
En 1766.....	11	48	0	149	35	0	6	16	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S	D.	M.	S.	D.	M.	S.
En 1766.....	11	56	0	148	18	0	6	1	0
.....	12	13	0	151	8	0	7	2	0
Carteret.									
25 Juillet 1767.....	12	13	0	192	45	0	9	30	0
.....	12	13	0	192	45	0	9	40	0
Byron.									
20 Juin 1765.....	12	33	0	189	48	0	9	15	0
Cook.									
17 Août 1770.....	12	38	0	140	50	0	4	9	0
Bougainville.									
En 1766.....	13	10	0	149	40	0	5	29	0
Cook.									
11 Décembre 1776.....	13	15	0	204	11	0	4	42	15
.....	13	15	0	204	11	0	5	1	45
.....	13	15	0	204	11	0	5	11	0
.....	13	15	0	204	11	0	5	21	10
.....	13	15	0	204	11	0	5	39	45
.....	13	15	0	204	11	0	5	48	0
Bayli et Cook.									
.....	13	15	0	204	11	0	5	44	15
Wallis.									
17 Août 1767.....	13	18	0	180	35	0	10	0	0
Byron.									
7 Juin 1765.....	14	5	0	212	37	0	4	30	0
Cook.									
10 Décembre 1777.....	14	7	0	205	5	0	6	8	30
.....	14	9	0	205	5	0	6	4	40
Byron.									
8 Juin 1765.....	14	10	0	212	43	0	4	3	0
Cook.									
10 Décembre 1776.....	14	17	0	205	5	0	4	45	30
.....	14	17	0	205	5	0	5	13	30
.....	14	17	0	205	5	0	5	35	24
.....	14	17	0	205	5	0	5	38	0
.....	14	17	0	205	5	0	5	42	15

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Déclinaison Est.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Byron.			
16 Juin 1765.....	14 28 0	201 12 0	7 40 0
Bougainville.			
En 1766.....	14 28 0	182 37 0	9 21 0
.....	14 35 0	164 51 0	9 47 0
Cook.			
26 Mars 1774.....	14 41 0	237 15 0	2 10 0
Byron.			
En Juin 1765.....	14 41 0	208 20 0	5 0 0
Bougainville.			
En 1766.....	14 42 0	201 40 0	7 0 0
.....	14 44 0	185 30 0	9 30 0
Bayli.			
9 Décembre.....	14 47 0	205 22 0	6 17 0
Bougainville.			
En 1766.....	14 55 0	189 51 0	9 21 0
.....	14 56 0	197 39 0	7 33 0
Byron.			
13 Juin 1765.....	15 0 0	205 42 0	5 30 0
Bougainville.			
En 1766.....	15 3 0	194 21 0	8 15 0
.....	15 4 0	205 0 0	6 30 0
.....	15 4 0	191 51 0	8 25 0
Bayli.			
15 Juillet 1774.....	15 9 0	168 51 0	11 3 0
Bougainville.			
En 1766.....	15 10 0	196 45 0	7 36 0
.....	15 13 0	168 10 0	10 40 0
Bayli.			
9 Décembre 1777.....	15 30 0	205 21 0	7 0 0
Bougainville.			
En 1766.....	15 33 0	148 44 0	6 4 0
Bayli.			
14 Juillet 1773.....	15 39 0	170 10 0	10 14 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	15	40	0	152	8	0	9	4	0
Wallis.									
13 Août 1767.....	15	50	0	182	25	0	9	0	0
.....	15	53	0	181	42	0	10	0	0
Marion et Crozet.									
En 1772.....	16	0	0	182	30	0	8	30	0
Carteret.									
23 Juillet 1767.....	16	22	0	195	3	0	6	5	0
Cook.									
13 Juillet 1773.....	16	25	0	171	6	0	10	46	0
Wallis.									
31 Juillet 1767.....	16	28	0	202	5	0	8	0	0
30 Juillet.....	16	46	0	202	22	0	7	40	0
Cook.									
24 Mars 1774.....	17	7	0	240	35	0	1	56	0
13 Juillet 1773.....	17	16	0	213	41	0	6	48	0
8 Mars 1769.....	17	23	0	211	41	0	4	54	0
Wallis.									
2 Juillet	17	28	0	207	35	0	6	0	0
28 Juillet 1767:.....	17	28	0	206	31	0	6	30	0
4 Juillet.....	17	30	0	207	35	0	5	30	0
Bougainville.									
En 1766.....	17	32	0	208	0	0	4	40	0
Cook.									
8 Juin 1773.....	17	32	0	201	34	0	7	55	0
Cook et Bayli.									
18 Septembre 1773....	17	41	0	203	14	0	7	50	0
Bougainville.									
En 1766.....	17	43	0	214	17	0	4	10	0
Cook.									
4 Août 1773.....	17	45	0	209	19	0	5	10	0
Bougainville.									
En 1766.....	17	47	0	215	26	0	4	50	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
7 Mars 1769.....	17	48	0	210	0	0	6	32	0
9 Juin 1774.....	17	48	0	200	52	0	8	10	0
Wallis.									
27 Juillet 1767.....	17	48	0	208	20	0	6	0	0
17 Juin.....	17	51	0	210	5	0	6	0	0
Cook.									
16 Avril 1777.....	18	4	0	161	7	0	6	45	35
21 Septembre 1773.....	18	4	0	201	13	0	7	26	0
16 Avril 1777.....	18	4	0	161	7	0	7	39	25
16 Juin 1774.....	18	4	0	194	25	0	9	16	0
Cook et Bayli.									
16 Avril 1777.....	18	4	0	161	7	0	7	14	15
.....	18	4	0	161	7	0	7	20	5
Bayli.									
16 Avril 1777.....	18	4	0	161	7	0	7	36	50
.....	18	3	0	161	7	0	8	18	15
Cook.									
16 Avril 1777.....	18	5	0	161	14	0	7	59	30
Cook et Bayli.									
16 Avril 1777.....	18	6	0	161	21	0	8	0	25
Bayli.									
16 Avril 1777.....	18	6	0	161	21	0	8	24	30
.....	18	6	0	161	21	0	8	46	50
.....	18	6	0	161	21	0	8	56	45
Cook.									
16 Avril 1777.....	18	6	0	161	21	0	8	14	15
.....	18	6	0	161	21	0	8	37	0
Bayli.									
14 Avril 1777.....	18	7	0	192	55	0	7	27	0
11 Avril.....	18	15	0	193	39	0	8	2	0
Cook.									
5 Mars 1769.....	18	23	0	206	23	0	5	38	0
19 Juin 1774.....	18	25	0	190	24	0	10	22	30
11 Juillet 1773.....	18	26	0	172	35	0	10	22	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
10 Octobre 1765.....	18	33	0	220	45	0	5	10	0
Cook.									
14 Juin 1774.....	18	35	0	194	50	0	9	15	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	39	0	211	53	0	5	43	0
.....	18	40	0	222	18	0	3	40	0
Cook.									
22 Septembre 1777.....	18	40	0	200	17	0	7	56	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	41	0	224	34	0	3	53	0
Byron.									
21 Juillet 1765.....	18	43	0	199	8	0	7	38	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	45	0	225	1	0	3	14	0
Cook.									
4 Mars 1769.....	18	47	0	218	7	0	22	54	0
Bougainville.									
En 1766.....	18	50	0	232	58	0	2	33	0
.....	18	53	0	228	52	0	2	32	0
.....	18	54	0	227	36	0	2	50	0
Wallis.									
13 Juin 1767.....	19	0	0	217	29	0	7	0	0
Bayli.									
8 Avril 1777.....	19	1	0	195	41	0	7	52	0
.....	19	2	0	158	15	0	7	36	0
Cook.									
8 Avril 1777.....	19	2	0	158	15	0	7	10	45
.....	19	2	0	161	15	0	7	22	0
.....	10	2	0	158	15	0	7	26	27
24 Janvier.....	19	2	0	158	15	0	7	22	30
8 Avril.....	19	2	0	158	15	0	7	58	0
Carteret.									
20 Juillet 1767.....	19	8	0	201	20	0	7	9	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Wallis.									
.....	19	11	0	217	29	0	7	10	0
Cook.									
5 Juin 1770.....	19	12	0	144	35	0	5	35	0
Bayli.									
7 Avril.....	19	12	0	196	5	0	7	56	0
Wallis.									
8 Juin 1767.....	19	18	0	219	21	0	5	20	0
13 Juin.....	19	18	0	217	1	0	7	0	0
11 Juin.....	19	20	0	219	5	0	6	0	0
Cook et Bayli.									
24 Avril 1777	19	22	0	168	17	0	9	42	0
Bayli.									
24 Avril 1777.....	19	22	0	168	17	0	9	56	0
.....	19	22	0	168	17	0	11	9	0
Cook.									
24 Avril 1777.....	19	22	0	168	17	0	9	58	30
.....	19	22	0	168	17	0	10	34	57
.....	19	22	0	168	17	0	12	13	15
Wallis.									
7 Juin 1767.....	19	26	0	219	39	0	6	0	0
3 Juin.....	19	30	0	227	45	0	5	40	0
Bayli.									
6 Avril.....	19	32	0	196	46	0	7	27	0
Cook.									
18 Mai 1777.....	19	46	0	183	12	0	9	21	22
23 Mai 1777.....	19	46	0	183	14	0	10	44	52
3 Juillet.....	19	47	0	179	33	0	12	28	0
Carteret.									
19 Juillet 1767.....	19	50	0	203	36	0	6	8	0
Bayli.									
10 Juillet 1774.....	19	53	0	173	10	0	11	11	0
Cook et Bayli.									
5 Juin 1777.....	19	53	0	182	35	0	8	29	0
2 Juin.....	19	53	30	192	31	0	7	46	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
2, 5 & 6 Juin 1777...	19	53	36	182	35	0	8	48	0
6 Juin.....	19	53	40	182	35	0	10	9	0
Cook.									
6 Juin 1777	19	55	0	183	15	0	9	7	20
1 Avril 1777.....	19	59	0	156	2	0	3	42	15
.....	19	57	0	156	2	0	8	20	51
Bayli.									
1 Avril 1777.....	19	57	0	156	2	0	8	18	10
.....	19	57	0	156	2	0	8	23	25
.....	19	57	0	156	2	0	8	23	35
.....	19	57	0	156	2	0	8	23	45
.....	19	57	0	156	2	0	8	53	55
2 Avril 1777.....	20	2	0	198	32	0	7	2	0
3 Avril.....	20	2	0	198	26	0	7	56	0
1 Avril.....	20	4	0	198	34	0	7	44	0
13 Mai.....	20	9	0	192	53	0	11	1	0
Marion et Crozet.									
En 1772.....	20	9	0	182	0	0	11	45	0
Bayli.									
14 Mai 1777.....	20	11	0	192	31	0	10	13	0
Cook.									
9 Juillet 1773.....	20	14	0	173	50	0	13	8	0
13 Mai.....	20	15	0	172	20	0	7	25	45
.....	20	15	0	172	20	0	7	36	50
.....	20	15	0	172	18	0	7	53	35
.....	20	15	0	172	20	0	7	55	25
.....	20	15	0	172	20	0	8	13	0
Cook et Bayli.									
13 Mai 1777.....	20	15	0	172	18	0	7	15	50
.....	20	15	0	172	20	0	8	9	25
.....	20	15	0	172	20	0	8	32	0
16 Avril.....	20	15	0	172	20	0	8	33	0
Bayli.									
13 Mai 1777.....	20	15	0	172	20	0	8	3	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
27 Juin 1764.....	20	15	0	183	4	0	9	47	0
Wallis.									
23 Mai 1767.....	20	20	0	245	29	0	5	0	0
Cook.									
26 Juin 1774.....	20	23	0	183	29	0	12	6	0
24 Juin.....	20	24	0	183	56	0	11	40	0
Carteret.									
12 Juillet 1767.....	20	36	0	211	56	0	4	40	0
Cook.									
5 Juillet.....	20	37	0	178	15	0	12	30	0
Carteret.									
12 Juillet 1767.....	20	38	0	211	35	0	5	0	0
Wallis.									
1 Juin 1767.....	20	38	0	229	50	0	5	9	0
Cook.									
27 Septembre 1773.....	20	40	0	191	23	0	11	42	0
Cook et Bayli.									
8 Juillet 1774.....	20	42	0	174	53	0	12	59	0
Bayli.									
30 Mars 1777.....	20	43	0	198	55	0	6	50	0
.....	20	43	0	198	54	0	7	5	30
Cook.									
30 Mars 1777.....	20	43	0	198	56	0	7	21	0
Cook et Bayli.									
6 Juillet 1774.....	20	56	0	177	5	0	12	44	0
Wallis.									
20 Mai 1767.....	21	0	0	250	48	0	5	0	0
Cook.									
21 Mars 1774.....	21	1	0	243	37	0	3	4	0
Bayli.									
28 Septembre 1773.....	21	3	0	189	6	0	9	44	0
31 Mars.....	21	4	0	198	32	0	9	58	0
Carteret.									
13 Juillet 1767.....	21	7	0	210	21	0	5	46	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
19 Octobre 1765.....	21	10	0	233	18	0	0	0	0
Bayli.									
30 Septembre 1773.....	21	10	0	185	2	0	9	44	0
Cook.									
1 Octobre 1770.....	21	21	0	183	21	0	10	42	0
Carteret.									
10 Juillet 1767.....	21	38	0	215	59	0	4	20	0
15 Juillet.....	21	46	0	206	45	0	6	23	0
Cook.									
3 Août 1773.....	22	8	0	223	56	0	4	54	0
Carteret.									
22 Juillet 1767.....	22	22	0	206	26	0	6	34	0
Cook.									
19 Juillet 1777.....	22	25	0	184	1	0	8	41	51
Bayli.									
18 Juillet 1777.....	22	35	0	183	25	0	8	43	0
27 Mars 1777.....	22	48	0	156	55	0	8	23	0
.....	22	50	0	156	33	0	8	19	15
.....	22	50	0	156	13	0	8	44	0
.....	22	50	0	156	33	0	9	52	40
Cook et Bayli.									
27 Mars 1777.....	22	50	0	156	33	0	8	11	45
.....	22	50	0	156	13	0	8	22	15
.....	22	50	0	156	33	0	9	3	30
.....	22	50	0	156	33	0	9	5	20
Cook.									
27 Mars 1777.....	22	50	0	156	33	0	6	42	30
.....	22	50	0	156	33	0	7	53	15
.....	22	50	0	156	33	0	8	14	20
.....	22	50	0	156	13	0	8	42	23
.....	22	50	0	156	33	0	8	36	40
.....	22	50	0	156	33	0	9	26	15
18 Mars 1776.....	23	0	0	244	34	0	3	5	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
14 Mai 1765.....	23	0	0	256	7	0	3	20	0
Bougainville.									
En 1766.....	23	10	0	243	27	0	2	30	0
Cook.									
2 Octobre 1774.....	23	18	0	167	9	0	9	27	0
Bayli.									
26 Mars.....	23	21	0	198	20	0	8	17	0
Bougainville.									
En 1766.....	23	24	0	246	7	0	0	39	0
.....	23	30	0	247	29	0	3	0	0
Bayli.									
16 Mars.....	23	36	0	158	13	0	9	52	40
15 Mars 1777.....	23	46	0	156	22	0	8	52	20
25 Mars.....	23	46	0	156	22	0	8	22	45
8 Juillet 1767.....	23	46	0	217	40	0	5	56	0
Cook et Bayli.									
21 Mars 1777.....	23	46	0	156	22	0	7	47	35
25 Mars.....	23	46	0	156	22	0	8	22	45
21 Mars.....	23	46	0	156	22	0	8	31	0
25 Mars.....	23	46	0	156	22	0	8	31	45
Cook.									
25 Mars 1777.....	23	46	0	156	22	0	8	16	15
.....	23	46	0	156	22	0	8	26	5
.....	23	46	0	156	22	0	8	40	55
Bougainville.									
En 1766.....	24	0	0	248	19	0	2	4	0
Carteret.									
17 Juin 1767.....	24	4	0	244	58	0	1	51	0
Bayli.									
7 Août 1777.....	24	6	0	207	5	0	7	30	0
Cook.									
7 Juillet 1767.....	24	10	0	217	40	0	4	2	0
Carteret.									
7 Juillet 1767.....	24	10	0	217	40	0	5	12	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
10 Mai 1765.....	24	30	0	259	50	0	4	45	0
Carteret.									
6 Juillet 1767.....	24	32	0	219	4	0	4	16	0
3 Juillet.....	25	0	0	221	19	0	2	30	0
Cook et Bayli.									
7 Août 1777.....	25	0	0	206	50	0	7	49	40
Cook.									
7 Août 1777.....	25	0	0	206	50	0	6	1	20
.....	25	0	0	206	50	0	6	39	10
.....	25	0	0	206	50	0	7	20	44
.....	25	0	0	206	50	0	7	52	10
Carteret.									
2 Juillet 1767.....	25	2	0	223	57	0	2	46	0
8 Avril 1777.....	25	17	0	205	21	0	7	9	30
Cook et Bayli.									
6 Août 1777.....	25	17	0	205	21	0	8	9	0
Bayli.									
6 Août 1777.....	25	17	0	205	21	0	7	6	0
.....	25	17	0	207	16	0	8	12	0
Cook.									
6 Août 1777.....	25	17	0	205	21	0	7	37	27
.....	25	17	0	205	21	0	7	45	25
.....	25	17	0	205	31	0	8	40	5
Carteret.									
4 Juillet 1767.....	25	24	0	220	17	0	3	43	0
Bayli.									
23 Mars.....	25	31	0	198	20	0	8	44	0
Bougainville.									
En 1766.....	25	34	0	250	15	0	3	39	0
Bayli.									
24 Juillet 1777.....	25	45	0	189	52	0	8	18	0
Carteret.									
1 Juin 1767.....	25	51	0	273	22	0	8	8	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En 1766.....	25	56	0	251	0	0	3	37	0
Cook.									
27 Juillet 1777.....	25	57	0	192	35	0	8	12	34
Carteret.									
2 Juillet 1767.....	26	0	0	226	40	0	2	32	0
Cook.									
18 Mars 1774.....	26	5	0	246	3	0	2	34	0
Bayli.									
21 Mars.....	26	15	0	198	55	0	8	53	0
Carteret.									
10 Juin 1766.....	26	26	0	275	20	0	8	10	0
.....	26	30	0	259	10	0	5	40	0
Cook.									
26 Juillet.....	26	41	0	191	35	0	7	52	26
Bayli.									
5 Août.....	26	44	0	204	14	0	8	6	0
Bougainville.									
En 1766.....	26	50	0	253	5	0	3	0	0
Carteret.									
12 Juin 1767.....	26	53	0	257	14	0	4	13	0
Bayli.									
21 Mars 1777.....	27	1	0	156	3	0	7	3	30
20 Mars.....	27	1	0	156	3	0	8	23	20
21 Mars.....	27	1	0	156	3	0	8	57	40
.....	27	1	0	156	3	0	9	43	0
.....	27	1	0	156	3	0	8	23	45
Cook et Bayli.									
21 Mars 1777.....	27	1	0	156	3	0	8	9	0
.....	27	1	0	156	3	0	9	1	40
.....	27	1	0	156	3	0	9	7	0
Cook.									
21 Mars 1777.....	27	1	0	156	3	0	7	38	0
.....	27	1	0	156	3	0	8	35	15
.....	27	1	0	156	2	0	8	53	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
8 Mars 1774.....	27	4	0	253	37	0	4	31	0
Carteret.									
8 Juin.....	27	20	0	259	44	0	5	45	0
7 Juin 1766.....	27	23	0	260	19	0	5	45	0
Bougainville.									
En 1766.....	27	30	0	256	0	0	3	40	0
Bayli.									
21 Mars.....	27	34	0	198	58	0	8	54	0
Cook.									
1 Août 1777.....	27	43	0	200	16	0	7	7	37
Bougainville.									
En 1766.....	27	47	0	257	30	0	4	15	0
Cook.									
31 Juillet.....	27	51	0	198	25	0	7	44	7
27 Juillet 1773.....	27	53	0	222	18	0	5	0	0
Carteret.									
20 Juin 1767.....	28	4	0	241	6	0	2	9	0
18 Juin.....	28	7	0	243	40	0	2	0	0
16 Juin.....	28	11	0	246	20	0	2	0	0
Wallis.									
4 Mai.....	28	12	0	261	5	0	6	0	0
Cook.									
7 Mars 1774.....	28	20	0	255	32	0	4	45	0
8 Octobre 1773.....	28	25	0	168	1	0	13	19	0
Bayli.									
14 Octobre 1773.....	28	38	0	177	48	0	11	11	0
20 Mars 1777.....	28	46	0	198	20	0	10	9	0
.....	28	50	0	156	17	0	8	59	15
.....	28	50	0	156	17	0	9	48	25
20 Mars 1777.....	28	50	0	156	17	0	11	12	45
Cook.									
20 Mars 1777.....	28	50	0	156	17	0	9	8	0
.....	28	50	0	156	17	0	9	24	0
.....	28	50	0	156	17	0	9	39	54
26 Juillet 1773.....	28	53	0	222	5	0	5	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
9 Octobre..... Bayli.	28	54	0	166	56	0	13	9	0
10 Octobre 1774..... Cook et Bayli.	28	57	0	165	35	0	11	9	0
19 Septembre 1769..... Bayli.	29	0	0	198	6	0	8	32	0
23 Juillet..... Cook.	29	22	0	223	23	0	5	34	0
6 Mars 1774..... Carteret.	29	33	0	256	32	0	4	47	0
28 Avril 1767..... Cook.	29	45	0	277	45	0	9	40	0
15 Octobre 1773.....	30	15	0	177	29	0	11	14	0
22 Juillet 1773.....	31	6	0	223	23	0	5	21	0
2 Mars 1774..... Bayli.	31	12	0	255	6	0	4	36	0
16 Octobre 1774..... Cook.	31	41	0	177	7	0	11	2	0
10 Mai 1770.....	32	2	0	149	35	0	8	0	0
11 Mai.....	32	2	0	150	5	0	9	10	0
1 Mars 1774..... Bayli.	32	28	0	254	48	0	3	45	0
17 Octobre 1773..... Cook.	32	41	0	178	3	0	10	49	0
13 Octobre..... Wallis.	32	55	0	165	55	0	10	0	0
26 Décembre 1766..... Bayli.	33	18	0	286	5	0	22	50	0
24 Septembre 1769.....	33	18	0	184	44	0	10	48	0
16 Mars.....	33	36	0	158	13	0	8	56	0
.....	33	36	0	158	13	0	9	55	40
Cook.									
16 Mars 1777.....	33	36	0	158	13	0	9	22	40
.....	33	36	0	158	13	0	9	24	0
.....	33	36	0	158	13	0	9	30	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
16 Mars 1777.....	33	36	0	158	13	0	10	18	47
.....	33	36	0	158	13	0	10	34	20
.....	33	36	0	158	13	0	10	36	20
.....	33	36	0	158	17	0	11	31	0
Cook et Bayli.									
16 Mars 1777.....	33	36	0	158	13	0	10	41	20
.....	33	36	0	158	13	0	12	44	40
Carteret.									
En Mai 1767.....	33	40	0	278	43	0	11	0	0
En Mai 1767.....	33	45	0	276	49	0	10	24	0
Bayli.									
18 Octobre 1773.....	33	48	0	177	56	0	10	49	0
15 Mars 1777.....	33	52	0	196	6	0	10	7	0
Cook.									
25 Avril 1770.....	34	29	0	148	59	0	8	48	0
27 Février 1774.....	34	53	0	255	2	0	3	44	0
24 Avril 1770.....	35	19	0	147	53	0	7	54	0
4 Octobre 1774.....	35	26	0	168	48	0	10	0	0
Bayli.									
15 Octobre 1774.....	35	32	0	168	30	0	10	18	0
Cook.									
19 Avril 1770.....	35	50	0	147	6	0	3	17	0
21 Avril.....	36	18	0	147	40	0	10	42	0
Cook et Bayli.									
29 Septembre 1773.....	36	18	0	147	40	0	10	42	0
Bayli.									
19 Juillet 1777.....	36	34	0	224	28	0	5	33	0
Bougainville.									
En 1766.....	36	36	0	266	50	0	10	21	0
Cook.									
26 Février 1774.....	36	37	0	255	42	0	5	53	0
Bayli.									
23 Février 1774.....	37	40	0	260	33	0	9	51	0
Cook et Bayli.									
5 Octobre 1769.....	37	0	0	184	8	0	12	50	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
5 Octobre 1769.....	37	0	0	183	35	0	14	2	0
6 Octobre.....	37	0	0	176	35	0	15	4	0
24 Février 1774.....	37	25	0	259	25	0	8	10	0
25 Février.....	37	52	0	255	57	0	6	38	0
21 Février.....	37	54	0	263	30	0	8	0	0
18 Juillet 1773.....	37	56	0	224	17	0	5	29	0
Carteret.									
30 Août 1769.....	38	20	0	210	29	0	7	9	0
Cook.									
11 Avril 1770.....	38	30	0	154	35	0	13	48	0
10 Avril.....	38	51	0	154	52	0	11	25	0
21 Octobre 1773.....	39	6	0	176	13	0	1	12	0
7 Mars 1777.....	39	17	0	165	3	0	10	11	35
.....	39	17	0	165	3	0	10	56	5
.....	39	17	0	165	3	0	11	13	36
.....	39	17	0	165	3	0	11	29	45
.....	39	17	0	165	3	0	11	53	15
Bayli.									
7 Mars.....	39	17	0	165	3	0	11	2	40
.....	39	17	0	165	3	0	11	10	20
.....	39	17	0	165	3	0	12	6	0
Cook et Bayli.									
7 Mars 1777.....	39	17	0	165	3	0	10	59	0
Bayli.									
5 Mars 1777.....	39	19	0	186	20	0	9	42	0
9 Mars 1777.....	39	23	0	192	23	0	8	55	0
Cook.									
13 Avril 1770.....	39	23	0	153	33	0	12	27	0
10 Mars 1777.....	39	24	0	161	33	0	10	29	45
.....	39	24	0	161	33	0	10	56	25
.....	39	24	0	161	33	0	11	48	57
.....	39	24	0	161	33	0	9	36	50
Cook et Bayli.									
10 Mars 1777.....	39	24	0	161	33	0	9	0	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
10 Mars 1777.....	39	24	0	161	33	0	10	56	30
.....	39	24	0	161	33	0	10	41	45
.....	39	24	0	161	33	0	12	55	5
Bayli.									
10 Mars 1777.....	39	24	0	161	13	0	9	54	25
8 Mars 1777.....	39	25	0	189	50	0	10	46	0
11 Mars.....	39	30	0	196	9	0	10	15	0
Cook.									
14 Avril 1770.....	39	30	0	151	37	0	11	30	0
Bayli.									
5 Mars 1777.....	39	45	0	186	15	0	10	9	0
Cook.									
4 Mars 1774.....	39	56	0	256	36	0	4	50	0
Bayli.									
10 Février 1777.....	40	22	0	169	20	0	13	21	0
Cook et Bayli.									
10 Février 1777.....	40	36	0	171	9	0	12	42	12
.....	40	36	0	171	9	0	12	51	50
Cook.									
10 Février 1777.....	40	36	0	171	9	0	13	1	20
.....	40	36	0	171	9	0	13	47	0
11 Avril 1770.....	40	46	0	171	9	0	13	50	10
10 Février 1777.....	40	46	0	171	9	0	14	3	5
Bayli.									
5 Mars 1777.....	41	25	0	268	45	0	11	9	0
Cook.									
5 Mars 1777.....	41	25	0	168	45	0	11	42	30
.....	41	25	0	168	45	0	11	59	0
.....	41	25	0	168	45	0	12	8	52
.....	41	25	0	167	45	0	13	45	0
27 Février.....	41	29	0	174	49	0	13	28	45
.....	41	29	0	174	49	0	13	37	30
Cook et Bayli.									
27 Février 1777.....	41	29	0	174	49	0	12	44	5
.....	41	29	0	174	49	0	12	49	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
27 Février 1777.....	41	29	0	174	49	0	12	58	45
.....	41	29	0	174	49	0	13	0	15
Bougainville.									
En 1766.....	42	3	0	225	20	0	3	2	0
Cook.									
7 Février 1777.....	42	4	0	165	7	0	12	38	0
.....	42	4	0	165	7	0	13	0	55
.....	42	4	0	165	7	0	13	2	0
.....	42	4	0	165	7	0	13	29	0
5 Février.....	42	29	0	161	44	0	11	34	30
Wallis.									
21 Avril 1767.....	42	30	0	261	49	0	12	0	0
Cook.									
13 Juillet 1770.....	43	2	0	218	35	0	5	37	0
30 Janvier 1777.....	43	15	0	146	17	0	5	13	25
11 Juillet 1773.....	43	16	0	217	26	0	5	18	0
28 Janvier 1777.....	43	21	0	145	28	0	5	53	16
5 Mars 1774.....	43	25	0	168	45	0	12	6	0
21 Janvier.....	43	27	0	140	10	0	1	4	25
.....	43	27	0	140	10	0	1	15	40
.....	43	27	0	141	10	0	1	58	0
.....	43	27	0	140	10	0	2	44	50
Cook et Bayli.									
7 Février.....	43	27	0	173	34	0	12	52	0
Bayli.									
20 Janvier 1776.....	43	28	0	138	17	0	2	0	0
.....	43	29	0	138	25	0	2	9	0
22 Janvier 1777.....	43	30	0	141	35	0	4	0	0
Cook.									
21 & 22 Janvier 1777...	43	30	0	140	18	0	2	28	44
.....	43	30	0	140	18	0	2	45	38
.....	43	30	0	140	18	0	3	5	33
22 Janvier.....	43	33	0	140	26	0	2	50	20
11 Juillet 1773.....	43	34	0	205	39	0	5	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
21 Janvier 1777.....	43	35	0	139	59	0	1	50	0
.....	43	35	0	159	17	0	12	6	0
24 Janvier 1777.....	43	41	0	145	0	0	5	56	0
Cook.									
4 Février 1777.....	43	43	0	159	3	0	9	37	10
4 Février.....	43	43	0	159	3	0	11	27	0
.....	43	43	0	159	3	0	12	13	30
24 Janvier.....	43	45	30	145	51	10	7	25	13
10 Juillet 1773.....	43	46	0	213	22	0	3	0	0
Furneau.									
7 Mars 1773.....	43	47	0	138	40	0	1	13	0
Cook.									
23 Janvier 1777.....	43	48	0	144	31	0	5	51	13
6 Février 1777.....	43	49	0	162	38	0	12	40	0
.....	43	49	0	163	6	0	13	18	16
.....	43	49	0	162	38	0	14	26	20
Cook et Bayli.									
6 Février 1777.....	43	49	0	162	38	0	12	43	40
Bayli.									
.....	43	49	0	162	38	0	13	22	5
Cook.									
4 Février 1777.....	43	54	0	153	22	0	12	0	0
Carteret.									
28 Avril 1767.....	44	27	0	276	11	0	15	10	0
Cook.									
22 Juin 1773.....	44	41	0	195	12	0	10	19	0
2 Février 1777.....	44	51	0	153	22	0	7	36	44
En Mai 1773.....	45	47	26	163	53	0	13	49	0
Carteret.									
26 Avril 1767.....	45	47	26	276	13	0	16	17	0
Bougainville.									
En 1766.....	46	33	0	285	0	0	19	16	0
Cook.									
15 Juin 1773.....	46	46	0	183	35	0	11	24	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
23 Mars 1773.....	47	46	0	159	22	0	13	7	0
11 Janvier 1774.....	47	51	0	235	23	0	2	34	0
Carteret.									
20 Avril 1767.....	48	4	0	276	39	0	17	20	0
Cook.									
15 Février 1777.....	49	0	0	261	57	0	10	20	0
8 Janvier 1774.....	49	7	0	226	23	0	6	26	0
Carteret.									
18 Avril 1767.....	49	18	0				17	36	0
Cook.									
12 Janvier 1774.....	49	32	0	246	43	0	4	0	0
17 Février.....	49	32	0	262	24	0	12	42	0
22 Mars 1773.....	49	55	0	157	3	0	13	59	0
Bougainville.									
En 1766.....	50	2	0	276	54	0	18	0	0
Cook.									
13 Février 1774.....	50	13	0	261	34	0	14	30	0
5 Décembre 1773.....	50	15	0	177	19	0	18	25	0
12 Février 1774.....	50	15	0	262	17	0	13	30	0
7 Janvier 1774.....	50	36	0	224	17	0	6	36	0
Bayli.									
15 Novembre 1774.....	51	12	0	184	18	0	9	52	0
Byron.									
10 Janvier 1765.....	51	31	0	278	51	0	20	0	0
8 Janvier.....	51	50	0	277	49	0	20	0	0
Bayli.									
6 Janvier 1774.....	52	0	0	222	3	0	7	7	0
Cook.									
20 Mars 1773.....	52	22	0	152	28	0	13	40	0
Bougainville.									
En 1766.....	52	22	0	279	16	0	19	0	0
Wallis.									
4 Mars 1767, dans le Détroit de Magellan..	52	22	0				23	0	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Déclinaison Est.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Carteret.			
En Décembre 1766, à l'Isle Elisabeth, au Détroit de Magellan.....			22 56 0
Cook.			
En Décembre 1766.....	52 23 0	279 33 0	22 0 0
Wallis.			
17 Décembre 1766.....	52 24 0	288 29 0	23 0 0
Cook.			
18 Novembre 1774.....	52 44 0	187 38 0	10 26 0
Wallis.			
11 Avril 1767.....	52 46 0	281 35 0	23 0 0
18 Février, dans le Détroit de Magellan..	53 5 0		22 40 0
Cook.			
4 Novembre 1774.....	53 15 0	236 53 0	3 22 0
10 Février 1774.....	53 17 0	260 11 0	15 17 0
7 Décembre 1774.....	53 19 0	248 47 0	5 1 0
17 Décembre.....	53 21 0	281 18 0	20 6 0
Carteret.			
En Décembre 1766.....	53 23 0	289 33 0	22 50 0
Cook.			
14 Décembre 1774.....	53 25 0	270 39 0	14 14 0
16 Décembre 1773.....	53 26 0	277 58 0	17 38 0
Wallis.			
22 Décembre 1766.....	53 30 0	287 45 0	22 40 0
Au Cap Quade, Détroit de Magellan.....	53 33 0		22 35 0
Cook.			
1 Décembre 1774.....	53 40 0	174 27 0	9 58 0
Wallis.			
27 Décembre, Rade d'Yorck, au Détroit de Magellan.....	53 40 0		22 30 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
.....	53	43	0	286	5	0	22	30	0
20 Janvier, au Cap Hollande, même Détroit.	53	50	0				22	40	0
23 Janvier, au Cap Galant, même Détroit.....	53	50	0				22	40	0
Cook.									
2 Octobre 1774.....	54	56	0	232	35	0	1	28	0
En Décembre 1766, à la hauteur du Cap Forward, au Détroit de Magellan.....	54	3	0				22	10	0
Wallis.									
19 Janvier 1767, au même Cap.....	54	3	0				22	40	0
Cook.									
A la Rade d'Yorck, Détroit de Magellan....							22	22	0
Au Port de Famine, même Détroit.....							22	22	0
4 Février 1777.....	55	0	0	41	18	0	12	31	0
19 Mars 1773.....	55	1	0	149	36	0	11	19	0
25 Novembre 1774....	55	9	0	208	7	0	6	35	0
23 Novembre.....	55	46	0	201	31	0	9	24	0
En Janvier 1769.....	55	53	0	289	22	0	23	30	0
16 Janvier 1774.....	56	19	0	238	11	0	9	26	0
Bayli.									
2 Janvier 1774.....	57	58	0	220	23	0	11	12	0
Cook.									
16 Mars 1773.....	58	58	0	142	8	0	0	31	0
31 Décembre.....	59	40	0	222	24	0	13	9	0
26 Janvier 1769..	60	10	0	283	5	0	27	9	0
11 Décembre 1773.....	60	42	0	184	31	0	17	18	0
Cook et Bayli.									
22 Janvier 1774.....	62	9	0	244	41	0	10	59	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Est.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
23 Janvier 1774.....	62	22	0	247	13	0	11	55	0
29 Décembre 1773.....	62	24	0	219	42	0	13	46	0
20 Janvier 1774.....	62	34	0	241	11	0	10	24	0
3 Février 1774.....	62	42	0	257	51	0	22	55	0
2 Décembre 1773.....	62	46	0	187	9	0	19	13	0
Bayli.									
18 Décembre 1777.....	64	41	0	205	29	0	10	8	0
Cook.									
19 Décembre 1773.....	64	49	0	208	11	0	13	24	0
4 Février 1774.....	65	42	0	257	51	0	25	42	0
3 Février.....	66	23	0	222	28	0	15	26	0
2 Décembre 1773.....	66	36	0	248	5	0	18	20	0
29 Janvier 1774.....	70	0	0	250	30	0	24	18	0
							Déclinaison Ouest.		
Byron.									
30 Octobre 1765.....	7	14	0	253	14	0	0	30	0
Cook et Bayli.									
23 Mai 1777.....	19	46	0	171	56	0	10	19	0
.....	19	46	0	171	56	0	10	31	30
18 Mai	19	46	0	173	12	0	10	40	15
23 Mai	19	46	0	171	56	0	10	47	30
.....	19	46	0	171	56	0	10	53	30
Cook.									
18 Mai 1777.....	19	46	0	183	12	0	8	45	0
8 Mai	19	46	0	183	2	0	8	46	30
18 Mai	19	46	0	171	58	0	9	21	30
.....	19	46	0	171	58	0	9	28	45
23 Mai	19	46	0	161	44	0	11	44	45
6 Juin.....	19	55	0	171	55	0	8	56	30
.....	19	55	0	171	55	0	9	5	45
.....	19	55	0	171	55	0	8	35	30
.....	19	55	0	171	55	0	9	55	45

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Byron.									
22 Mai 1765.....	20	52	0	241	57	0	19	0	0
19 Octobre 1765.....	21	10	0	231	20	0	0	0	0
23 Octobre.....	21	18	0	239	21	0	1	20	0
Cook.									
19 Juillet 1777.....	22	25	0	171	9	0	8	28	10
.....	22	25	0	171	9	0	8	28	45
.....	22	25	0	171	9	0	8	34	30
31 Juillet.....	22	25	0	171	9	0	8	47	45
19 Juillet.....	22	25	0	171	9	0	8	49	30
.....	22	25	0	171	9	0	9	2	30
6 Août.....	25	17	0	149	49	0	7	39	20
27 Juillet.....	25	57	0	162	35	0	8	3	30
.....	25	57	0	162	35	0	8	8	15
.....	25	57	0	162	35	0	8	13	45
17 Juillet.....	25	57	0	162	35	0	8	24	45
26 Juillet.....	26	41	0	163	35	0	6	45	0
.....	26	41	0	163	35	0	8	6	15
.....	26	41	0	163	35	0	8	1	0
.....	26	41	0	163	35	0	8	37	30
1 Août.....	27	43	0	154	54	0	5	54	15
Cook et Bayli.									
1 Août 1777.....	27	43	0	154	54	0	6	59	15
.....	27	43	0	154	54	0	7	8	45
.....	27	43	0	154	54	0	7	13	14
Cook.									
1 Août 1777.....	27	43	0	154	54	0	7	41	45
6 Août.....	27	43	0	154	54	0	7	48	30
31 Juillet.....	27	51	0	156	45	0	6	38	30
.....	27	51	0	156	45	0	7	30	45
.....	27	51	0	156	45	0	7	32	30
.....	27	51	0	156	45	0	7	37	0
.....	27	51	0	156	45	0	8	18	15
Wallis.									
11 Février 1768.....	34	0	0	159	35	0	19	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
5 Février 1777.....	42	29	0	161	44	0	11	11	15
.....	42	29	0	161	44	0	11	18	45
2 Juillet 1773.....	43	3	0	201	18	0	8	32	0
30 Juin 1773.....	43	7	0	198	10	0	7	59	0
Cook et Bayli.									
1 Juillet 1773.....	43	7	0	199	51	0	6	55	0
Cook.									
30 Janvier 1777.....	43	15	0	146	17	0	4	30	30
.....	43	15	0	146	17	0	5	3	0
.....	43	15	0	146	17	0	5	12	0
.....	43	15	0	146	17	0	5	13	25
Cook et Bayli.									
30 Janvier 1777.....	43	15	0	146	17	0	5	20	30
.....	43	15	0	146	17	0	5	24	30
.....	43	15	0	146	17	0	5	40	0
.....	43	15	0	146	17	0	5	50	0
Cook.									
3 Juillet 1773.....	43	18	0	202	35	0	7	43	30
28 Janvier 1777.....	43	21	0	145	28	0	6	45	15
.....	43	21	0	145	28	0	5	53	16
Cook et Bayli.									
28 Janvier 1777.....	43	21	0	145	28	0	5	24	20
.....	43	21	0	145	28	0	5	44	45
.....	43	21	0	145	28	0	5	46	40
Cook.									
21 Janvier 1776.....	43	27	0	140	10	0	0	5	25
.....	43	27	0	140	10	0	0	43	2
.....	43	27	0	140	10	0	1	20	40
22 Janvier.....	43	33	0	140	26	0	3	1	10
.....	43	33	0	140	26	0	3	3	30
.....	43	33	0	140	26	0	5	13	40
.....	43	33	0	140	26	0	5	52	0
24 Janvier.....	43	43	0	145	55	0	8	41	30
.....	43	43	0	145	35	0	10	2	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
4 Février 1777.....	43	43	0	159	3	0	11	27	0
Cook et Bayli.									
24 Janvier.....	43	43	0	145	55	0	10	13	30
.....	43	43	0	145	55	0	10	18	15
.....	43	43	0	145	55	0	10	23	10
Cook.									
24 Janvier 1777.....	43	43	0	145	55	0	11	7	45
.....	43	45	30	145	51	10	7	25	13
.....	43	48	0	145	47	0	3	3	55
23 Janvier.....	43	48	0	144	31	0	5	51	13
.....	43	48	0	144	31	0	5	57	0
.....	43	48	0	145	47	0	6	3	15
.....	43	48	0	144	31	0	6	20	20
.....	43	48	0	144	31	0	6	22	20
Cook et Bayli.									
23 Janvier 1777.....	43	48	0	144	31	0	5	16	40
24 Janvier.....	43	48	0	145	47	0	5	17	30
23 Janvier.....	43	48	0	144	31	0	5	20	40
.....	43	48	0	145	47	0	5	37	30
23 Juin 1773.....	44	38	0	196	8	0	10	43	0
22 Juin 1773.....	44	41	0	195	12	0	10	19	0
Cook.									
2 Février 1777.....	44	51	0	153	22	0	6	4	35
.....	44	51	0	153	22	0	6	35	0
.....	44	51	0	152	39	0	7	36	44
.....	44	51	0	153	22	0	9	28	30
.....	44	51	0	153	22	0	9	28	45
Cook et Bayli.									
2 Février 1777.....	44	51	0	153	22	0	6	56	10
.....	44	51	0	153	22	0	7	7	25
Cook.									
15 Juin 1773.....	46	46	0	183	35	0	11	24	30
Furneau.									
2 Janvier 1774.....	51	37	0	180	24	0	15	30	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Déclinaison Ouest.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bougainville.									
En Janvier 1768, au Port Galant, Détroit de Magellan.....	53	40	0				22	30	32
Furneau.									
11 Janvier 1774.....	58	17	0	210	12	0	7	36	0
13 Janvier.....	58	36	0	212	55	0	9	20	0
14 Janvier.....	58	48	0	215	21	0	7	45	0
19 Janvier.....	59	24	0	238	22	0	8	25	0
22 Janvier.....	59	30	0	246	9	0	11	15	0
24 Janvier	59	35	0	252	19	0	13	12	0
21 Janvier.....	60	9	0	244	23	0	11	6	0
31 Janvier.....	61	20	0	285	45	0	26	6	0
28 Janvier.....	61	45	0	268	35	0	22	48	0
29 Janvier.....	61	49	0	273	24	0	24	30	0

TABLES

Contenant les Observations qui ont été faites, dans ces derniers tems, sur l'Inclinaiſon de l'Aiguille aimantée.

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER ATLANTIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
15 Septembre 1776.....	0	42	0	344	11	0	24	21	45
Eckberg.									
En Mars 1774.....	0	49	0	337	59	0	26	45	0
.....	1	4	0	337	53	0	27	0	0
Cook.									
13 Août 1776.....	1	4	30	331	13	0	32	24	30
Bayli.									
11 Juin 1780.....	1	10	0	331	5	0	29	28	30
Eckberg.									
En Mars 1774.....	1	54	0	337	54	0	27	52	0
Cook.									
30 Août 1776.....	2	9	45	332	44	0	33	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Inclinaison.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Eckberg.			
En Avril 1775	2 14 0	335 0 0	26 52 0
En Mars 1774.....	2 22 0	337 57 0	29 26 0
Cook.			
29 Août 1776.....	2 43 55	334 25 0	34 30 0
17 Août	3 39 45	335 17 0	35 17 30
13 Juin 1780.....	3 48 0	331 45 0	32 52 0
Eckberg.			
En Mars 1774.....	3 49 0	337 57 0	30 48 0
Le Gentil.			
En 1771.....	4 12 0	341 8 0	14 37 30
Bayli.			
8 Septembre 1776.....	4 24 0	343 45 0	31 16 30
Eckberg.			
Avril 1775.....	4 28 0	333 42 0	31 52 0
Cook.			
25 Août 1776.....	5 2 0	337 25 0	37 25 0
16 Juin.....	5 25 0	330 17 0	35 37 0
Le Gentil.			
En 1771	5 40 0	342 40 0	10 45 0
Eckberg.			
En Mars 1774.....	5 55 0	337 24 0	34 30 0
Cook.			
23 Août 1776.....	6 2 0	336 53 0	38 3 0
Bayli.			
17 Juin 1780	6 26 0	331 40 0	39 0 0
Cook.			
22 Août 1779.....	6 31 30	336 38 0	39 24 0
Eckberg.			
Avril 1775.....	6 43 0	331 56 0	38 22 0
Le Gentil.			
En 1771.....	7 57 0	343 41 0	7 22 30
Eckberg.			
Mars 1774.....	8 18 0	336 43 0	39 41 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inlcinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1771.....	8	50	0	357	53	0	4	52	30
Cook.									
19 Août 1776.....	8	50	45	334	57	0	42	19	30
Bayli.									
22 Juin 1780.....	9	43	0	328	33	0	43	26	20
Cook.									
23 Juin 1780.....	9	44	0	328	41	0	42	52	0
18 Août 1776.....	10	0	0	334	43	9	44	12	45
Le Gentil.									
En 1771.....	10	2	0	349	28	0	0	45	0
.....	10	21	0	357	49	0	14	37	30
Eckberg.									
Mars 1774.....	10	38	0	336	33	0	44	45	0
Bayli.									
En 1776, 30 Août.....	11	0	0	334	5	0	44	39	45
Le Gentil.									
En 1771.....	11	10	0	351	2	0	2	30	0
Cook.									
16 Août 1776.....	11	43	0	333	16	0	46	47	30
15 Août.....	12	1	45	333	49	0	47	0	0
Le Gentil.									
En 1771.....	12	13	0	331	39	0	44	0	0
.....	12	18	0	352	47	0	4	45	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	13	1	0	335	33	0	46	52	0
Le Gentil.									
En 1771.....	13	12	0	330	55	0	46	30	0
.....	14	43	0	356	0	0	10	37	30
Eckberg.									
Mars 1774.....	15	0	0	336	15	0	49	56	0
Cook.									
12 Août 1776.....	15	8	0	333	57	0	51	0	0
Chappe.									
En 1769.....	15	12	0	293	42	0	47	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
En 1769..... Cook.	15	12	0	300	29	0	48	55	0
28 Juin 1780..... Eckberg.	15	25	0	324	9	0	50	37	0
Mai 1775..... Bayli.	16	10	0	324	42	0	49	55	0
26 Août 1776..... Eckberg.	16	20	0	333	53	0	51	14	0
Mars 1774..... Bayli.	16	40	0	336	15	0	53	0	0
28 Juin 1780..... Cook.	16	45	0	322	41	0	51	37	0
10 Août 1776..... Le Gentil.	17	2	0	335	35	0	52	34	30
En 1771..... Chappe.	17	7	0	327	52	0	50	0	0
En 1769.....	17	47	0	283	40	0	46	30	0
..... Le Gentil.	18	4	0	314	47	0	54	7	0
En 1771..... Eckberg.	18	23	0	327	16	0	51	37	30
Mars 1774..... Cook.	18	34	0	335	34	0	55	7	0
18 Juin 1779..... Chappe.	18	35	45				38	30	0
En 1769..... Cook.	19	10	0				40	47	0
9 Août 1776.....	19	17	0	337	7	0	55	1	0
1 Juillet 1780..... Le Gentil.	20	0	0	320	38	0	54	40	0
En 1771..... Cook.	20	1	0	326	19	0	53	37	30
8 Août 1776..... Bayli.	20	47	0	337	59	0	56	15	0
23 Août 1776.....	21	0	0	335	5	0	56	45	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Mars 1774.....	21	24	0	336	38	0	57	52	0
Chappe.									
En 1769.....	22	18	0	271	44	0	49	0	0
Cook.									
7 Août 1776.....	22	25	0	338	35	0	57	25	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	22	51	0	321	38	0	59	30	0
Chappe.									
En 1769.....	23	12	0	329	25	0	59	31	0
Bayli.									
4 Juillet 1780.....	24	2	0	318	15	0	59	42	45
Cook.									
4 Juillet 1780.....	24	4	0	318	50	0	59	7	0
6 Août 1776.....	24	24	30	339	24	0	59	0	45
Eckberg.									
Mars 1774.....	24	25	0	337	6	0	60	11	0
Mai 1775.....	26	11	0	321	46	0	61	15	0
Chappe.									
En 1769.....	26	26	0	338	30	0	60	56	0
Le Gentil.									
En 1771.....	26	34	0	322	52	0	58	45	0
Eckberg.									
Février 1774.....	27	36	0	338	45	0	62	11	0
Bayli.									
19 Août 1776.....	27	39	0	327	5	30	60	51	30
Eckberg.									
En Mai 1775.....	27	43	0	322	47	0	63	22	0
Chappe.									
En 1769.....	27	46	0	342	24	0	60	1	0
Le Gentil.									
4 Août 1776.....	28	26	0	322	3	0	60	52	30
Cook.									
4 Août 1776,.....	28	30	30	341	15	0	61	52	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1771.....	28	58	0	322	4	0	61	37	30
Cook.									
31 Juillet 1766.....	29	18	0	341	8	0	62	17	0
Le Gentil.									
En 1771.....	29	54	0	322	16	0	62	37	30
Eckberg.									
Février 1774.....	30	0	0	340	2	0	65	3	0
En Mai 1775.....	30	16	0	323	29	0	64	34	0
Le Gentil.									
En 1771.....	31	6	0	322	16	0	63	15	0
Cook.									
12 Juillet 1780.....	32	11	0	317	25	0	67	0	0
Eckberg.									
Février 1774.....	33	1	0	340	46	0	66	22	0
Bayli.									
13 Août 1776.....	33	10	0	340	26	0	65	29	0
13 Juillet 1780.....	33	17	0	315	25	0	67	41	30
12 Août 1776.....	33	48	0	342	5	30	66	1	30
Eckberg.									
Mai 1775.....	34	57	0	324	36	0	66	32	0
Cook.									
28 Juillet 1776.....	34	57	0	343	27	0	66	12	0
Eckberg.									
Février 1774.....	35	41	0	341	38	0	67	11	0
Cook.									
17 Juillet 1780.....	36	13	0	317	34	0	70	3	30
Chappe.									
En 1769.....	36	31	0	350	56	0	72	24	0
Cook.									
27 Juillet 1776.....	36	34	45	344	4	0	68	22	0
Bayli.									
21 Juillet 1776.....	37	51	0	320	39	0	70	11	0
Eckberg.									
Février 1774.....	37	55	0	341	25	0	68	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1771.....	38	15	0	321	55	0	68	37	30
Cook.									
22 Juillet.....	38	20	0	320	27	0	70	7	0
26 Juillet 1776.....	38	53	0	345	34	0	70	30	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	39	24	0	325	56	0	68	49	0
Cook.									
9 Juillet 1780.....	39	33	0	316	32	0	65	1	10
Bayli.									
9 Juillet 1780.....	39	33	0	315	47	0	65	1	10
30 Juillet.....	39	57	0	325	58	0	72	52	30
Le Gentil.									
En 1771.....	39	57	0	325	58	0	73	7	30
Bayli.									
27 Juillet 1780.....	40	55	0	323	28	0	72	30	15
Cook.									
28 Juillet 1780.....	41	9	0	326	16	0	72	7	30
Eckberg.									
Février 1774.....	41	15	0	341	36	0	69	37	0
Cook.									
22 Juillet 1776.....	44	5	0	349	25	0	71	34	0
Eckberg.									
Mai 1775.....	44	10	0	330	40	0	70	49	0
Février 1771.....	44	30	0	342	38	0	71	11	0
Mai 1775.....	44	48	0	345	53	0	72	18	0
Bayli.									
3 Août 1780.....	45	8	0	333	4	0	73	24	20
Cook.									
5 Août 1780.....	45	50	0	338	17	0	72	15	0
Le Gentil.									
A Basle, en Suisse.....	47	55	0				71	30	0
Eckberg.									
Février 1774.....	48	30	0	340	33	0	72	15	0
A Paris.....	48	50	30	0	0	0	71	35	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Inclinaison.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Eckberg.			
Mai 1775	49 17 0	352 27 0	72 11 0
Phipps.			
5 Juin 1773.....	Près de Harwich.		72 12 0
Eckberg.			
Février 1774.....	50 16 0	338 58 0	72 45 0
Mai 1775	50 30 0	355 47 0	71 52 0
Phipps.			
2 Juin 1773.....	51 35 0	358 31 0	73 31 0
6 Juin.....	52 22 0	358 53 0	73 22 0
Eckberg.			
Février 1774.....	52 24 0	338 24 0	73 30 0
Bayli.			
11 Août 1780.....	52 28 0	341 20 0	74 18 20
Le Gentil.			
A Berlin.....	53 31 30		72 15 0
Bayli.			
1780.....	53 33 0	341 53 0	74 49 30
Eckberg.			
Janvier 1774.....	54 0 0	335 50 0	74 41 0
Bayli.			
17 Août 1780.....	56 10 0	344 54 0	76 39 0
Eckberg.			
Janvier 1774.....	57 8 0	339 57 0	76 17 0
.....	57 15 0	359 21 0	74 41 0
Bayli.			
20 Août 1780.....	58 44 0	352 13 0	76 28 30
26 Août	58 56 0	354 4 0	75 52 0
Eckberg.			
Janvier 1774.....	59 39 0	349 20 0	76 48 0
A Péterſbourg.....	59 59 0		73 45 0
Phipps.			
14 Juin 1773.....	60 16 0	354 38 0	75 18 0
.....	60 16 0	354 38 0	73 30 0
.....	60 18 0	356 39 30	75 0 0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
15 Juin 1773.....	60	19	0	357	18	0	74	52	0
16 Juin 1773.....	60	29	0	357	15	0	76	45	0
A Kola.....	68	52	0				77	45	0
Phipps.									
21 Juin 1773.....	69	2	0	357	35	0	79	4	0
22 Juin.....	70	45	0	356	59	0	77	52	0
24 Juin.....	73	22	0	1	35	0	80	35	0
30 Juin.....	73	36	0	2	5	0	79	30	0
24 Juin.....	73	40	0	356	58	0	80	35	0
26 Juin.....	74	30	0	7	33	0	79	22	0
28 Juin.....	77	48	0	4	45	0	81	7	0
29 Juin.....	78	2	0	7	6	0	80	26	0
30 Juin.....	78	8	0	7	3	0	79	30	0
24 Juin.....	78	22	0	7	3	0	80	45	0
30 Septembre, sur une Isle.....	79	44	0	6	43	0	82	8	45
15 Juillet, sur une Isle...	79	50	0	7	38	0	82	0	0
9 Juillet.....	80	12	0	359	37	0	81	52	0
29 Août.....	80	27	0	12	51	0	82	2	30

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER ATLANTIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
1 Septembre 1776	0	3	0	329	57	0	30	3	30
Le Gentil.									
En 1771	0	12	0	338	48	0	23	0	0
Cook.									
11 Juin 1780.....	0	19	0	331	35	0	25	52	0
Bayli.									
17 Septembre.....	0	49	0	343	8	0	21	45	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	1	9	0	337	57	0	25	18	0
Cook.									
2 Septembre 1776.....	1	32	0	328	57	0	27	51	30
Le Gentil.									
En 1771.....	1	49	0	336	14	0	26	30	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	2	4	0	337	35	0	22	37	0
Le Gentil.									
En 1771	2	30	0	339	49	0	18	22	30
Eckberg.									
Mars 1774	2	40	0	337	33	0	22	30	0
Cook.									
9 Juin 1780.....	3	12	0	332	31	0	20	15	0
3 Septembre 1776.....	3	14	30	328	13	0	24	43	0
Bayli.									
20 Septembre 1776	3	23	0	339	15	0	17	34	12

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1771.....	3	26	0	337	58	0	31	52	30
Cook.									
4 Septembre 1776....	4	40	45	327	1	0	22	15	30
Bayli.									
8 Juin.....	4	50	0	333	43	0	20	19	45
Cook.									
7 Juin 1780.....	4	50	0	334	55	0	15	0	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	5	3	0	334	35	0	16	26	0
Le Gentil.									
En 1771	5	31	0	337	43	0	33	15	0
Bayli.									
23 Septembre.....	7	0	0	337	15	0	13	36	15
Cook.									
6 Septembre 1776....	7	3	0	324	14	0	17	57	0
Eckberg.									
Avril 1775	7	6	0	342	37	0	15	52	0
Mars 1774.....	7	18	0	336	29	0	13	41	0
Cook.									
7 Septembre 1776.....	8	10	0	323	35	0	14	17	30
Eckberg.									
Avril 1775	8	50	0	344	17	0	12	41	0
Bayli.									
5 Juin 1780.....	8	51	0	336	54	0	11	15	10
Cook.									
5 Juin 1780.....	8	51	0	337	32	0	9	0	0
9 Septembre 1776.....	9	52	0	323	5	0	13	28	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	9	52	0	336	29	0	7	48	0
Bayli.									
25 Septembre 1776.....	10	0	0	336	0	0	7	41	30
Le Gentil.									
En 1771.....	10	0	0	336	2	0	42	0	0
.....	10	14	0	333	48	0	41	7	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Avril 1775.....	10	21	0	345	19	0	4	56	0
Le Gentil.									
En 1771.....	11	8	0	332	33	0	44	0	0
Bayli.									
5 Juin 1780.....	11	15	0	340	3	0	5	12	0
Cook.									
2 Juin 1780.....	11	15	0	340	20	0	2	30	0
Bayli.									
28 Septembre 1777.....	11	20	0	335	38	0	5	50	30
Cook.									
10 Septembre 1776.....	11	25	30	323	11	0	9	15	0
Eckberg.									
Avril 1775.....	11	42	0	346	42	0	0	12	0
Bayli.									
1 Juin 1780.....	11	50	0	340	59	0	1	58	0
Cook.									
31 Mai 1780.....	12	0	0	341	23	0	0	12	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	12	2	0	336	32	0	3	56	0
Cook.									
31 Mai 1780.....	12	11	0	341	37	0	1	14	30
Eckberg.									
Mars 1774.....	12	19	0	336	13	0	2	52	0
.....	12	32	0	347	52	0	3	30	0
Bayli.									
31 Mai 1780.....	12	37	0	341	43	0	0	53	0
Cook.									
31 Mai 1780.....	12	46	0	341	50	0	1	18	30
Bayli.									
30 Mai 1780.....	12	54	0	342	2	0	0	24	40
Eckberg.									
Mars 1774.....	13	2	0	336	2	0	1	51	0
.....	13	21	0	335	55	0	0	3	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
27 Septembre 1776.....	13	30	0	334	35	0	1	25	30
30 Mai 1780.....	13	33	0	342	37	0	1	51	0
Cook.									
30 Mai 1780.....	13	39	0	342	43	0	4	41	15
Bayli.									
29 Mai 1780.....	13	47	0	343	1	0	2	48	30
Eckberg.									
Avril 1775.....	13	54	0	348	59	0	4	45	0
Mars 1774.....	13	57	0	335	51	0	0	37	0
.....	14	29	0	335	57	0	2	12	0
Avril 1775.....	14	43	0	349	48	0	6	56	0
Bayli.									
28 Mai 1780.....	14	50	0	344	21	0	6	6	10
27 Septembre 1776.....	14	51	0	334	19	0	1	16	0
.....	14	51	0	334	19	0	1	36	30
Cook.									
28 Mai 1780.....	14	56	0	344	35	0	6	56	30
Eckberg.									
Avril 1775.....	15	35	0	350	35	0	9	52	0
Cook.									
27 Mai 1780.....	15	54	0	345	31	0	8	27	15
13 Septembre 1776.....	16	0	0	323	0	0	4	21	0
.....	16	4	0	322	59	0	3	58	0
Eckberg.									
Janvier 1774.....	16	8	0	352	40	0	14	19	0
Mars.....	16	33	0	335	44	0	4	26	0
Bayli.									
26 Mai 1780.....	16	40	0	346	37	0	6	45	20
Cook.									
14 Septembre 1776.....	17	22	0	322	15	0	6	27	0
Bayli.									
25 Mai 1780.....	17	52	0	347	41	0	12	43	10
Cook.									
25 Mai 1780.....	18	12	0	348	28	0	13	37	0
Eckberg.									

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Mars 1774.....	18	17	0	336	6	0	8	27	0
Le Gentil.									
En 1771.....	18	39	0	359	31	0	20	30	0
Bayli.									
29 Septembre 1776.....	18	45	0	333	35	0	9	38	15
Eckberg.									
Mars 1774.....	19	36	0	337	12	0	10	37	0
.....	20	8	0	337	30	0	11	37	0
.....	20	30	0	337	32	0	14	15	0
Bayli.									
1 Octobre 1776.....	20	49	0	332	55	0	12	2	30
Le Gentil.									
En 1771.....	21	8	0	1	27	0	23	0	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	21	15	0	337	50	0	16	30	0
Cook.									
17 Septembre 1776.....	21	57	0	321	35	0	15	8	0
Eckberg.									
Mars 1774.....	22	11	0	339	10	0	17	52	0
Cook.									
22 Mai 1776.....	22	16	0	353	18	0	22	45	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	22	18	0	358	59	0	24	30	0
Le Gentil.									
En 1771.....	22	40	0	3	10	0	27	30	0
.....	23	8	0	3	42	0	27	30	0
Bayli.									
20 Mai 1780.....	23	34	0	355	19	0	24	47	45
Eckberg.									
Avril 1774.....	23	35	0	340	57	0	21	10	0
Cook.									
20 Mai 1780.....	24	35	0	357	35	0	28	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
5 Octobre 1776.....	24	40	0	333	44	0	19	42	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	25	3	0	340	55	0	22	25	0
Cook.									
19 Septembre 1775....	25	37	0	322	35	0	21	33	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	25	41	0	341	11	0	23	30	0
.....	26	13	0	342	1	0	25	0	0
Bayli.									
18 Mai 1780.....	26	25	0	1	5	0	32	43	30
Eckberg									
Janvier 1775.....	26	37	0	3	25	0	31	26	0
Cook.									
20 Septembre 1776....	27	1	30	323	40	0	23	36	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	27	10	0	343	45	0	26	0	0
.....	27	12	0	345	7	0	26	45	0
Cook.									
17 Mai 1780.....	27	36	0	3	23	0	34	22	0
21 Septembre 1776....	27	52	0	325	0	0	25	26	0
.....	27	58	0	325	20	0	26	49	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	28	46	0	347	7	0	27	30	0
Bayli.									
8 Octobre 1776.....	28	47	0	336	45	0	27	31	15
15 Mai 1780.....	29	53	0	8	10	0	40	53	45
Cook.									
15 Mai 1780.....	29	54	0	8	15	0	39	5	0
24 Septembre 1776.....	30	16	30	329	33	0	29	2	0
Eckberg.									
Avril 1774.....	30	18	0	7	22	0	40	45	0
.....	30	20	0	350	59	0	29	37	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Inclinaison.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Bayli.			
14 Octobre 1776.....	30 24 0	340 17 0	31 52 30
Eckberg.			
Avril 1774.....	31 36 0	354 9 0	32 45 0
.....	32 23 0	356 43 0	35 15 0
Cook.			
13 Mai 1780.....	32 32 0	13 31 0	44 20 0
Eckberg.			
Avril 1774.....	32 51 0	11 2 0	42 0 0
.....	33 7 0	360 0 0	37 32 0
.....	33 7 0	359 3 0	37 15 0
.....	33 36 0	0 33 0	37 52 0
Bayli.			
21 Octobre 1776.....	33 40 0	359 7 0	39 4 30
19 Octobre.....	33 41 0	354 55 0	37 16 30
Cook.			
29 Septembre 1776....	33 47 0	340 54 0	34 22 30
Bayli.			
26 Octobre 1776.....	34 5 0	6 25 0	41 26 30
8 Novembre.....	34 5 0	15 25 0	44 48 0
Eckberg.			
Avril 1774.....	34 8 0	15 47 0	44 27 0
.....	34 9 0	3 9 0	39 0 0
Bayli.			
21 Avril 1780, à Fals-bay, au Cap de Bonne-espérance.....	34 11 0	15 56 0	46 46 0
Eckberg.			
Avril 1774.....	34 12 0	15 50 0	44 7 0
.....	34 12 0	16 45 0	44 15 0
.....	34 16 0	3 32 0	39 50 0
Cook.			
3 Octobre 1776.....	34 32 0	348 25 0	36 13 30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Eckberg.									
Avril 1774.....	34	35	0	14	44	0	43	30	0
.....	34	36	0	12	50	0	42	30	0
.....	34	36	0	10	32	0	41	30	0
.....	34	49	0	9	2	0	41	0	0
.....	34	52	0	6	35	0	40	22	0
Cook.									
7 Octobre 1776.....	35	17	30	349	29	0	38	7	30
8 Octobre.....	35	31	0	350	0	0	38	49	0
10 Octobre.....	35	47	0	355	10	0	40	30	0

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER DES INDES.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Le Gentil.									
En 1776, allant à Manille, par les Iſles de la Sonde.	0	44	0				16	30	0
En 1770.....	1	0	0	86	29	0	15	45	0
Bayli.									
1 Février.....	1	20	0	103	5	0	13	16	0
Cook.									
1 Février 1780.....	1	20	45	102	35	0	12	51	45
Le Gentil.									
En 1770.....	1	50	0	86	28	0	14	18	30
En 1768, proche les Iſles de Dam, à 20 lieues de la preſqu'Iſle & 12 de Sumatra.....	2	12	0				10	59	30
A 6 lieues de la preſqu'Iſle & 20 de Sumatra.....	2	12	0				11	7	30
Dans la Rade de Malaca,, en 1770.....	2	12	0				12	20	0
En 1770.....	2	24	0	85	17	0	12	22	15
Cook.									
3 Janvier 1780.....	3	18	20	101	51	0	19	2	15
Le Gentil.									
En 1770.....	3	24	0	85	52	0	11	41	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	3	30	0	101	42	0	10	3	0
Le Gentil.									
En 1768, à 15 lieues de									

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
la presqu'Isle & 25 de Sumatra.....	3	48	0				9	31	30
A 15 lieues de la presqu'Isle, & à 30 de Sumatra.....	4	2	0				8	43	30
En 1768, à 15 lieues de la presqu'Isle de Malaca & environ 100 toises de Pol-aor.....	4	6	0				12	0	0
A 3 lieues de la presqu'Isle & 15 de Sumatra.....	4	6	0				13	5	0
Dans le Détroit, à 2 lieues du Mont-Formose & à 15 de Sumatra.....	4	6	0				13	7	30
En 1770.....	4	28	0	85	27	0	9	37	30
Bayli.									
30 Janvier 1780.....	4	47	0	102	30	0	7	3	45
Le Gentil.									
En 1768, à 7 lieues de la presqu'Isle de Malaca, 40 de Sumatra & 15 de Pol-pinany.....	4	55	0				7	26	0
En 1768, à demi-lieue de Pol-pinany, 7 de la presqu'Isle & 40 de Sumatra.....	5	25	0				6	22	30
En 1770.....	6	8	0	84	57	0	6	37	30
En 1768, à 20 lieues de Sumatra.....	6	9	0				4	56	0
A 40 lieues de la presqu'Isle & 40 de la pointe d'Achem.	6	31	0				2	22	30
Cook.									
29 Janvier 1789.....	6	53	45	102	54	0	1	39	30
Bayli.									
29 Janvier 1780.....	7	15	0	103	35	0	1	33	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Inclinaison.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Le Gentil.			
En 1766, allant à Manille par les Isles de la Sonde.	7 22 0		0 52 30
En 1768, à 50 lieues de la presqu'Isle, & 40 de la pointe d'Achem...	7 31 0		2 52 30
Eckberg.			
Juillet 1774.....	7 42 0	104 47 0	2 15 0
Le Gentil.			
En 1768, hors le Détroit de Malaca, dans les Isles de Nicobar, à 90 lieues de la presqu'Isle de Malaca, 50 de Sumatra & 250 de la presqu'Isle de l'Inde.....	7 45 0		2 41 0
En 1770.....	8 8 0	84 27 0	2 52 30
En 1766.....	8 22 0		1 30 0
Cook.			
26 Janvier 1780, dans le Havre de Pulo-Condor.	8 39 0	103 54 0	1 55 30
Bayli.			
27 Janvier 1780.....	8 40 0	104 19 0	2 1 0
20 Janvier.....	8 45 0	104 55 0	2 11 20
Cook.			
20 Janvier.....	8 46 30	105 20 0	2 0 0
Eckberg.			
Juillet 1774.....	9 24 0	105 47 0	0 5 0
Le Gentil.			
En 1770, à bord du Dauphin.....	9 38 0	83 30 0	1 37 0
Eckberg.			
Juillet 1774.....	10 0 0	106 23 0	0 52 0
Le Gentil.			
En 1768, à 15 ou 20 lieues			

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
de Ceylan & à 30 de la côte de Tanjaour.....	10	7	0	78	35	0	0	44	0
A 25 lieues de Négapatan.	10	39	0	79	35	0	40	49	0
Le Gentil.									
En 1770.....	10	40	0	82	56	0	3	37	30
Eckberg.									
Juillet 1774.....	11	27	0	107	12	0	4	37	0
Le Gentil.									
En 1770.....	12	3	0	82	19	0	5	35	0
Bayli.									
17 Janvier 1780.....	12	54	0	109	35	0	13	11	40
Le Gentil.									
En 1770.....	13	39	0	82	1	0	8	52	30
Eckberg.									
Juillet 1774.....	14	1	0	109	22	0	9	15	0
Août.....	18	3	0	108	32	0	12	30	0
Cook.									
15 Janvier 1780.....	18	58	0	111	16	0	21	32	30
Eckberg.									
Août 1774.....	19	34	0	107	32	0	19	52	0
Bayli.									
27 Novembre 1779.....	20	35	0	113	22	0	23	38	45
Cook.									
20 Novembre 1779	22	7	30	127	22	0	25	56	0
Bayli.									
13 Décembre 1779.....	22	9	0	111	11	0	27	1	0
19 Novembre.....	22	48	0	130	15	0	26	5	20
Eckberg.									
Août 1774.....	23	30	0	110	2	0	36	10	0
Cook.									
16 Novembre 1779.....	25	5	0	136	18	0	30	48	0

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER DES INDES.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.	Longitudes.	Inclinaison.
	D. M. S.	D. M. S.	D. M. S.
Le Gentil.			
En 1770.....	0 6 0	86 31 0	17 52 0
Cook.			
2 Février 1780.....	0 22 0	102 29 0	15 22 0
Le Gentil.			
En 1770.....	1 14 0	86 57 0	19 26 0
En 1776, hors le Détroit de Banca, à 9 lieues de Manopin & à 8 de Sumatra.....	1 38 0		17 45 0
En 1771.....	1 49 0	336 14 0	26 30 0
En 1776, à 4 lieues des Montagnes de Monopin & à 2 lieues & demie de Sumatra.....	2 6 0		19 0 0
A 2 lieues & demie de Sumatra.....	2 12 0		19 15 0
Eckberg.			
Juillet 1774.....	2 20 0	102 8 0	21 37 0
Le Gentil.			
A 2 lieues de Sumatra..	2 21 0		19 22 30
En 1776, à deux tiers de lieue de la première pointe de Banca.....	2 43 0		20 22 30
En 1770.....	2 47 0	87 36 0	22 30 0
En 1776, à 7 lieues de			

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Sumatra.....	3	8	0				21	15	0
Dans le Détroit de Banca, à demi-lieue de Sumatra.....	3	9	0				20	22	30
Bayli.									
6 Février 1780.....	3	15	0	103	44	0	22	36	30
Le Gentil.									
En 1770.....	3	55	0	88	4	0	23	52	30
En 1776, à 6 lieues de Sumatra.....	4	4	0				21	52	0
En 1770.....	4	24	0	88	8	8	24	48	30
.....	4	25	0	88	11	0	25	22	30
.....	4	26	0	88	13	0	25	22	30
.....	4	30	0	88	4	0	26	26	0
Cook.									
6 Février 1780.....	4	36	30	101	37	0	24	22	0
Le Gentil.									
En 1770.....	4	52	0	88	33	0	26	0	0
En 1776, à 6 lieues de Sumatra, 15 de Java & une des Deux-Sœurs.	5	2	0				24	30	0
En 1776.....	5	7	0	88	18	0	26	52	30
A 6 lieues de la pointe Saint-Nicolas & à 4 trois-quarts de Sumatra.	5	33	0				25	7	30
En 1770.....	5	38	0	87	57	0	27	41	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	5	45	0	101	57	0	26	49	0
Le Gentil.									
A 2 lieues & demie de la pointe Saint-Nicolas..	5	46	0				26	0	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	5	59	0	101	8	0	26	56	0
Le Gentil.									
En 1776, à une lieue de									

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
la pointe Horale, Détroit de la Sonde.....	6	3	0				25	30	0
Bayli.									
12 Février 1780.....	6	5	0	104	11	0	26	2	45
Le Gentil.									
En 1776, à 2 lieues de Java.....	6	13	0				26	22	30
Eckberg.									
Janvier 1775.....	6	28	0	101	2	0	28	0	0
Juillet 1774.....	6	30	0	100	57	0	28	0	0
Le Gfntil.									
En 1776, à trois-quarts de lieue de la première pointe de Java.....	6	31	0				26	45	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	6	42	0	101	53	0	31	45	0
Le Gentil.									
En 1770.....	6	47	0	87	18	0	29	22	30
En 1776.....	6	58	0	88	5	0	27	52	30
En 1770.....	7	35	0	86	37	0	31	15	0
Eckberg.									
Juillet 1774.....	7	37	0	101	30	0	28	30	0
Juillet 1784.....	7	59	0	102	29	0	29	26	0
Le Gentil.									
En 1770.....	8	1	0	86	10	0	31	52	30
Bayli.									
19 Février 1780.....	8	17	0	102	55	0	30	23	45
Eckberg.									
En 1774.....	8	27	0	102	32	0	29	57	0
.....	8	41	0	105	6	0	30	37	0
.....	8	49	0	108	3	0	30	56	0
Le Gentil.									
En 1770.....	8	52	0	85	4	0	33	56	c
Eckberg.									
Juin 1774.....	9	23	0	105	33	0	32	52	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Janvier 1775.....	9	24	0	99	32	0	32	52	0
Le Gentil.									
En 1770.....	10	7	0	83	46	0	35	45	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	11	0	0	99	9	0	34	37	0
Le Gentil.									
En 1770.....	11	42	0	82	2	0	39	18	30
Eckberg.									
Juin 1774.....	11	56	0	104	13	0	36	0	0
Le Gentil.									
En 1770.....	13	19	0	80	20	0	42	7	30
Cook.									
23 Février 1780.....	13	35	0	100	58	0	35	0	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	14	6	0	97	22	0	39	15	0
Le Gentil.									
En 1770.....	14	13	0	78	52	0	44	3	30
Eckberg.									
En 1774.....	14	53	0	104	33	0	38	56	0
Le Gentil.									
En 1770.....	15	0	0	77	41	0	45	7	30
.....	15	58	0	76	18	0	47	7	30
Cook.									
1 Mars 1780.....	16	51	0	89	12	0	45	4	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	17	6	0	103	39	0	42	7	0
Le Gentil.									
En 1770.....	17	15	0	74	44	0	49	30	0
Eckberg.									
Janvier 1775.....	17	19	0	93	14	0	41	30	0
Bayli.									
2 Mars 1780.....	17	56	0	84	55	0	47	57	20
Le Gentil.									
En 1770.....	18	20	0	72	52	0	50	27	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
4 Mars 1780.....	18	29	0	86	30	0	47	22	0
Le Gentil.									
En 1770.....	19	14	0	70	18	0	51	30	0
.....	19	28	0	67	27	0	52	3	30
.....	19	45	0	61	21	0	53	35	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	19	47	0	102	30	0	44	52	0
Bayli.									
8 Mars 1780.....	20	4	0	74	45	0	52	16	10
Cook.									
29 Mars 1780.....	20	33	30	72	45	0	52	7	0
Eckberg.									
Janvier 1770.....	20	34	0	87	42	0	46	3	0
Bayli.									
11 Mars 1780.....	20	54	0	69	11	0	54	36	15
Eckberg.									
Juin 1774.....	21	42	0	102	49	0	47	52	0
Janvier 1775.....	22	23	0	82	41	0	50	41	0
Cook.									
15 Mars 1780.....	22	37	30	60	38	0	55	52	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	23	12	0	101	22	0	52	52	0
Bayli.									
16 Mars 1780.....	23	13	0	57	52	0	56	48	30
Eckberg.									
Janvier 1775.....	24	17	0	71	52	0	54	52	0
Cook.									
17 Février 1780.....	24	35	0				28	15	0
18 Mars 1780.....	25	8	45	56	8	0	57	29	30
Eckberg.									
Juin 1774.....	25	37	0	97	39	0	54	30	0
Janvier 1775.....	26	2	0	63	22	0	57	45	0
Bayli.									
20 Mars 1780.....	26	36	0	52	5	0	58	30	40

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
25 Mars.....	26	36	0	52	5	0	55	58	30
Eckberg.									
Janvier 1775.....	27	24	0	56	47	0	59	45	0
.....	28	58	0	48	2	0	58	30	0
Cook.									
24 Mars 1780.....	29	6	0	40	28	0	56	15	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	29	37	0	94	38	0	56	0	0
Janvier 1775.....	30	48	0	42	7	0	57	34	0
Bayli.									
30 Mars 1780.....	31	3	0	31	0	0	53	7	15
Cook.									
27 Mars 1780.....	31	3	0	34	59	0	54	17	0
1 Avril.....	32	11	0	28	16	0	50	27	0
Eckberg.									
En 1775.....	32	34	0	36	44	0	55	0	0
Juin 1774.....	32	45	0	88	17	0	57	52	0
Janvier 1775.....	34	29	0	25	8	0	48	22	0
.....	34	39	0	26	40	0	49	52	0
Juin 1774.....	34	39	0	86	3	0	59	12	0
.....	34	39	0	76	1	0	61	37	0
Bayli.									
3 Avril 1780.....	35	0	0	21	16	0	51	16	15
Eckberg.									
Janvier 1775.....	35	0	0	29	36	0	52	11	0
Juin 1774.....	35	13	0	71	46	0	61	48	0
Janvier 1775.....	35	15	0	22	11	0	46	56	0
.....	35	16	0	20	40	0	45	15	0
Cook.									
4 Avril 1780.....	35	23	0	22	30	0	49	37	0
Eckberg.									
Juin 1774.....	35	25	0	81	35	0	60	33	0
.....	35	30	0	69	32	0	62	30	0
Janvier 1775.....	35	48	0	21	41	0	46	52	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
6 Avril 1780.....	35	48	0	19	15	0	50	7	45
Cook.									
6 Avril 1780.....	35	49	0	19	8	0	45	37	0
Eckberg.									
Mai 1774.....	36	22	0	45	11	0	61	26	0
.....	36	39	0	39	42	0	56	11	0
.....	36	44	0	39	11	0	59	22	0
.....	36	44	0	30	14	0	54	0	0
.....	36	45	0	53	20	0	62	49	0
.....	36	52	0	63	52	0	62	30	0
.....	36	54	0	23	8	0	50	30	0
.....	37	4	0	25	24	0	52	30	0
Bayli.									
5 Décembre 1776.....	38	54	0	21	5	0	51	33	0
Cook.									
6 Décembre 1776.....	39	0	0	21	7	0	49	30	0
Bayli.									
16 Janvier.....	44	17	0	125	30	0	71	34	15
Cook.									
14 Janvier.....	47	19	0	112	47	0	73	21	0
Bayli.									
13 Décembre 1776.....	47	40	0	41	15	0	61	14	15
19 Décembre	47	40	0	52	55	0	66	54	0
13 Janvier 1777.....	47	50	0	111	25	0	73	10	15
.....	47	50	0	111	25	0	73	22	45
Cook.									
7 Janvier 1777.....	48	10	0	92	44	0	69	54	0
Bayli.									
11 Janvier 1777.....	48	15	0	106	51	0	72	27	0
3 Janvier.....	48	17	0	81	55	0	69	20	0
Cook.									
3 Janvier 1777.....	48	17	0	81	35	0	68	59	0
Bayli.									
21 Décembre	48	17	0	61	15	0	68	38	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
8 Janvier 1777.....	48	20	0	99	25	0	71	18	30
17 Décembre 1776.....	48	24	0	52	55	0	65	36	0
Cook.									
17 Décembre 1776.....	48	24	0	52	55	0	65	44	0
27 Décembre.....	48	41	0	66	45	0	67	47	0
Bayli.									
27 Décembre.....	48	41	0	66	35	0	68	14	0
.....	48	41	0	66	35	0	68	26	0

HÉMISPHERE.

HÉMISPHERE BORÉAL.

MER PACIFIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
23 Décembre 1777.....	0	44	45	200	10	0	8	42	0
Bayli.									
25 Décembre 1777.....	1	57	0	200	5	0	11	29	45
Cook.									
22 Décembre 1777.....	1	58	0	200	5	0	11	54	15
24 Décembre.....	2	2	30	200	1	0	10	53	30
4 Janvier 1778.....	4	8	0	200	21	0	16	16	0
Bayli.									
4 Janvier 1778.....	4	50	0	200	0	0	15	40	15
Cook.									
8 Janvier 1778.....	7	45	0	202	23	0	23	1	30
9 Janvier.....	8	12	15	202	39	0	23	37	30
Bayli.									
10 Janvier 1778.....	10	31	0	202	5	0	26	49	30
Cook.									
12 Janvier 1778.....	12	17	30	201	41	0	29	54	56
17 Septembre 1776.....	17	40	15	198	59	0	37	38	20
Cook.									
12 Janvier 1779.....	18	35	45	201	50	0	38	30	0
Bayli.									
15 Janvier 1778.....	19	0	0	198	15	0	39	49	0
Cook.									
25 Janvier, dans la Baye de l'Isle Ocyhea.....	19	28	0	201	5	0	40	32	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
3 Février 1779.....	19	28	0	201	5	0	41	14	15
26 Mars.....	19	48	30	180	44	0	37	0	0
25 Mars.....	19	57	30	181	47	0	38	52	30
Bayli.									
25 Mars 1779.....	19	59	0	101	40	0	38	47	45
Cook.									
21 Mars 1779.....	20	37	45	189	48	0	41	25	0
Bayli.									
19 Mars 1779	21	12	0	191	45	0	42	10	15
Cook.									
18 Janvier 1778	21	17	30	198	23	0	42	1	7
28 Janvier.....	21	21	0	197	35	0	42	23	0
Bayli.									
18 Janvier 1778.....	21	46	0	198	5	0	42	36	30
31 Janvier 1778	21	47	0	1	7 30	0	42	4	30
Cook.									
6 Mars 1779.....	21	56	45	213	51	0	43	11	15
2 Avril 1779.....	22	36	15	174	55	0	38	0	0
Bayli.									
13 Février 1778.....	24	30	0	196	49	0	45	43	30
Cook.									
4 Février 1778.....	24	31	0	197	5	0	45	52	30
14 Novembre 1779.....	24	36	0	139	35	0	29	31	38
3 Avril.....	24	38	15	172	56	0	38	52	30
Bayli.									
14 Novembre 1779.....	24	50	0	138	25	0	31	58	0
Cook.									
13 Novembre 1779.....	25	56	0	140	51	0	31	27	0
Bayli.									
5 Avril 1779.....	25	57	0	171	22	0	43	10	20
Cook.									
6 Février 1778	27	41	30	198	5	0	49	42	0
Bayli.									
5 Février 1778.....	27	43	0	197	35	0	48	51	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
8 Février 1778.....	30	18	0	198	42	0	51	25	30
8 Avril 1779.....	30	39	0	164	39	0	42	55	0
Bayli.									
8 Avril 1779.....	30	54	0	164	7	0	43	35	15
9 Février 1778.....	31	16	0	200	23	0	53	47	0
14 Février.....	31	34	0	203	22	0	53	10	15
Cook.									
14 Février 1778.....	31	35	0	203	48	0	52	12	0
9 Avril 1779.....	32	16	0	164	14	0	43	47	0
17 Novembre 1778.....	32	26	0	204	35	0	54	54	0
10 Avril 1779.....	33	30	0	163	35	0	45	37	15
Bayli.									
15 Novembre 1778.....	33	34	0	104	37	0	56	3	0
Cook.									
7 Novembre 1779	33	52	20	145	40	0	42	50	0
Bayli.									
17 Février 1778.....	35	4	0	203	35	0	56	53	30
Bayli.									
1 Novembre 1779	35	9	0	139	21	0	46	35	20
Cook.									
31 Octobre 1779.....	35	30	30	139	25	0	45	0	0
30 Août 1779.	36	41	30	139	31	0	46	26	0
18 Février 1778.....	36	53	0	203	37	0	55	19	0
28 Novembre 1779....	38	6	0	139	35	0	48	10	0
Bayli.									
20 Février 1778.....	38	10	0	205	20	0	59	32	30
Cook.									
21 Février 1778.....	39	6	0	207	20	0	59	15	0
Bayli.									
26 Octobre 1779.....	40	4	0	139	49	0	51	34	45
Cook.									
22 Octobre 1779.....	40	59	0	145	52	0	51	53	30
Bayli.									
22 Février 1778.....	41	0	0	212	45	0	62	54	30

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
9 Novembre 1779.....	41	40	0	144	8	0	40	3	0
Bayli.									
15 Avril 1779.....	41	53	0	157	15	0	53	58	20
Cook.									
16 Avril 1779.....	42	12	45	157	16	0	53	34	7
17 Avril.....	43	18	30	155	12	0	54	15	0
Bayli.									
26 Février 1778.....	43	20	0	220	35	0	65	43	0
6 Mars.....	44	30	0	232	55	0	68	29	0
Cook.									
1 Mars 1778.....	44	49	0	225	34	0	67	25	0
Bayli.									
1 Mars 1778.....	44	51	0	226	25	0	68	31	15
Cook.									
16 Mars 1778.....	44	56	0	232	1	0	68	19	30
19 Mars 1778.....	44	57	30	231	15	0	67	20	0
Bayli.									
16 Octobre 1779.....	45	8	0	151	15	0	57	28	20
Cook.									
15 Octobre 1779.....	46	30	0	153	6	0	57	10	0
Bayli.									
24 Mars 1778.....	47	44	0	232	5	0	70	23	45
Cook.									
14 Octobre 1779.....	48	17	30	153	20	0	59	20	30
Bayli.									
28 Mars 1778.....	49	27	0	230	55	0	71	53	45
Cook.									
5 Avril 1778.....	49	36	0	230	52	0	72	35	30
Bayli.									
20 Avril 1779.....	49	47	0	158	28	0	60	55	20
12 Octobre 1779.....	50	55	0	154	47	0	63	38	40
27 Avril.....	52	22	0	156	28	0	64	57	20
Cook.									
15 Septembre 1779.....	53	0	30	156	19	0	63	1	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
7 Juin.....	53	0	30	156	19	0	63	8	7
Bayli.									
17 Août 1779.....	53	50	0	165	46	0	66	3	40
3 Octobre.....	53	54	0	191	5	0	69	11	20
Cook.									
30 Juin.....	53	54	0	191	5	0	68	20	30
12 Octobre 1778.....	53	55	0	193	5	0	69	23	20
Bayli.									
1 Mai 1778.....	54	40	0	222	5	0	73	34	15
12 Août 1779.....	55	24	0	168	35	0	67	47	40
Cook.									
18 Juin 1778.....	55	24	30	198	25	0	70	57	0
21 Juin 1779.....	55	51	15	161	26	0	65	31	15
Bayli.									
21 Juin 1779.....	56	2	0	161	45	0	66	40	10
5 Juillet 1778.....	56	33	0	196	35	0	71	1	30
10 Juin.....	57	10	0	205	0	0	73	49	20
Cook.									
14 Juillet 1780.....	58	12	0	196	20	0	72	22	30
Bayli.									
13 Juillet 1778.....	58	12	0	195	53	0	73	6	0
Cook.									
14 Mai 1780.....	58	22	0	218	27	0	75	26	0
Bayli.									
27 Septembre.....	58	38	0	186	13	0	73	34	15
5 Mai 1778.....	58	47	0	218	38	0	76	26	45
Cook.									
25 Juin 1779.....	59	7	45	166	22	0	68	25	0
7 Août.....	59	33	45	180	25	0	71	25	0
Bayli.									
19 Juillet 1778.....	59	37	0	194	50	0	73	3	30
27 Juin 1779.....	59	56	0	173	5	0	70	26	0
Cook.									
17 Mai 1778.....	60	50	30	210	31	0	78	32	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
17 Mai 1778.....	60	51	0	210	13	0	77	7	30
31 Mai.....	61	12	0	206	15	30	76	9	0
Cook.									
30 Juin 1779.....	61	48	30	178	5	0	71	54	37
Bayli.									
1 Juillet 1779.....	61	52	0	179	15	0	72	18	40
Cook.									
3 Juillet 1779.....	63	36	0	184	6	0	74	12	45
Bayli.									
3 Juillet 1779.....	63	42	0	185	5	0	74	59	10
Cook.									
2 Août 1779.....	64	3	0	186	25	0	76	7	30
Bayli.									
7 Septembre 1778.....	64	20	0	192	45	0	76	36	15
13 Septembre.....	64	21	0	195	35	0	76	58	20
Cook.									
1 Août 1779.....	64	23	20	186	37	0	76	3	0
13 Septembre 1778.....	64	33	0	194	55	0	76	25	0
Bayli.									
5 Août 1778.....	64	35	0	189	59	0	76	40	30
31 Juillet 1779.....	65	9	0	187	2	0	76	17	0
11 Août 1778.....	66	30	0	188	18	0	77	10	30
2 Septembre.....	66	30	0	186	35	0	77	15	30
Cook.									
13 Août 1778.....	66	32	30	189	32	0	77	7	0
28 Juillet 1779.....	67	8	20	186	54	0	78	48	0
Bayli.									
27 Juillet 1779.....	67	30	0	186	12	0	78	15	20
Cook.									
10 Juillet 1779.....	68	1	0	185	50	0	78	30	0
9 Juillet.....	69	12	15	185	40	0	79	0	0
Bayli.									
8 Juillet.....	69	23	0	191	35	0	80	3	45
13 Juillet.....	69	26	0	185	50	0	80	5	20

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
26 Août 1778.....	69	36	0	182	49	0	79	35	0
14 Juillet.....	69	36	20	185	50	0	79	0	0
Bayli.									
26 Août 1778.....	69	37	0	179	45	0	79	4	15
17 Juillet 1779.....	69	56	0	192	50	0	79	52	30
Cook.									
19 Août.....	70	6	45	194	11	0	79	40	0
18 Juillet.....	70	26	30	193	27	0	79	58	7
Bayli.									
18 Août 1779.....	70	30	0	195	20	0	81	46	45

HÉMISPHERE AUSTRAL.

MER PACIFIQUE.

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
22 Décembre 1777.....	0	20	0	201	5	0	6	1	0
Cook.									
22 Décembre 1777.....	0	34	0	200	33	0	5	57	0
Bayli.									
3 Février 1780.....	1	24	0	103	5	0	18	37	0
21 Décembre 1777.....	1	50	0	200	25	0	3	4	45
20 Décembre 1777.....	2	2	30	200	45	0	2	54	0
Cook.									
20 Décembre 1777.....	3	13	0	201	0	0	0	12	15
Bayli.									
20 Décembre 1777.....	3	16	0	201	11	0	0	9	30
Cook.									
20 Décembre 1777.....	3	32	0	201	5	0	0	55	0
Bayli.									
19 Décembre 1777.....	3	40	0	201	15	0	0	48	45
.....	3	41	0	201	15	0	0	56	45
Cook.									
20 Décembre 1777.....	3	50	0	201	5	0	1	2	0
Bayli.									
19 Décembre 1777.....	4	36	0	201	35	0	3	16	45
Cook.									
19 Décembre 1777.....	4	56	30	201	47	0	3	11	0
Bayli.									
18 Décembre 1777.....	6	10	0	201	59	0	6	56	45
Cook.									
18 Décembre 1777.....	6	23	45	201	45	0	7	15	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Bayli.									
17 Décembre 1777.....	7	24	0	201	51	0	9	9	15
Cook.									
17 Décembre 1777.....	7	38	30	201	54	0	10	12	0
16 Décembre.....	8	56	45	201	55	0	13	12	30
15 Décembre.....	9	48	45	202	55	0	14	58	0
14 Décembre	11	3	0	203	0	0	16	23	0
Bayli.									
9 Décembre 1777.....	14	36	0	205	11	0	24	0	0
Cook.									
25 Octobre 1777, sur la côte de l'Isle Huaheine.	16	44	0	202	9	0	28	19	0
9 Septembre.....	16	44	0	206	27	0	29	21	52
10 Novembre.....	16	45	30	206	0	0	29	15	0
8 Septembre, sur la Côte d'Otahiti.....	17	29	0	207	45	0	29	3	32
Bayli.									
16 Avril 1777.....	18	6	0	193	55	0	32	16	30
16 Avril 1777.....	18	8	0	193	38	0	32	16	45
5 Avril.....	19	14	0	197	39	0	32	53	0
Cook.									
19 Septembre 1777	19	46	0	183	13	0	36	55	0
1 Avril 1777.....	19	51	15	199	11	0	34	35	0
Bayli.									
7 Juin 1777	20	14	0	182	35	0	38	15	0
.....	20	14	0	182	35	0	38	41	45
Cook.									
22 Juin 1777	21	8	20	182	30	0	39	1	30
Bayli.									
30 Mars 1777.....	21	53	0	199	35	0	36	50	15
Cook.									
27 Mars 1777.....	23	16	15	198	58	0	40	10	0
8 Août 1777.....	23	55	45	208	31	0	38	57	0
Bayli.									
21 Mars 1777.....	26	50	0	199	5	0	44	48	0

Noms des Voyageurs et dates des Observations.	Latitudes.			Longitudes.			Inclinaison.		
	D.	M.	S.	D.	M.	S.	D.	M.	S.
Cook.									
5 Août 1777.....	26	50	30	203	50	0	43	50	0
22 Mars 1776.....	26	52	0	199	15	0	44	41	30
3 Août 1777.....	27	43	15	201	29	0	45	37	30
20 Mars.....	29	4	0	198	54	0	47	21	30
Bayli.									
15 Mars 1777.....	33	40	0	196	15	0	53	41	30
Cook.									
12 Mars 1776.....	38	41	45	193	56	0	59	3	30
Bayli.									
10 Mars 1777.....	39	23	0	192	50	0	59	38	15
Cook.									
10 Mars 1777.....	39	26	0	193	14	0	60	9	0
Bayli.									
9 Février 1777.....	40	33	0	168	55	0	64	56	45
Cook.									
19 Février 1776, à la Nouvelle Zélande....	41	5	0	171	45	0	62	49	22
Bayli.									
19 Février 1777.....	41	5	0	171	40	0	64	39	20
Cook.									
A la Nouvelle Zélande, en trois différens tems.	41	5	56	172	0	7	64	36	0
Bayli.									
3 Mars 1777.....	42	0	0	180	35	0	64	22	15
22 Janvier.....	43	17	0	144	55	0	71	0	0
27 Janvier.....	43	21	0	145	8	0	70	55	20
29 Janvier.....	43	21	0	145	8	0	71	0	40
Cook.									
28 Janvier 1777.....	43	22	20	145	3	0	70	15	37
5 Février.....	43	31	45	159	25	0	68	52	30
Bayli.									
4 Février 1777.....	43	40	0	157	5	0	69	46	0
Cook.									
En Mai 1773, à la Baie d'Usky, Nouvelle-Zélande.	45	47	26	163	53	0	70	5	45

C'EST pour la commodité des Navigateurs que j'ai cru devoir donner les Tables précédentes de deux manières; la première, en comptant les degrés de Déclinaiſon & d'Inclinaiſon, depuis le plus petit juſqu'au plus grand; & la ſeconde, en comptant ces mêmes variations depuis zéro de Latitude juſqu'aux plus hauts degrés de Latitude boréale & auſtrale où l'on ait fait des obſervations. Les Tables conſtruites d'après la première manière, indiqueront aux Marins le lieu où ils ſeront, lorſque leurs Bouſſoles marqueront tel ou tel degré de déclinaiſon ou d'inclinaiſon, tandis que les Tables rédigées de la ſeconde manière, leur feront connoître les Obſervations précédemment faites dans les lieux où ils ſe trouveront, & les mettront à portée de les confirmer ou de les corriger; &, pour une plus grande facilité, j'ai encore penſé qu'il étoit néceſſaire de faire des Cartes magnétiques d'après ces mêmes Tables d'Obſervations, & de placer dans ces Cartes les obſervations les plus avérées des Voyageurs les plus récents, c'eſt-à-dire, depuis l'année 1775 : & lorſque, pour le même lieu, il s'eſt trouvé pluſieurs obſervations faites depuis 1775, nous avons préféré de marquer ſur les Cartes, l'obſervation de la déclinaiſon ou de l'inclinaiſon la plus forte, & nous avons négligé les autres, que cependant on trouvera dans les Tables

qui les contiennent toutes, au lieu que les Cartes, quoiqu'aſſez grandes, n'auroient pu les préſenter ſans confuſion.

Nous devons obſerver que ces Cartes ne contiennent pas la ſurface du Globe entier, parce qu'il reſte encore ſur le Globe de très-grands eſpaces, tels que certaines parties de l'Océan, la Méditerranée, &c. dans leſquels on n'a fait que peu ou point d'obſervations; &, comme c'eſt principalement pour l'utilité des Navigateurs que nous avons rédigé ces Cartes magnétiques, nous n'avons fait deſſiner que les contours des Continents & des Iſles, & nous n'y avons pas compris les Obſervations faites dans l'intérieur de ces mêmes terres, leſquelles d'ailleurs ne ſont pas à beaucoup près auſſi multipliées que celles qui ont été faites ſur les Mers.

Ces Cartes magnétiques ſont au nombre de ſept,

La première, pour la Mer Atlantique Boréale;

La ſeconde, pour la Mer Atlantique Auſtrale;

La troiſième, pour la Mer des Indes, tant Boréale qu'Auſtrale, parce qu'elle eſt moins étendue que la Mer Atlantique;

La quatrième & la cinquième, pour la Mer Pacifique Boréale;

Et la ſixième & la ſeptième, pour la Mer Pacifique Auſtrale, parce que la Mer Pacifique eſt plus étendue que toutes les autres Mers, & parce que les Navigateurs récents y ont fait un plus grand nombre d'obſervations.

Enfin, pour préſenter en général les principaux réſultats de ces ſept Cartes particulières, nous avons cru devoir les réunir dans une Carte générale des deux Hémiſphères du Globe, depuis les Poles juſqu'à l'Equateur, & nous devons obſerver que cette Carte générale ne préſente pas toutes les obſervations miſes ſur les Cartes particulières, mais ſeulement la place des déclinaiſons depuis zéro juſqu'à deux degrés, & celle de la plus forte inclinaiſon qu'on ait obſervée à chaque degré de latitude, depuis 1775. Les premières, c'eſt-à-dire les places des déclinaiſons, ſont indiquées par des points; & celles de la plus forte inclinaiſon obſervée à chaque degré de latitude, ſont marquées par des croix. J'ai auſſi fait repréſenter ſur cette Carte générale l'eſpace dans lequel eſt actuellement l'un des deux Poles magnétiques de notre Hémiſphère Boréal, dont l'exiſtence eſt démontrée par les obſervations récentes, & cet eſpace ſe trouve dans l'Amérique Septentrionale, aux environs de la Baie de Baffin; mais on n'y trouvera pas l'eſpace où pourroit être ſitué le Pole magnétique de notre Hémiſphère, quoique nous puiſſions préſumer, avec aſſez de vraiſemblance, que le ſecond Pole magnétique eſt au Nord de l'Aſie; &, à l'égard des deux Poles magnétiques de l'Hémiſphère Auſtral, nous n'avons pas un aſſez grand nombre d'obſervations pour fonder ſur leur poſition des conjectures probables. Nous ne pouvons donc que recommander aux Navigateurs la recherche

de ces Poles, qu'ils découvriront aiſément, s'ils ſe donnent la peine de multiplier les obſervations dont nous leur donnons ici les exemples.

Au reſte, comme ces Cartes magnétiques, quoique réduites au moindre volume poſſible, ſont encore trop étendues pour pouvoir ſe plier en *in*-4.° & en *in*-12, il n'a pas été poſſible de les faire entrer ſous ce format, & nous avons été obligés d'en former un Volume ou petit Atlas ſéparé, & que l'on délivrera en même-tems que les Volumes, ſoit *in*-4.° ſoit *in*-12.

APPROBATION.

J'AI EXAMINÉ, par ordre de Monſeigneur le Garde-des-Sceaux, un Manuſcrit, intitulé : *Traité de l'Aimant & de ſes uſages, par M. le Comte de Buffon.* Cet Ouvrage plein de génie, d'idées neuves & de faits importans, ſera utile à la Phyſique & à la Navigation, & je croie qu'on en doit deſirer la plus prompte publication. A Paris, le 28 Mars 1787.

Signé, DELALANDE, *Cenſeur Royal.*

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à nos amés & féaux Conſeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conſeil, Prévôt de Paris, Baillis, Sénéchaux, leurs Lieutenans-Civils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre bien-amé le Sieur Comte

DE BUFFON, Nous a fait expoſer qu'il deſireroit faire imprimer & donner au Public le *Traité de l'Aimant & de ſes uſages, de ſa compoſition*; s'il Nous plaiſoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce néceſſaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expoſant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préſentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui ſemblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume : Voulons qu'il jouiſſe de l'effet du préſent Privilège, pour lui & ſes hoirs à perpétuité, pourvu qu'il ne le rétrocède à perſonne ; & ſi cependant il jugeoit à propos d'en faire une Ceſſion, l'Acte qui la contiendra ſera enrégiſtré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la Ceſſion ; & alors, par le fait ſeul de la Ceſſion enrégiſtrée, la durée du préſent Privilège ſera réduite à celle de la vie de l'Expoſant, ou à celle de dix années, ſi l'Expoſant décède avant l'expiration deſdites dix années ; le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conſeil du 30 Août 1777, portant Réglement ſur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenſes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étrangère dans aucun lieu de notre obéiſſance ; comme auſſi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ſous quelque prétexte que ce puiſſe être, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit dudit Expoſant, ou de celui qui le repréſentera, à peine de ſaiſie & de confiſcation des Exemplaires contrefaits, de ſix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois ; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conſeil, du 30 Août 1777, concernant les contrefaçons : A LA CHARGE que ces Préſentes ſeront enrégiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préſent Privilège ; qu'avant de l'expoſer en vente, le manuſcrit qui aura ſervi de copie à l'impreſſion dudit Ouvrage, ſera remis dans le même état où l'Approbation

y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde-des-Sceaux de France, le Sieur DE LAMOIGNON ; qu'il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le ſieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON : le tout à peine de nullité des Préſentes ; DU CONTENU deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant & ſes hoirs, pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit tenue pour duement ſignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conſeillers-Secrétaires, foi ſoit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous Actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Verſailles, le vingt-cinquième jour du mois d'Avril l'an de grace mil ſept cent quatre-vingt-ſept, & de notre Règne le treizième. PAR LE ROI en ſon Conſeil. Signé, *LE BEGUE.*

Regiſtré ſur le Regiſtre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, Numéro 1145, fol. 224, conformément aux diſpoſitions énoncées dans le préſent Privilège ; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preſcrits par l'Arrêt du Conſeil, du 16 Avril 1785. A Paris, ce premier Mai 1787.

Signé, KNAPEN, *Syndic.*

DE L'IMPRIMERIE DES BATIMENS DU ROI.

10

10

60

Mer Baltique

20

10

30

10

20

CARTE

DES DECLINAISONS ET INCLINAISONS

DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

redigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775

TERRE DE LABRADOR

Détroit de Belle Ile

Golfe de S.t Laurent

I. DE TERRE NEUVE

ACADIE

Cap Raz

Ile Royale

Cap de Sable

M E R

A T L A N T I Q U E

ILES BRITANNIQUES

Cap Clear

Cap Lizard

Manche

PARIS

FRANCE

Mer Baltique

Golfe de Venise

ITALIE

Corse

Sardeigne

SICILE

ESPAGNE

Cap Finisterre

Ortegal

Cap St.t Vincent

Détroit de Gibraltar

MER MÉDITERRANÉE

Cap Bon

BARBARIE

Cap Cantin

Cap Bojador

Cap Blanco

Cap Verd

AFRIQUE

GUINÉE

Côte d'Or

Cap des Palmes

Cap Fermoso

GOLFE DE GUINÉE

Tropique du Cancer

Portorico

Trinidad

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

Cayenne

Cap de Nord

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest. les inclinaisons n'ont point de lettre.

10

0

Cap Lope

AFRIQUE

CONGO

Cap Ledo

10

Cap Negre

20

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est.

l'O. la déclinaison Ouest.

les inclinaisons n'ont point de lettre.

60

330

10

20

CARTE

DES DÉCLINAISONS ET INCLINAISONS
DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

rédigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest, les inclinaisons n'ont point de lettre.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

BRÉSIL

PARAGUAY

AMÉRIQUE

AFRIQUE

ATLANTIQUE

MER

Tropique du Capricorne

R. des Amazones

Cap de St Roque

S. Salvador

Baye de tous les Saints

Cap Frio

Cap St Thomé

Port de St Pierre

Buenos-ayres

Rio de la Plata

Cap de Ste Marie

Cap de St Antoine

Baya Anegada

Baya de los Camarones

Cap Blanc

Port Desire

Baye de St Julien

Isles Malouines

Cap des Vierges

I. des Etats

Cap Horn

Cap Lope

CONGO

Cap Ledo

Cap Negre

Cap das Voltas

Cap de Bonne Esperance

CARTE

AISONS ET INCLINAISONS

GUILLE AIMANTÉE

ès la table des obſervations

es faites par les Voyageurs

puis l'Année 1775.

110

30

30

40

50

110

0 17 d 12 ′.

73 d 21 ′.

0 18 d 18 ′.

73 d 22 ′.

72 d 27 ′.

7 ′.

38.

0 31 d 51 ′.
61 d 26 ″ 0
0 31 d 39 ′.
28 d

CARTE

DES DÉCLINAISONS ET INCLINAISONS DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

redigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775.

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest. les inclinaisons n'ont point de lettre.

MER DES INDES

ARABIE

MER ROUGE

Golfe Persique

Cap Mocandon

Maceira

Golfe de Sindi

G. de Cambaye

INDES

BENGALE

Tropique du Cancer

GOLFE DU BENGALE

Haiman

COCHINCHINE

CAMBOJE

Golfe de Siam

MALAY

BORNEO

MATRA

JAVA

Détroit de la Sonde

Socotora

Cap Guardafui

Cap des Basses

Lakedives

Cap Comorin

MALABAR

COROMANDEL

CEILAN

Maldives

Zanzibar

Cap Delgado

Iles Comore

Cap de Natal

Mocambique

I. S.te Marie

MADAGASCAR

Canal de Moçambique

I. DE FRANCE

I. DE BOURBON

Tropique du Capricorne

Fort Dauphin Ruiné

Cap S.t Romain

Cap des Courants

Cap des Aiguilles

HOTENTOTS

CAFRERIE

IQUE

150 180 190

70

79.d 4'. 79.d 35'. 79.d 0'. E 27.d 46'. E 26.d 55'. 80.d 5'. E 27.d 17'. 70.d 0'. 31.d 2'. E 26.d 10'. E 25.d 54'. E 26.d 35'.

Cap Nord E 22.d 27'.

78.d 30'. E 28.d 27'. E 25.d 14'. 78.d 25'.

E 26.d 48'. E 26.d 24'. 78.d 48'. E 26.d 24'. E 27.d 32'. 26.d 22'. 77.d 15'. E 78.d 15'. 77.d 10'. E 27.d 60'. E 26.d 24'. 77.d 7'.

HUCZKI

Det. de Bering

P.te Mulgrave

E 27.d 58'. E 24.d 45'. 25.d 12'. 76.d 17'. 24.d 47'. E 23.d 57'. E 22.d 34'. 24.d 11'. 25.d 1'.

Cap du P.r de Galles

dirskaja Guba E 25.d 1'. E 25.d 38'. 76.d 3'. 76.d 7'. 25.d 59'. 23.d 27'. 74.d 59'. E 25.d 26'. 74.d 12'.

S

Ile Clerke

St Thadee

E 22.d 48'.

E 20.d 17'.

79.d 58'. 61.d 46'. E 34.d 55'. 35.d 31.d 32'. E 33.d 3'. 33.d 37'. 36.d 19'. 79.d 40'. E 33.d 40'. 79.d 52'. E 33.d 28'. 31.d 37'. E 33.d 0'. 80.d 3'.

E 22.d 41'.

71.d 25'. E 19.d 60'. E 19.d 37'. 72.d 34'. E 20.d 38'. E 19.d 11'. E 25.d 7'. Cap Newenham E 23.d 28'.

CARTE

DES DÉCLINAISONS ET INCLINAISONS DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

redigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775.

Explication

l'E. avant de chiffre indique la déclinaison Est.
l'O. la déclinaison Ouest.
les inclinaisons n'ont point de lettre.

Cercle Polaire Arctique

TARTARIE RUSSE

TUNGUSI

MER DE KAMTCHATKA

KAMTCHATKA

Penſzinskaja Guba

Ile Karaginskoi

Outorskoi Nos

KORIAKI

TSCHUCZKI

Det. de Bering

Cap Nord

P.te Mulgrave

Cap du P.r de Galles

Anadirskaja Guba

Ile Clerke

Cap St. Thadee

Cap Newenham

Baye Briſtol

Ooneemak

ALASCHKA

OONALASCHKA

Amluk

TATARIE CHINOISE

Cap Patience

Cap Anivа

P.te Noire

Terre des Etats

IESO

Cap Erroin

ILES DU JAPON

Golfe de Pekin

COREE

Kiuſiu

NANKIN

CHINE

Lekeyo

Formoſe

Hainan

COCHINCHINE

PHILIPPINES

LUZON

MINDANAO

Paragua

Iles Mariannes

Guahan

CAROLINES

Tolo

MER PACIFIQUE

Tropique du Cancer

N.° 5.

2
280
290
70
P
VCLINA
TERME
IANTI
obserua
Voyag
aventura
AMÉRIQUE
MÉRIDIONALE
15.d 40'.
10.d 53'.
E 7.d u.
75.
E
E
20
280
290

CARTE

DES DÉCLINAISONS ET INCLINAISONS DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

redigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775.

Explication

l'E. avant de chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest. les inclinaisons n'ont point de lettre.

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE

MER PACIFIQUE

CANADA

ETATS UNIS

LOUISIANE

NOUV.au MEXIQUE

CALIFORNIE

MEXIQUE

GOLFE DU MÉXIQUE

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

TERRE FERME

Cercle Polaire Arctique

Tropique du Cancer

R. de COOK

Entrée du Prince Guillaume

Baye de Bering

Cap Edgecombe

I. de la Trinité

NOOTKA

Baye de l'Esperance

Cap Flattery

Cap Mezari

Cap Foulweather

Cap Blanc

Cap des Pins

P.te de la Conception

Cap del Engaño

Baye de S. Christoval

Mer Vermeille

Cap S. Lucas

C. de Corrientes

Repulse Baye

Wager Baye

Chesterfield

Welcome

LE BAREN

I. Mansfelt

Cap Southampton

BAYE D'HUDSON

C. Henriette Marie

JAMES BAYE

Alchikoumipi Lac

R. S.t Laurent

C. Cod

Long Island

Baye de Chesapeak

C. Hatteras

N. Orleans

Baye de S.t Bernard

Canal de Bahama

FLORIDE

Lucayes

CUBA

Yucatan

Golfe d'Honduras

La Jamaique

S. DOMINGUE

Cap de Gracias a Dias

Cap de la Vela

Baye de Buenaventura

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290

70 60 50 40 30 20 10

10

50

DES DÉC

DE L'

redigée d

Magnét

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest. les inclinaisons n'ont point de lettre

60

100

180

190

CARTE

DES DÉCLINAISONS ET INCLINAISONS DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

redigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775.

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest. les inclinaisons n'ont point de lettre

MOLUQUES
CELEBES
Ceram
NOUVELLE GUINÉE
Nlle Irlande
Nlle Bretagne
Cap Uverdy
Cumbava
Timor
C. Walsche
Detroit de l'Endeavour
C. York
Cap de la Delivrance
Golfe de Carpentarie
Terre d'Arnhem
Carpentarie
Cap Grafton
Cap Sandwich
Cap Glocester
Terre de Wit
Tropique
du
Capricorne
I.s Northumberland
Cap Capricorne
Cap de Sable
C. Morton
Cap Byron
C. de la Fumée
Port Stephens
Baye de Botanique
C. Howe
Terre de Nuyts
Terre du Lion
Terre de Diemen
Cap Sud Ouest
Baye de l'Aventure
Sud
I.s de la Reine Charlotte
Cap Nord
Cap Est
Détroit de Cook
Cap Ouest
Cap Sud
NOUVELLE HOLLANDE
NOUVELLE ZÉLANDE
DES INDES
MER DU SUD
MER PACIFIQUE

DES DE

DE

redigé

Magn

CARTE

DES DÉCLINAISONS ET INCLINAISONS DE L'AIGUILLE AIMANTÉE

redigée d'après la table des observations Magnétiques faites par les Voyageurs depuis l'Année 1775.

Explication

l'E. avant le chiffre indique la déclinaison Est. l'O. la déclinaison Ouest. les inclinaisons n'ont point de lettre.

AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

PÉROU

CHILI

PATAGONS

MER

PACIFIQUE

Golfe de Guyaquil

Cap Blanco

Pte. Ste. Hélene

Nuestra Senora

Tropique du Capricorne

Iles de la Societé

O-Taiti

Isles vues par les Espagnols en 1773.

Chiloé

Pte. de la Campana

I. de la Mere de Dieu

Cap Desiré

Cap Noir

TERRE DE FEU

Cap Horn

10 20 30 40 50 60

200 210 220 230 240 250 260 270 280 290